





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2584/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2584/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2584/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2584/A





Médecine

A XVIII 0.51

2555/7

2

10359 b 2 p 44
53000

GALENI

DE AFFECTO

RVM LOCORVM NOTIS

tia, libri sex, Guilielmo

Copo Basiliensi

interprete

re.

EX SECUNDA RECOGNITIONE.

IMPRESSVM anno supra
sesquimillesimum. 27. mens
se Augusto. 1527.

INDEX.

¶ Liber primus totus, vñico capite continetur.

¶ Libri secundi capita tria.

¶ De his quæ ab Archigene scripta sunt, quomodo ex dolorum specie, sedes affectas discerni posse putauerit. Caput. 1

¶ Quod ea quæ ab Archigene dicta sunt, aliqua vere, & absolute, & clare, alia omnino obscure, imperfecte, indistincte, & falso, dicta sint. Caput. 2

¶ De via & ratione, qua simul & sedes affecta, & ipsius dispositio possit cognosci. Caput. 3

¶ Libri tertij capita vñdecim

¶ Quod actionum noxæ, ipsarum actionum instrumēta affecta esse declarant, aut primitiue, aut per accidens. Caput. 1

¶ Quod scire oportet, quomodo læsa actione, distinguantur p

CAPITVM.

e

tes primogenio affectu laborātes, ab ijs quæ per aliarum consensum afficiuntur. Caput. 2

¶ Quod partes, quarum actiones eo quod alijs consentiunt, læduntur, aliæ quidem in proprio suo corpore habent dispositiones ipsas, aliæ vero priuantur, aut materia, aut facultate, quæ ipsarum viribus influere solebat.

Caput. 3

¶ De memoria perdita, deq; alijs affectibus, qui circa principem animæ facultatem euenire possunt.

Caput. 4

¶ De stultitia, sopore, lethargo, phrenetide, & mania. Caput. 5

¶ De melancholia. Caput. 6

¶ De morbo comitiali. Caput. 7

¶ De vertigine. Caput. 8

¶ De cephalga & hemicrania.

Caput. 9

¶ De apoplexia & nervorum resolutione.

Caput. 10

¶ De olfactu.

Caput. 11

a. ij.

INDEX.

¶ Libri quarti capita nouem.

- ¶ De affectis partibus in oculorū
morbis. Caput primum.
¶ De linguę affectibus. Caput. 2.
¶ De sensu auditus Caput. 3.
¶ De affectibus faciei Caput. 4.
¶ De spinę affectibus Caput. 5.
¶ De sanguinis sputo. Caput. 6.
¶ Affecta voce quomodo sedes af-
fecta deprehendatur Caput. 7.
¶ De locis affectis in dyspnœa
Caput octauum.
¶ De pulmonis affectibus
Caput nonum.

¶ Libri quinti capita septem.

- ¶ De cordis affectibus Caput. 1.
¶ De affectibus thoracis Caput. 2.
¶ De septi transversii affectibus.
Caput tertium.
¶ De affectibus gulę Caput. 4.
¶ Oris ventriculi affectus. Cap. 5.
¶ Hepatis affectus Caput. 6.
¶ De morbo regio Caput. 7.

CAPITVM.

¶ Libri sexti capita sex.

¶ De affectibus lienis Caput. 1

¶ De ventriculi & intraneorum
affectibus Caput. 2

¶ De affectibus renum. Caput. 3

¶ Vesicæ affectus Caput. 4

¶ Affectus vteri Caput. 5

¶ Pudendorum affectus.

Caput sextum.

INDICIS FINIS.

a. iij.

N V N C V P A T O R I A

¶ Ad Christianissimū Frācorum
regum L V D O I C V M duode-
cimum, Guilielmi Copi Basilien-
sis, in librum G A L E N I de affe-
ctorum locorum notione, præ-
fatio.



Consideranti mihi,
Christianissime rex,
varia mortaliū stu-
dia, quibus optimū
finem, summūq; bo-
num assequi pro viribus quisq; ni-
titur, rectissime hortari videtur
Satyricus, id præcipue & solū op-
tādū esse, vt sit mens sana in cor-
pore sano. Verū tāta est (proh do-
lor) hodie hominū perversitas, vt
neglecto animo, posthabitaq; cor-
poris salute, omne studium ad di-
uitias cōuertant, eoq; deuentum
sit, vt quo quisq; maiorem pecu-
nariū cumulum ostētare potest,
eo videatur maiore honore di-
gnus. cum interim viri & morū
probitate, & bonis literis prædia

ti, q̄ diuitijs nō affluant, non solū
 debito priuentur honore, verum
 etiā pro stultis reputentur. Id ni-
 mirum causse esse videtur, cur tā
 pauci nostra tēpestare recte phi-
 losophentur. Cum primum enim
 tres, quatuorve literulas scioli q̄-
 dam delibauerint, non veritatem
 inquirere, sed diuites illos adulan-
 do captare studēt, quo aliquid ab
 ipsis pecuniarū detrahere, & in-
 star illorum primas sedes in con-
 uenticulis occupare possint. Sane
 sunt nonnulli, qui vix delibatis sa-
 crarum literarū primis rudimen-
 tis, p̄tinus ad aucupāda (vt aiūt)
 beneficia nihil reliqui faciūt. Alī
 perlectis tribus, quatuorve Bar-
 toli argumētis, nunquā inspecto
 pandectarum, codicilve cortice,
 ad agendas causas properāt, non
 vt tueātur pupillum, sed vt pecu-
 nias, quibus plurima sibi latifun-
 dia comparent, ab eo astute extor-
 queāt. Sic etiam inueniuntur non
 pauci (vt iterim professionis mee
 a iij

NVNCVPATORIA

non obliuiscar) qui cum primum
aut ptisanam nominare, aut vino
egris interdiceret, aut clysterem
inijcere nouerunt, protinus me-
dicam artem professi, populatim
miseris mortalibus graui cum pe-
riculo imponere nō erubescunt,
ac potentes illos adulationibus ca-
ptare aggrediunt, neglectis spre-
tisq; doctissimorum medicorum Hip-
pocratis, Galeniq; monumentis.
Quippe nemo iam inde ex tā lō-
go æuo inuentus est adeo veritas
studiosus, vt illorum libros ex
græca lingua in latinam vertere
curauerit. Quanquā inueniuntur
aliqui, qui Galeni opera vt latina
circunferant, credatq; sese ei tāq;
a secretis esse, atq; iactent, nullū
sese Galeni locum non intellige-
re. Ego vero haudquaquā credi-
derim Galeni mentem ex illis li-
bris a quoquam deprehendi pos-
se, quos ne ipse quidem author, si
viveret, esset intellecturus, adeo
deprauata est illorū librorū seria

es, vt ex mille versibus vix vnus
 Galeni mētem referre videatur.
 Quod nonnulli intelligentes, res
 iectis Galeni libris, Auicēnam po
 tius imitari voluerunt. q̄ scilicet
 cōcinno (vt aiunt) ordine, vastū
 illum canonē suū texuerit. Qui
 si diligenter multa quæ de curan
 di ratione cōscripsit capita, ad a
 mūssim examinassent, non ordi
 nem & lucē, sed tenebras potius
 & confusum chaos offendisse se fa
 terentur. Contra vero si Galeni
 tres doctrīnas, ordine contentas,
 olfecissent, summo tū ordine tum
 artificio, ipsum commētarios suos
 scripsisse haudquaquam nega
 rēt. Egdē fateri audeo, multo plus
 solidæ doctrīnæ, biennio ex Galeni
 lectione discipulū reportaturum,
 quā si decē perpetuis annis Auicē
 næ canonē reuoluat. Id vero fa
 cile videre est, vel in eo libro quē
 de locorum affectorū notione cōs
 cripsit. Quē si qs diligēter sepe
 numeroq̄ plegerit, oēs iternorū

NUNCUPATORIA

morborū notas, & multo facilius
 deprehendet, & tenaciori memoria
 feruabit, quā si assidue inexhaustā
 illam signorum Auicennę conge-
 riem legendo repetat. Hunc ego
 Galeni librum, ne nihil agerem,
 cum instrenua ista tua cōtra An-
 glos expeditione, vnā cum doctis-
 simis medicis tuis castra tua seque-
 rer, ex græco latinum feci, sperās
 hoc opus non solū medicis: sed vs-
 niuersis quoq; mortalibus pfuturū.
 Nā latētes morbos q̄ facillime
 dignoscere docet, sine qua notitia
 nullū affectū recte curari posse ap-
 pud oēs medicos in confesso est. Cē-
 terum quia maximum medicum,
 maximi quoque principis nomis-
 ne illustratum, in publicum prodi-
 re decebat, tu mihi rex inuictissis-
 me hoc ipso nomine pulcherrime
 succurristi: cui opus hoc dedicarē.
 Quippe qui iustitiæ amministra-
 tione Troianum, victoriarum nu-
 mero Alexandrum Macedonem,
 clementia Iulium Cæsarem facile

superas, & quod ad religionem p
tinet, sanctissimi regis L O D O I C I
vestigia intentis nervis immitas
ri conaris. Suscipe igitur Christia
nissime rex benigno vultu, has no
stras, quas in medio armorum stre
pitu exarauimus, lucubrationes.
Sic enim ad reliqua Galeni volu
mina interpretanda animum mis
hi eriges, & vniuersum mortale
genus hoc nō mediocri beneficio
perpetuis amoris vinculis tibi obs
ligabis. Vale Christianissime rex,
ex Parisiorū Lutetia. Anno mille
simo quīgētesimo decimo tertio.

GALENI DE

AFFECTORVM LOCOS

RVM NOTITIA LIB.

ber primus, Guiliel

mo Copo Basia

leiēsi inter

prete.



ON solum recentior
res medici, sed veter
rum quoque nō pau
ci, corporis particu
las, locos nominare
consueverunt. ac q̄ diligentissi
me, affectus ipsis euenire solitos,
dinoscere studuerunt. quippe pro
locorum differentia, curationem
fit huiusmodi notitia, in eo libro,
quem de curandi via & ratione
conscripsimus, videre est. Nam
in presenti opere quomodo affe
ctus particule possint discerni, ex
plicare duntaxat proposuimus.

¶ Igitur partes in superficie cō
stituta, vna cum affectuum suos

*+ quicq. uariar. cōfessib.
sic quam ad curand. in
uim sit.*

rum proprietate, facile sensibus deprehenduntur. Quæ vero in imo corpore latent, exercitata cogitationis virum desiderant, cum in partium & actionibus & utilitatibus, tum maxime atque in primis in anatomice, id est arte secandi corpora. Quippe hæc nos docuit, cum alia permulta, tū cuiuslibet partis essetia proprietatem. Sic enim corpus quoddam cartilagineum est, secundū asperam arteriam (bronchion appellant) cuius proprietatem hi dumtaxat qui ipsum viderunt, cognoscere possunt. Id si aliquando tussiendo expuatur, maximum vlcus vel ab erosionē vel putredine in pulmone esse existimamus. Atque qui in tota ea parte quæ inter guttur & pulmonem media est, quāquam eiusmodi naturæ corpus inuenitur, tam grandis tamen ulceratio, in ipsa haudquaquam fieri potest, quin prius mors animal præoccupet. In pulmone vero

GAL. DE LOCIS AFFECT.

2 talis fieri potest, vt pote q ob hu-
miditatem, & facile putrescere,
& à vitiosis humoribus prompte
erodi consuevit, atq; bronchia in
ipso exigua admodum sūt. Quo-
circa pars ipsorum putrescere nō
potest, quin potius totum bron-
chium reñci necesse est. membras
nosius Vinculis quæ ipsum cū alijs
coniungunt à sua cōtinuitate ab-
solutis, quippe quæ suis bronchijs
multo celerius afficiuntur. hæc enī
& cartilaginea, & dura, & crassa
sunt, membranæ vero quæ ipsa
coniungunt, teues & infirmæ.
Sane frustum quoddā vasis, haud
ita paruum, tussiendo reñci vidis-
mus, quod ex pulmone fuisse edu-
ctum, plane intelligebāt dissecto-
riæ artis haud imperiti professo-
res. Quotquot enim ad asperā ar-
teriā in collo perueniunt vasa, o-
mnia capillorum fere speciem re-
ferunt. Proinde non solum essen-
tiæ pprietas, sed magnitudo q; q;
saepenumero affectum locū haud

obscure indicare potest. Sic enim
 cum intestini tunicā per dysente-
 riā deiectā conspexeris, sitq; & la-
 titudine & crassitudine hīs q̄ a tes-
 nuioribus solūtur multo maior,
 non ab re conſicies vlcerationem
 in crassis intestinis consistere. Ita
 cū adolescentulū tussiendo, tunis *de hoc, id est*
 cā viscosam crassāq; reſcere vi- *meminit in*
 deremus, coniecimus eā ex inter- *s. methide*
 gutturi parte vbi ligula (Græci
 epiglottida vocant) cōsistit, fuisse
 se resolutā, ac sanatus est adules-
 centulus, quī id nō admodū spe-
 raremus, mansit tñ vox vitata. *qz illa pars*
 Præterea per essētię proprietatē, *magnū fuit*
 a vesicæ vlceribus, ea quę in reni *admittit*
 bus consistunt, distinguī possunt: *ad formā dā*
 Scripsit enim in aphorismis Hip- *vorag.*
 pocrates. Si ea quę cū urinis exa-
 cernūtur lamarū speciē referūt,
 in vesicā vlcus esse, scire licet, si
 vero carunculis similētur, id erit
 in renibus. ¶ Neq; non a rebus in
 pticulis quibusdā contentis, cres-
 berriē sedes affecta deprehēditur.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Nam Mytilenis adulescens quidā
secundū sedē vulneratus gladi-
o vulnere satis profundo, tri-
bus primis diebus, neq; cibū neq;
potum ingessit, quarta vero die,
adhibitis prius remedijs, cibū sū-
psit, ac bibit quoq; deinde occidē-
te sole, iterum adhibita curatione
vrinę tres heminas p vulnus ex-
creuit, quā antea ex quo vulnera-
tus erat, nihil vrinę reddidisset.
tum vero ab onere quocirca pubē
grauabat, se perfecte liberatū esse
dixit. Itaq; proculdubio cōstabat
vesicā fuisse vulneratā. Quē ad-
modū vbi stercus per vulnus ex-
cernitur, intestinorum alicui vul-
nus esse illatū haud dubiū est. Sic
etiā quū cibus egreditur, in ven-
triculo vulnus esse manifestū est.
Iam ortum supra inguina pānam
ac suppuratum quū medicus indi-
deret, stercus subsequutū, in colo-
abscissum esse declarauit. ¶ Atq;
in hoc genere cōtinetur, spiritus
efflatus, vulnerato thorace, & san-

guis ab arteria profluens. Nā quū
interdū vulneratū corpus sensu
deprehendi non potest exactā ab
his cōsequimur notitiā. Igitur ut
efflatus inter respirandū spiritus,
membranā costas succingētem,
vulneratā esse significat, ita san-
guis saliendo eiectus, arteriā. sed
hic protinus eo qui ex venis erū-
pit, & calidior, & magis tenuis,
& flauior esse dinoscitur. ¶ At ves-
luti horum non incertæ sunt nos-
tæ, sic eodem modo si aliquando
omentum, aut intestinorū aliqd exa-
cidere p vulnus videatur, perito-
neū discissum esse nemo abigere
debet. Si vero pulmonis aliqua fi-
bra, extremā sui partem a vulne-
re exersere videatur, thoracem
confossum esse ostendit. Atqui ni-
hil refert siue succingētem mem-
branam vulneratam, siue thoracem
confossum esse dixeris. ¶ Ex
adhærētibus etiā rebus affectis 4
dis notæ petūtur q̄ppe res adhæ-
rētes essentię pprietatē obtinēt.

b]

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quemadmodum fūgi, si fracto ca-
 pite, meninx (id est membrana ce-
 rebrum custodiens) fuerit affecta.
 Atq; rursus alia proprietas cōspi-
 citur, osse particulę cuiuspiam viti-
 ato. Huius præterea generis est ra-
 mentū (ephelcis græce vocatur)
 quod eius particulæ, à qua excer-
 ni videtur, vlcerationem porten-
 dit, vt vrinę meatuum, si cum v-
 rina, spiritualium instrumentorū
 si tussiendo, gullæ, ac ventriculi,
 si vomitione excernatur, quemad-
 modū si cum alui excremētis de-
 ſcitur, intestinorum aliquod vlc-
 eratū esse significat. ¶ Est præ-
 terea ex indicīs quibusdam alius
 notitię modus, quum videlicet in
 alieno spacio aliquid præter natu-
 ram cōtinetur, vt in renibus, aut
 vesica, lapis, aut pus in thorace,
 aut sāguinis grumus (græce thū-
 los) vbicūque contineatur, aut
 alius quidam humor molestus in
 animalis corpore, gēitus, vel ex-
 trinsecus ei adueniens. ¶ Vnde in

niorum medicorum complures,
 q̄stionē ad medicę artis opa nihil
 conferentem, sed dialecticam po-
 tius habentē contēplationē moue-
 re solent. Vtrum huiusmodi res i
 nobis præter naturam genitæ, ex
 affectis sint sedibus, aut loco neq̃
 quam affecto, animal a causa præ-
 ter naturam molestetur? Sed quod
 iūtilis (vt dixi) sit huiusmodi quę-
 stio, cognitu facile est, si confide-
 raueris eas notas, quæ ad artis vs-
 um pertinere videntur. ¶ Sub-
 ūnciamus ergo aliquem tribus die-
 bus nihil vrinæ reddidisse, nonne
 protinus in qua corporis parte sit
 huiusmodi accidētis causa iuesti-
 gabimus, aut renibus, aut vreteris
 aut vesica, aut vrinæ fistula? Ne-
 que enim i hepate, pulmone, liene
 ventriculo, cordæ, aut alia qua-
 uis particula ipsam quæremus.
 quod nulla ipsarum sit vrinæ in-
 strumentum. Etenim nisi noueri-
 mus primā vrinæ secretionem in
 renibus fieri, deinde eam per vres

b n̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

upr bilis
et multo
et quibz
de vesica
supprimi

teras ad vesicam peruenire, ac de
mum inde excerni, quemadmo
dum iam antea in libris naturalis
lium actionum ostendimus nihil
huiusmodi inuenire poterimus.

Verū huc vsque processisse haud
satis esse videtur, quin potius p
pendere oportet, quæ nam sit cau
sa, propter quam vrina supprimi
tur. Est autem via contemplatis
tionis hæc. Intueri oportet om
nia tum præterita, tū præsentia ac
cidentia, præsentia quidem ipse
met medicus inspicere debet.

Præterita vero non solum à labo
rante, sed etiam ab ipsius famili
aribus interrogando perdiscere.
Sit igitur (exempli gratia) tumor
aliquis in pube, satis euidenter i
circūscripti de vesicā impletā esse ostē
dēs, nihilq; excernatur. Nūquid
plane cōstat aut excretoriā vrine
actionē necessario resolutā. aut vs
rine fistulā esse cōstipatā? In pri
mis igit cōsiderandū est, nū fieri
potuerit, vt resolutę facultatis no

mine id acciderit, si prius memierimus, quomodo p̄ bonā valetudine volētibus nobis vrina excernatur. Musculus cervicē vesicæ circundās, ab actione quiescit, fungēte tum vesica suo munere, musculi autē actio, voluntatis nostrę īpe-riū imitat̄. at vesica naturaliter agēs, volūtati haudquāq̄ obedit. Namq; in cōmentarijs de natura libus facultatibus iam declaratum est, in oībus fere corporis particulis esse vim qua excrementa secer-nantur. Hæc quāvis semper ipsis assit, non tamen vtuntur ea, nisi cum molestātur ab excrementis. Quę si aliquādo fuerit affecta, fieri potest vt vrina supprimatur. Proinde si hominem ita figuraveris, vt declivis sit cervicis vesicæ positus, ab manibus tumorem præter naturam cōprelleris expelletur vrina. Quod si ita faciēdo nihil p̄feceris a causa q̄ resoluta vis esse putabatur desisteret, atq; vrinę fistulam constipatā

b m̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

esse suspicari oportet. quippe musculus ei circumdatus, si resoluitur, ipse non cohibet, sed præter voluntatem emissæ vrinæ causa est. ¶ Itaque quot modis contingat vrinæ meatū (quem vterā, id est vrinæ fistulam vocāt) si pari deinceps considerandū est. Equidem trifariā eos accipiendos censeo. Aut enī corpus ipsius in tantum tumore præter naturā attollitur, vt meatus inde occupetur. Aut aliquid ei præter naturā, vt vel caruncula, vel callus innascitur. Aut a re quapiam obstruitur meatus. Corpus ipsius ad insignē tumore attollitur, si vel inflammatione, vel scirro, vel abscessu, vel alio quouis tumore fuerit affectū. ¶ In meatu caro quidem oritur, si præcesserit vlcus, alia vero res longo tēporis spacio ex crasso lētoque humore paulatim nasci potest. ¶ Obstruitur meatus, vel a lapide, vel grumo, vel pure, vel crasso lentoque humore. ¶ Igitur hæc

omnia distinguere oportet, non
solū ex præsētibz accidētibus,
sed etiam ex hīs quæ præterierūt.

¶ Age igitur subñciamus vt puer
laboret. apparuerint vero antea
lapidis indicia, vrina quidē aquæ
similis, in qua subsident fabulosa
quædam, ipse insuper assidue pu-
dendum scalpat, idque vel laxū,
vel intentū præter modū, postea
vrina derēpēte supprimatur,
nunquid optima ratione coniece-
ris, huic lapidem in vesicæ ceruicē
incidisse? Itaque supino figu-
rato puero, vt crura reliquo cor-
pore sint sublimiora, multifariam
ipsum concuties, sic enim feceris,
vel lapis ex meatu recedat. Qui-
bus peractis, iube vt puer vrinā
reddere tentet, id si bene succe-
sserit, profluatque vrina, præter ex-
actam causæ notitiā, curationis
quoq; modum inuenisse te, haud
dubia erit cōiectura. Quod si ni-
hilominus vrina supprimi, rursus
concutere, sed vehemētius, atq;

b iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

*borat
algaria
chirurgi*

si sic quoque permanferit, tum de
missa ænea fistula, Græci cathetes
rum vocant, simul & lapidem à
vesicæ ceruice repelles, vrinam
euocabis. ¶ At nulla lapidis nos
ta retentam vrinā præcedente, si
sanguis efluxerit, par est, vt gru
mus vrine fistulam obturet. At fi
eri potest vbi vlcerata est vesica,
vt paulatim in ipsa grumus cons
crescat: vel non præcedēte sangui
nis fluore. Accidit autē vt sāguis
ex renibus per vreteras in vesicā
defluēs, grumū efficiat. Atque velu
ti ad has coniecturas, ita vbi vel
pus, vel crassus lentusque humor
meatū obstruxit, haud inutilis est
ænea fistula. In huiusmodi vero
coniecturam, ex præcedentium
notitia inducimur. etenim siue
vesica, siue renes, antea affectu a
liquo laborauerint, per quem tale
tantumque pus colligi potuerit,
vt par sit ab ipso meatum fuisse
obstructū, probabiliter conijcies,
hanc ob causam vrinam suppres

mi etiam si in parte aliqua renibus
 superiore fuit abcessus, quo erupto,
 haud absurde pus in renes transſu-
 ptū eē putaueris. ¶ Quid si nihil
 huiusmodi præceſſerit, victus ra-
 tionē inquirere oportet, an in ocio
 educatus, multis cibis crassos viſ-
 cososq; hūores generare potentia
 bus, fuerit vsus. ¶ Sic etiā vbi ob
 carūculā aliquā ab vlcere innatā
 vesicę ceruicē obſtructam eſſe pu-
 tamus, & ex præcedentibus vlce-
 ceris notis, & ex eo q; demissa æ-
 nea fistula, vrina vacuatur, itelli-
 gere possumus. nā & hūc affectū
 aliquādo vidimus, q;ppe demissa
 fistula dolorē mouet, in ea videlicet
 cet meatus parte, vbi antea vlcus
 eſſe cōſciebamus fractaq; sub fistu-
 la carne, sequuntur cū vrinæ ex-
 cretione, & cruor, & carnis frag-
 mēta. ¶ Hæc diximus ad institutū
 opus p;prie pertinere. Cōstat au-
 tē, vt paulo ante citata a nobis q;æ-
 stio dialectica dūtaxat sit, q;q; ni-
 hil ad artis opa cōducatur. id enī vt

1770
9 2 20
GAL. DE LOCIS AFFECT.

lesuerit, vt cognoscamus meatū
esse obstructum a grumo, si ita cō
tigerit, aut lapide. At quærere
vtrum affectum esse meatum, an
causam suppressæ vrinę in mea-
tu contineri, dicendum sit, nihil
ad artem vtilitatis conferre pos-
test. ¶ Itaque non possum non mi-
rari, quo pacto Archigenes in hu-
iusmodi cōsideratione tantum tē-
poris collocauerit, quippe conscri-
psit quædā de his rebus, sed adeo
obscurè vt intelligantur a nemia-
ne. ¶ Igitur rursus propositū ser-
monem resumendo, consequen-
tia tractemus. quomodo scilicet,
tum ex præcedentibus, tum præ-
sentibus accidentibus, causa, cur
vrina reddi non possit, deprehē-
datur. Percussus ergo quidam in
ea parte, quæ femen appellatur,
(Græci perineon dicunt) inflama-
tione suborta in vulnere, vrin-
am reddere non potuit. ac vesi-
ca ipsa, vtpote plena, manifeste
secundum circūscriptionem in-

Vena scilicet, dolorem sedat.

LIBER 1. 14

tenta videbatur. Huic, ne irritaretur inflammatio, æneam fistulā adhibere volumus, sed calida aqua fouere, ac oleum circumfundere, satius esse putauimus. quumq; tribus horis sic eum tractassemus, tumore non parum relaxato, ac dolore, vt ipsemet fateretur, non ita grauiter infestante, iussimus, vt vrinam reddere tentaret, interim quum nos vesicae tumorem, ad inferiores partes impellendo, sensum premereamus, iuuenis vrinā reddidit. Atque in his qui sic afficiuntur, causa suppressæ vrinæ, facile apprehenditur. quamuis in alijs quibusdam nō adeo manifeste dinoscatur. In quibus artificiosa cōiectura ab omnibus vocata, nobis perquam utilis est, vtpote quæ inter exactam notitiam, & omnifariā ignorantiam, media quodā modo putatur. Proinde fieri nō potest, vt i omnibus morbis colligantur notæ, quibus, vt empirici, id est

*q. mat. m.
ol. m. s. g. m.
illud ad
sc. p. s. am.
ad. ad. d. i.*

GAL. DE LOCIS AFFECT.

experimenta iactantes, sentiunt,
evidenter quisque affectus discerni
possit. Sed verissimum est id quod
Erasistratus dicere solebat. Opor-
tet (inquit) hominem exercitatis
simae considerationis esse, qui vo-
luerit non solum affectus ipsius quas-
sitatem, sed affectum quoque lo-
cum probe dinoscere. Verum ut ad
huiusmodi exercitationem decen-
ter perueniamus, haudquaquam
quaerendum est, an dicere opra-
teat, vesicae ceruicem, si vel a la-
pide, vel grumo obstruatur, affec-
tum esse, aut ipsa non affecta, acti-
onem ipsius laedi. Igitur in huius-
modi quaestionibus ad artem omni-
no superuacaneis Archigenes ver-
sari consuevit. Alii vero ultra haec
procedentes, ne laedi quidem acti-
onem dicunt. fieri enim videtur,
musculo scilicet qui vesicae cer-
uicem abit, laxato, ipsa vero vesica
contracta in se urinam exprimente, sed
concurrente musculorum suminis au-
xilio. Quum itaque & vesica citra

noxam munere suo fungitur, & muscoli volūtatē īperio sic obedīūt, vt supiores ītēdātur, is vero qui ceruicē circūdat laxet, quomodo (inquiūt) recte poterit alius quis suspicari, noxam esse actioni illatā? Quapropter supprimi vrinam dicere cogūtur, nō lāsa, sed īpedita meiēdi actiōe, tanquā arti medicinæ opē ferāt, si vocabulū lādi, trāsmutātes, impediri dixerit. Sed huiusmodi quēstiones (vt diximus) ad dialecticā p̄tinēt. ac ad mētis exercitationem magis, quā vel ad affectus ipsius dinotiorē, vel sedis affectæ īuētiorē accōmodant. Verū ea, quā nup̄ p̄posuimus, ad īstitutū opus p̄prie p̄tinet. Intelligit autē x ipsa, quod in primis per artē secandi corpora accurate cognoscere oportet, qualis sit cuiuslibet partis essentia. deinde vero & actionem, & societate quam cum proximis habet, quæ etiā in positionis vocabulo comprehenditur intelligere.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Quippe cuiuslibet partis vsus, ad
affectuum locorum inuentionem
magnifice conducit. ¶ Actio enī
motus est partium, factiuus. vsus
vero omnibus insunt, vel nihil a-
gentibus. Ergo, quod ad vrine
redditionem pertinet, excretionis
actio fit à vesicę cōpressionē, cō-
currente interdum musculorum
abdominis auxilio, quum videlicet
admodum exiguum continet
vrinam, aut vesica ipsa infirma
est, reliquę vero ptes omnes, vtis
les sunt ad actionem, nisi enim ve-
sica ipsa, cum toto spacio sic figu-
rata fuisset, ac ceruix ipsius tota
fuisset perforata, descendissentq;
obliquę in ipsam vretere, frustra
habuisset comprimendi motum.
Ex horum itaq; notitia, & affectu-
rum partium, & affectuum ipsorum
notitia, deprehēdi potest, non ex
ea quęstione, qua iuestigatur, v-
trum dicere oporteat, obstructū
instrumentum esse affectum, an
omnino noxa carere. ¶ Haud abs

similis huic est alia quæstio, & qui-
 dem de affectis iam partibus, sed
 quibus nondum inest propria dis-
 positio. Vocant autem propriam
 dispositionem, quæ separata causa,
 quæ ipsam fecit, permanere potest.
 Hac igitur consideratione rursus
 dicunt nonnulli, nequaquam affici ca-
 put, per eos capitis dolores, qui à
 bilioso humore in ventriculo con-
 tento proueniunt. quod per vomitum
 eieciabile, protinus capitis dolor
 quiescat quemadmodum si post
 vomitum nihilo minus perman-
 serit, tum affici caput, Idque multo
 magis, quam similia suffusioni acci-
 dentia, oculos infestant, cumulas-
 tis in ore ventriculi excrementis.
 hæc enim veluti umbras quasdam
 esse affectuum. ¶ In omnibus his
 quæstionibus plurimum occupa-
 ti præcessores nostri, per quæ pauca
 de affectorum locorum notitia scrip-
 serunt. Nos vero diuersa inceden-
 tes via, exercebimus, aut (ut di-
 xerit quæspia) instruemus studiosos,

GAL. DE LOCIS AFFECT:

vt sedes affectas dinoscere possint.
¶ Igitur quemadmodū paulo ante
propositum est, q̄ intenta vesica
homo urinam reddere nō potest,
ita impræsentiarum subñciatur,
citra vesicę tumorē urinam sup-
primi. ergo necesse est, quum sic
retenta est urina, vel vteretas,
vel renes eē obstructos. Quapro-
pter rursus hic itueri oportet, nū
anteaq̄ supprimeretur urina, aut
lapidis, aut alterius cuiuspiā mali
precesserint accidentia, neq̄ ne-
gligēda est vniuersi corporis dis-
positio, vt possimus, quo ad artis-
ficioſa coniectura permiserit, dis-
tinguere, vtrum in ipsis renibus
a lapide, vel crassis humoribus, fu-
erit obstructio, an i vocatis vres-
teris (id est meatibus) qui a reni-
bus ad vesicā protenduntur. Ars
que sunt quædam quæ ad exquisi-
sitam perducunt notitiam, veluti
paulo ante dicebamus, de his quæ
affectæ essentię proprietatem de-
clarant. Alia artificiosa quadam

coniectura deprehenduntur. At quia sophistę compendioso sermone confutari non possunt, idcirco Asclepiadem in presentia præterimus, vtpote absurda scribentem, atque iam alibi de vrinę in vesica collectione detectum. ¶ Porro ea quę de principe animę vi, scripta sunt, omnes dissectores damnaresolent, existimantibus quibusdā ipsā in corde consistere. Quippe Archigenes ab hac opinione haudquāq̃ dimoueri potuit, quīs detegeretur. cum per alia multa, tum maxime per ea, quę in phreniticorum, lethargicorumq̃ curatione videntur, verum tū sursum, tum deorsum sermones suos conuertit, vt modo hoc dicat, modo illud, nihil omnino declarans. Atq̃ huius generis est tertius Archigenis liber, quem de locis affectis conscripsit. ¶ Nos vero principem animę vim, ī libris de Hippocratis, Platonisq̃ placitis, magna ex parte absoluimus. Proinde

GAL. DE LOCIS AFFECT.

hac veluti demonstrata, affectarū
 partiū cōtēplationē perficiamus,
 atq; id quod ōnibus affectis, tū pti
 bus, tū locis, cōmune est, nō in di
 alecticā, sed necessariā quēstionē
 porrectū, iā enarrare aggredior,
 quæ scilicet sit ppria particula, p
 quā q̄q; corporis animati ps, acti
 onem suā perficiat. Quippe acti
 onem lædi necesse est, instrumē
 to ipsam efficiente quomodolibet
 affecto. Atque interdum facile affe
 ctus soluitur. adeo vt simul atque
 opifex caussa fuerit separata, ipse
 quiescat. interdum tanta est soluē
 di difficultas, vt diutius pmanere
 possit, caussa etiam ablata. Accis
 dit autē nonnunq̄ vt efficiēs caus
 sa pertransiēs, non firmū in par
 tícula faciat affectom, quem Ars
 chigenes vmbra affectus vocare
 cōsuevit. Veluti cū suffusioni simi
 lia quēdā oculi imaginantur, col
 lecto in ore vētriculi tenui excre
 mēto, vnde vapores quidā suble
 uati, dein circūuēti a visifica facul

tate, similes imagines mouēt, quales p suffusiones apparere cōsueuerūt. Idq; maxime eueire solet ijs quibus oculorū humor exquisitē purus est, aut visifica facultas quā facillime sētīt. Eandē ob causam, vbi sanguinis fluor, aut vomitus per morbos expectat, huiusmodi accidentia interdum apparēt, de quibus Hippocrates in p̄sagijs hūc in modum scripsit. Si cuipiā, iquit, in nō lethali febre, caput dolet, aut ante oculos obscura quēdā obuersātur, aut cordis dolor accidit, is bilē euomet. Ac paulo post. Quibus vero in huiuscemodi febre, caput dolet, oculi vero obscuras illas imagines non vident, sed caligatiōe hebetātur aut splēdentia quēdā ipsis obq̄ciunt, ac p̄ cordis dolore, in alterutra pte, p̄cordia tenduntur, neq; dolore, neq; inflāmatiōe infestāte, ijs p̄ vomitu sāguis e naribus effluet, Hęc est verborū Hippocratis series, qbus docuit sepe nūero cōtingere, vt ab

c q

GAL. DE LOCIS AFFEC.

humoribus i ventriculo collectis,
imagines quædam oculis obijciā-
tur, Quod si nihil omnino ab hu-
moribus ascendat ad oculos, quæ-
admodum vbi vel ad aurium, vel
narium meatus, vel etiam ad lin-
guæ corpus, id quod ascendit trās-
fertur, nullum huiusmodi accidē-
tium euenire solet. Vnde manifes-
tū est q̄ oportet oculos p̄ticipes
fieri eius dispositionis, quæ vētris-
culum infestat, si videndo debeat
animal errare. Cum itaque rursus
dicat Hippocrates, quibus deiectiones
biliosæ exeunt, surditate sus-
perueniente finiuntur, & quibus
surditas præcesserit, desinit, si de-
iectiones sequuntur biliosæ. Quis
est autem adeo demens i terpres,
vt omittat i huius sermonis enar-
rare aurium affectum? Aut tū di-
cat nasci surditatem, quum bilis,
quæ antea per aluum vacuari cō-
sueuerat, ad oculos efferatur? Igit̄
semper icipere oportet a lēse ac-
tionis instrumento; deinde querere

quis sit noxę modus, vtrũ videlicet dispositio permanēs, an adhuc fiēs, ita vt perleuerare nõdũ natũ sit. Quod si nunc quoq; fiat, vtrũ causa quę affectum efficit, in ipsa parte contineatur, an per ipsã trãseat, inuestigandum est. Etenim arefacto immodice humore (quẽ crystalloidem vocãt) perseuerãs erit noxa, & essentia ipsius proprius affectus. si vero crassus humor in pupilla constiterit, essetia quidem nondum læditur, verum accidentis causa in oculo ipso cõtinetur. Sed tũ per ipsũ transire dicitur, cũ euaporans humor cõsistit in ventriculo. Qui vero partem quampiam tunc solum arbitratatur esse affectam, cum in essentia ipsius permanens fuerit dispositio legislatoris munere, qui proprijs nominibus ppria significata instituit, fungi videtur. Nam vbi vehemens dolor intestinum manifestat, firmato in vna quapiã pte dolore, vt quasi perforari videat,

c in

patris

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quo pacto, vel nequaquam affici intestinum, aut affectum in ipso non esse quis dixerit? quavis interdum huiusmodi dolores ex creto vitreo quodam humore, vel unico temporis momento finiantur. Neque alia ab hac doloris causa tunc credi potest, idque ob naturale quoddam axioma (id est enuntiaturum) quod ex seipso ad huiusmodi ditionem, fidem habere videtur. Id enim quo tangente afficimur, & quo separato quiescit affectus, causam esse, apud omnes homines, in confesso est. Sic enim & igne vstigationis, & gladium sectionis causam esse, credimus, atque de singulis alijs similiter dicendum est. Ergo vacuatum humorem, infestantis mali causam fuisse, quo tempore in particula continebatur, putandum est. Sed an ob id quod vehementer infrigidat, aut calefacit, aut in totum per intemperaturam locum molestat, aut quia per continuas partes transit, eas ad excretionem

*Vitreus
Humor
quod vitreo
excreto
similis sit*

Axioma

vi quadam excitans, aut ob flatu-
 osum spiritum ab eo exortū, qui
 continentē partem extēdere pos-
 test, aut quia violenter impactus
 est, aut quia erodit, & mordet, nō
 dum ex euacuationis ope manifes-
 tum est. quippe id solum cōstat,
 quod cum continebatur, molestia
 am inferebat. Igitur non solū pu-
 tare oportet, huiusmodi humorē
 esse causam doloris, verum par-
 tem quoque in qua continetur, tā-
 tis per esse affectam, quoad ob hu-
 moris presentiam dolore crucia-
 tur. Sic etiam affici aliquem dicis-
 mus cum aliquid extrinsecus inci-
 dit, vel calefaciens, vt ignis, vel
 refrigerans, vt nix, vel contuna-
 dens vt lapis, quo separato protiz-
 nus finitus fuerit affectus, nemine
 propter hoc dicente, partem non
 fuisse affectam, quod in ipsa nulla
 sit derelicta dispositio. Sic enī sēp
 vtimur & nomine affectus, & ver-
 bo affici. Proinde dicēdis animū ad-
 hibe, quo vtilitatē, tū ī p̄lagio, tū

GAL. DE LOCIS AFFEC.

in curationis ratione consequaris. Quippe nonnunquam a causa quapiam oritur affectus, sed ita oritur, ut separata causa haudquam permanētē habeat dispositionē. interdum autē partim iam factus est, partim etiam dū fit. Sepe numero, quāquā fieri desinit, ablata causa, perseverās tamē manet dispositio. Veluti ī dysēteria, mordax humor causa est affectus, ut apote qui ab initio & absterget, & abradit, deī tēporis tractu ulcerat intestinū. Quod si anteaquā vlcus induxerit, egredi desinat, affectus ipse nōdū dysēteria dicetur. Sive ro vlcere pōccupet intestinū quis humor finiatur, non tamen simul finitur affectus. At vero nihil nos molestat in præsētia, sermo paulo añ prēmīssus, quē etiam foretē (id est acerualet) vocāt. quippe multa ad vitā haud inutilia, cōmunē ex ipso sortiūt dubitationē, de quibus priores, tū medici, tū philosophi, locuti sunt. proinde etiam sua

peruacaneum esset ea nūc percur-
tere, mihi præsertim, qui pro-
posui hanc ipsam artis particu-
lam ostēdere dubiam. Intetim es-
nim cū domus sit, nondum est do-
mus, sed tum domus est, cum tota
domus facta est. An vero de quo-
libet morbo, dum sit, sed nondum
factus est, eodem modo dicendum
sit, haud ab re quæritur. neque es-
nim omnium quæ fiunt eadē ratio
est. quippe res similes, nullā na-
turalem figuram requirentes, p-
tinus ab initio eadem constant es-
sentia, dissimiles vero, & quibus
varia est forma, essētiā gñatione
posteriores habere possūt. Neq-
enim quum domus construitur, si-
mul fiunt fundamenta, parietes,
fastigium, tegulæ, ianuæ, fenestræ
ex quibus omnibus quodammodo
compositis, atq; in vnam formam
reductis. domus ipsius essentia cō-
posita est. Morbus vero & calis-
sus, & frigidus & humidus, &
siccus, protinus ab initio, cum

GAL. DE LOCIS AFFECT.

primum corpus, temperaturę quę bonę valetudini debetur, limites excessit, eandem sibiñpsi naturam habet. Quamuis enim interdum adeo sit exiguus, vt neque a nobis cognosci, neq; laborantium sensu percipi possit, nihilo minus tamen propriam habere speciem censentur. Haud aliter inflammatio quoque in quacunque animalis parte constiterit, siue maxima, siue minima fuerit, vnus atque idem erit affectus, non specie quidē sed magnitudine varius. Cæterum quod possit aliquę affectiōes in corpore consistere, adeo exiguę, vt non appareant, argumēto est gutta lōgo temporis tractu saxū excavans, de qua recte carmen hoc proditū est. Mollior assiduus saxū cauat ictibus vnda. neque enī vel vnus, vel duo, vel tres, vel quatuor aquę ictus, saxum ferientes ac ne centesimus quidē, sensibiliter videt saxū excavare. Neq; etiam fieri potest, vt primo nihil

efficiente, alter aliquid faciat. quippe
 qui habet eandem, quā primus
 habuit, ad saxum rationem. Ergo
 si secundus ictus in saxum quippiā
 effecerit, ipsum a primo ita mutas-
 tum fuisse necesse est, ut non om-
 nino idem, quale ab initio fuerat,
 permanferit. Etenim si ipsum vn-
 diquaque idem permaneat, agens
 quoque in ipsum causa, nempe aque
 stilla, necesse est, quemadmodum
 a primo ictu non affectum est, ita
 neque a secundo. quod si fateare, ne-
 que tertius quoque ipsum afficiet (qp-
 pe de omnibus eadem ratio est)
 haud secus de quarto, & quinto.
 & reliquis deinceps omnibus, dis-
 cendum est. Etenim quoad eodem
 modo se habente saxo, eadem quo-
 que causa accesserit, nihil amplius
 efficietur. Quod si a millesimo
 ictu, sensibilis videatur in saxo
 concavitas, ad singulos ictus,
 affectus in saxo nunc primum sen-
 sibiliter apparētis, millesima pars
 referenda est. Quum itaque caus

GAL. DE LOCIS AFFEC.

ſæ agunt in corpus, ſpecies affectus ab initio eſt eadem, tamen ob exiguitatem non apparet. At vero huiusmodi affectus qui adeo ſunt exigui, ſeparatis cauſis facientibus, illico finiuntur, natura videlicet ipſos ſanante. Quippe illi duntaxat externo egent auxilio, quos ob magnitudinẽ natura vincere non poteſt. Igitur eadẽ quoque ratioẽ, quum primũ mordax humor, aliquod inteſtinorũ erodeſcit, quãuis id quod factũ eſt nõ dum videatur, nichilominus diſpoſitio ipſa ſub dyſenteriaẽ ſpecie comprehenditur. Sed vt natura, parua quẽdam vlcera, quæ nonnunq̃ eueniunt, ita & inteſtinorum abraſiones, nullo adhibito medicamento, ſanare poteſt. Hac ergo ratioẽ, falſum omnĩo eſt quod a quibusdam dicitur. Nullum per huiusmodi ſymptomata, in corpore relinqui affectum. Quod ſi verum eſſet, tamen inteſtina tũ fuiſſe affecta haudquaquẽ negandũ eſt,

quum ab acredine ex crementoz
 rum ipsa rodentium dolor notatu
 dignus euenire p̄cipiebatur. Hoc
 igitur ad om̄ia quę posthac dictu
 ri sumus, veluti elementum qđ
 dā, obseruare debetis. Sitque hoc
 initium vię, qua inueniri debent
sedes affectę, nullam actionē læs
di, nisi pars quę ipsā facit afficiat
tur. Si enim quum vel dolor, vel
 tumor aliquis eam infestat, om̄i
 nino affici dicitur, multo magis
 eam affici, læsa actione, fatendum
 est. ¶ Igitur iam supradictum est,
 qđ ab excrementorum natura, af
 fectę sedis coniecturā facere pos
 sumus. id vero bifariam fieri cō
 stat, vel ab excretę essentię pro
 prietate, vel ab his quę in ipsa p̄
 te cōtinentur. Similiter diximus
 ab innatis interdum rebus, de lo
 cis affectis coniecturam sumi pos
 se. Item ab accidentium quoq; ge
 nere, quę quidem non medioc̄rē
 habent inter se differentiam, sed
 hanc postea explicabimus. ¶ Nūc

GAL. DE LOCIS AFFECT.

vero rursus ad principium sermo
ne reducto, in singulis partibus tē
temus iuenire notas, affectus earū
indicātes, tum eos qui in ipsarum
essentia consistūt, tū illos qui ipsis
veluti instrumētis accidūt. Rur
sus separemus & discernamus a fa
ctis iam affectibus, eos qui etiā dū
fiunt, & qui nondū pertinaciter
inhærent. Item causas quę in af
fecta parte continentur, ab iis quę
ea tanquā via duntaxat vtūtur.
Quod vero ex iis alij componā
tur modi, satis constat. Præterea
distinguere oportet eos qui per cō
sensum accidunt, a propriis. nam
magis proprium fuerit idiopathi
an, id est proprium affectū, q̄ (vt
medici solēt) protopathiam, id est
primariū affectum, nominare, ve
luti ex aduerso diuiso affectu per
cōsensum a proprio. Ergo qui p
prie vocabulis vti voluerit, pri
mogenio quidē affectui, secundar
ium aut posteriorem, opponet.
Ei vero qui per consensum infes

stat, proprium. Quamquam sepe numero contingere potest, ut aliquis simul & per consensum, & propria affectione laboret, cum in affecta particula permanens sit dispositio. Neque enim primario, sed secundario & proprie, ipsam tum affici dicemus. Id vero haud obscure in partibus externis videri potest. quemadmodum in corpore pleno, oborto ingenti pano ab ulcere, quum inductum fuerit vlcus cicatrice, permanet etiam dum panus, vel in suppuratam inflammationem transiens, vel durum tumorem quem choerada, id est strumam, appellant. At nemo primarios dixerit huiusmodi morbos, qui ob alium praecedentem euenerunt, quippe per consensum facti ad huiusmodi permutantur idiopathian, perinde ac si protinus ab initio protopasthia (id est primaria affectio) ipsis accidisset, Caeterum in praesentia non inutile fuerit, meminisse

GAL. DE LOCIS AFFECT.

eorum, quæ in libro de medicis
nominibus diximus, vbi de si-
gnificatis est sermo, quæ pessima
me a recentioribus tum medicis,
tū philosophis confunduntur. Vt
enim affectio & actio diuersæ sūt
voces, ita diuersus quoq; est earū
vsus. Quippe id agere dicit, qd
ex seipso motum obtinet. Affici
vero, quod motum habet ab alio.
Quum itaq; duo sint motus ge-
nera, alterationis, & lationis, vbi
ad permanentem dispositionē al-
teratio peruenerit, sitq; dispositio
scilicet præter naturam, morbus
appellatur, quāuis per abusionem
interdum, eandem dispositionem
nonnulli affectum nominent, qui
si more Græcorum patrio nomine
vterentur, partes ipsas potius af-
fici dicerent, quum motum susti-
nent præter naturam, quum vero
dispositiones habent præter natu-
ram, si proprie quis loquatur, æ-
grotare eas potius, q̄ affici dicet.
q̄ si ab vsu recesserit, non solum

agrotare, sed affici quoque dicere
 poterit. Equidem quod semper di-
 cere consueui, nunc quoque dicam:
 quod in ea doctrina, qua de arte
 quapiam agitur, satis est, si quis vos
 cabulum atque significatum eius,
 pro doctoris voluntate proferes,
 procedat deinceps ad rerum enarra-
 tionem. Admonui autem nunc
 significatorum, eo quod nonnulli, non
 solum patriorum vocabulorum si-
 gnificata peruertunt, verum etiam
 eos qui recte ipsis uti tentant, cas-
 luntia prosequuntur, de quorum nu-
 mero sunt hi quoque, qui dicunt, is-
 terdum lesa actione, partem ipsam
 non laedi, eo quod nondum permanen-
 tem habet dispositionem, veluti
 ubi propter humores in ventricu-
 • lo contentos, caput dolet. Quod si
 commutata ratione, si de nominis
 bus certare desieris, magis proprie
 interpretando dices, affici quidem
 caput, quando ventriculo con-
 sentit. agrotare vero caput, cum
 scilicet proprio affectu laborat.

d

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Similiter ventriculum affici quidem quū a vitiosis molestatur humoribus, ægrotare vero, aut per propriā intēperiē, aut quū inflammationē, vel vlcus, vel abscessū habet præter naturā. Quod si ōni no accuratiori scrutinio volueris huiusmodi quæstiones enodare, interdū simul atque alimēta fuerint corrupta, coctiōis quoq; actiōem lēdi dices. Interdū hāc quidē non lēdi, illa vero est vitata. Quippe corruptiōis ciborū tres primæ, ac veluti generalissimæ sunt differētiæ. Vna quidē fit per proprios ventriculi morbos, Altera a vitiosis humoribus in ipso accumulatis, Tertia ab alimētorū qualitate induci. Hęc igitur quū suapte natura, vel vaporosa, vel acida, aut fœtori, aut putredini, aut omnino corruptioni, fuerint obnoxia, aut ex præparationis modo, ad huiusmodi dispositionem aliquā deducta, certū est ea in ventriculo corrumpi, atque hoc modo cruditatē

fortasse fieri dixeris. Sed oritur pro-
 tinus discordia, nunquid afficiatur
 tum ob hęc concoquendi facultas,
 quippe nonnulli per huiusmodi cru-
 ditates eam haud quā affici con-
 tendunt. Alij vero e contrario.
 Atque inuenitur tertia quoque ses-
 cta, eorum qui huiusmodi alimen-
 ta in crudari negant, quamuis ea
 haud quā cōcocta esse fateantur,
 tanquā non sit idem, per negationē
 aliquid enunciare, aut per priua-
 toriam vocatā a dialecticis dictio-
 nē, Idem intellexisse Erasistratū
 puto. quum acinos, & sesama, &
 reliqua omnia quę omnino incor-
 rupta, & immutata deſciuntur,
 nullam dixit indicare in animalia-
 • bus factam esse cruditatē, sed hoc
 ipsum duntaxat, quod non essent
 cōcocta. Igitur ut in his quidē ea
 quę propria sunt non negligere,
 ita ea quę ad effectū sedis notitiā
 conferunt, accurate considerare
 oportet. Hinc enim & id quod fu-
 turū est præſagire, & affectū iam
 d n

GAL. DE LOCIS AFFECT.

factū decēter curare potestimus,
itaque sine cōtentiosis nominibus
ex rebus ipsis vtilitatem cōsequi
licet hoc modo. Esto vt quispiam
mane exurgens dicat, fumosū se
ructum emittere, aut aliquid hu-
iusmodi, vt ab ouis frictis, aut alia
quapiam re foetente, & putri. Ille
itaque qui fumosum ructum per-
cepit, fateatur se a cœna placentā
nidore plenam comedisse, quales
sunt quæ ex oleo & itrñs & alijs
huiusmodi preparantur. Alter ve-
ro confiteatur, fricta oua ingessis-
se, atq; nūc illorum nidorem eru-
ctare. deinde alius complures radi-
culas comederit, vt foetens putris
que exeat ab eo ructus. Igitur cis-
bos in hīs nō bene fuisse concoctos
nemo negat. Quis ex hac re ven-
triculus haud quaquam fuerit affe-
ctus, neque etiā quod ad ipsius ra-
tionem pertinet, circa actionē er-
rauerit, haud aliter quam vbi qs
integros acinos per aluum deiece-
rit, si enī humani ventriculi officia

cium esset acinos trāsmutare, accusaremus ob hoc ventriculi corpus, ipsumque vitiatum esse putaremus. Cū vero id sui muneris nō sit, sed acinorum essentię accidat, vt concoqui nequeant, haud ab re dicemus, hos quidem non esse cōcoctos, ventriculi vero corpus naturaliter sese habere. Quippe hoc & nosse, & definire ad medicum haud inutiliter pertinet. Sed querere an dicēdum sit actionē ipsius per huiusmodi excrementa fuisse lāsam, an contra, ad medicæ artis opera superuacaneum est.

¶ Age rursus vt quispiam fumosū ructum emittat, nimirū huic igneum quendam calorem in vētriculo esse dicemus. Ac deinde rursus distinguēdo inuestigabimus, vtrum ab intemperie corporis ipsius ventriculi, hoc eueniat, aut a flauabile, eaq; vel in ipsius spacio contēta, aut in tunicas, ita vt vix abstergi possit, demissa. At ne hic quidem cōsistemus. Nam querere

d in

GAL. DE L'OCIS AFFECT.

oportet, an iecinore male suo officio fungēte huiusmodi humor accumuletur, an is ex vniuerso defluat corpore, An etiā in ipsomet gignatur vētriculo. Hęc sūt cognitu perquam necessaria, sed quæ viro indigent exercitatæ considerationis, qui res ipsas potius quam nomina quibus explicantur scire studuerit, vt enim corruptionis, proprietas efficientem causam asperte indicat, ita difficile est ipsius generationem, præfinita ostensione manifeste iuenire. Igitur si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutantur, efficiens causam calidā, Si vero saporem acidum referunt, eam frigidam esse necesse est. Sed nō protinus constat, vtrum intemperies aliqua, an vitiosus quispiam humor, ventriculi corpus infestet. Proinde distinguendū est. quippe dare oportet cibos qui suapte natura modo corruptiōis quā maxime aduersentur, vt panem aut chōs

drū (si contigerit) illis qui in fu-
 mum transmutare cibum cōsue-
 uerunt, mel autē his qui acidum a
 cibo saporem percipiunt. Deinde
 considerare excremēta, tū ea quę
 vomuntur, tum quę per aluū de-
 ſciuntur, num humor aliquis, cū
 illis quidem biliosus & calidus, cū
 his vero pituitosus ac frigidus, si-
 mul excernatur. An nullo vacu-
 ato humore, ipsa exiguam quan-
 dam mutationem habeāt. Quip-
 pe vbi igneo calore ventriculus
 infestatur, panē aut chondrū sine
 humore deſci videbis, p̄q̄ exigua
 in ipsis facta trāsmutatiōe. Quod
 si humor quoq; deſciatur, qui ci-
 bū corrūpere poſſit, vidētur cibi
 in huiusmodi humore submersi,
 et ab ipsius act.ōe manifestius alte-
 rati. Id quod a vomitione clarius
 discernit̄, si laborās suapte natu-
 ra facile vomere poſſit. Nā coge-
 re eū q̄ vomere nō potest, absur-
 dū est, Atq; hęc ita dephēdunt, si
 in spacio vētriculi noxius humor
 d iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

contineatur, Si vero in tunicas ipsius transmittitur, vt ad calidum nausea, & sitis vehemens consequitur, ita a frigido ciborum cupiditas excitari solet. Verum considerare oportet, vtrum illæsum sit epas, an affectu quoque laborat, & qualis sit ipsius affectus, vtrum calidus, an frigidus. Haud secus de splene quoque, quippe ex horum omnium consideratione, simul cum quotidiana ciborum potionumque experiētia, exquisitè poterit quis inuenire, non solum locum affectum, sed etiam ipsius dispositionem. Hec autem notitia eo est vtilior, quo facilius curatiōis proprietas per ipsam figuratur. Etenim calida dispositio, vbicunque fuerit, semper refrigeranda est. Sed quousque, aut quomodo, aut qua materia refrigerare cōueniat, locus affectus cōmonstrat. Igitur si idipsum quod molestat, nihil aliud fuerit quam in temperatura, calidam refrigerando, & frigidam calefaciendo, illico

iuueris hominem. Neque nudam duntaxat opinionem. verū etiam scientiam, & quidem haud obscuram, susceptę habebis coniecturę, idque multo magis, si vtriq; ipsā examinaueris, refrigerantibus tū medicamentis, tum victus ratione, videndo hominē sanari, a calidiorificis vero lēdi. ¶ Quod si humor quīspīā in ipsis ventriculi tunicis contineatur, nausea quidem vexabit, sed inanis, & sine vomitu, & quę irritat duntaxat, nullū humorem euacuans, quēadmodū fieri solet, vbi secundum internā spatī latitudinē, in vētriculo humor continetur. ¶ Cāterū ructus ab alijs acidi, ab alijs fumosi emittuntur. Auxiliatur autem illis quidem medicamētum ex tribus pīparis generibus institutum, aut aliud, quod huiusmodi habeat facultatem, ex aqua vel vino epotum. His vero, tum absynthium, tum hiera ex aloe facta, quam nōnulli picram quoq; appellant. Igitur si

*vel
diapoli-
tron.*

GAL, DE LOCIS AFFECT.

per primā p̄tinus experiētiā, a familiaribus medicamentis, in vtroq; humore, manifestū videat̄ auxiliū, simul habebis, & notitiā artificiosā, & modum curationis. si enim ipsis vti perseueraueris, homo sanitati restituetur. Quod si a solitis auxiliari medicamentis, vtranq; dispositionē noxa cōsequatur, deceptū te circa notionē inuenies. Quippe certissima omnium huiusmodi dispositionū notitia, ab his deprehēdit̄, q̄ intelligūt, quibus quaelibet præsidijs, ad bonam valetudinē reduci possit. Sic equidē quosdā colicos vocatos sanaui, dato ī potu medicamēto ex aloe, q̄ p̄pe cōficiēs, mordacē humorem ad affecti intestini tunicas de fluxisse, dato medicamento, speraui omnino huiusmodi dispositionem fore quietiorem quod vbi contigit, intelligens recta me ductum coniectura, rursus plus ipsius exhibui. Sed quid me ad hanc coniecturam promouerit, operæ precium

fuerit enarrare. Vidi hominem a
calidis, tum cibis tum medicamē
tis, ab omni calorifica iētus rati
one irritari, rursus iuuari ab a
limentis boni succi & temperatis
nominatis, Insuper in diem ei no
xam inferre. doloris vero speciem
percontanti mihi, mordacem es
se, respondit. qua de re multo ma
gis sperans, ad veram me perue
nisse notiam, ausus sum amarum
medicamentum ei exhibere. Pos
tremo conspiciens hominem mi
rifice adiutum, quæ fuerit dispo
sitis, efficaciter me deprehendisse
putavi. ¶ Fuit alter quem cibi con
coctu faciles irritabāt. hic de præ
cedentibus interrogatus, respon
dit, se in hanc deductum dispo
sitionem, sumpto medicamento.
Rursus interrogans, quid ipsū ad
sumēdū medicamētū pmouisset,
intellexi mordaces. edacesque do
lores, multo tempore ventricu
lum infestantes, fuisse in causa, cō

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ieciens itaq; vitiatum fuisse a pur-
gante medicamento intestinum
ac dispositum ad fluxiones, vt fas-
le reciperet ex hepate redundans
tes humores, qui deinde corrump-
perentur, cibum exhibui haud ita
facile corruptibilem, & astringētē:
vñ & mordaces dolores mitigati
sunt, & nihil postea excreuit, quā
antea protinus, vt mordacitatem
sentiebat, corrupta quædam, & li-
quida, & foetentia excernere co-
geret. Quumq; multo post mor-
dicationem tempore ea deſcenderet
ad superiora intestina dispositio-
nem ipsam pertinere conieci. Ita
in alio quoque, vbi celeriter a
mordicatione sequebatur excre-
tio, dispositionem ad inferiora re-
tuli intestina. Hūc igitur iniecto
clystere, illum vero dictis iam ci-
bis exhibitis, sanavi. quippe certo
ſciebam, quod proximæ ven tricu-
lo partes, exhibitis superne, tū ci-
bis, tum potibus, quæ vero non ita
multum a sede distant, inferne in-

iectionis medicamentis, prout ad
 iuuaretur. Atque si alter quispiam
 intestinorum affectus est, distigues
 re oportet. ¶ Sunt enim notae quae
 dam affectibus propriae, quaedam ve
 ro ad partes affectus pertinent, ut
 coctio vitiosa, ventriculi est ac
 cidens. at ciborum ad fumosum
 vel acidum, ructum conuersio, ad cau
 sas & affectus ipsos referenda est.
 Sic autem de intestinis & tempus exi
 tus, & excrementorum species, atque
 accidentium differentia, cum his quae praes
 cesserunt, simul & affectum ipsum,
 & partem in qua consistit, ostendere
 possunt. Ergo age ut per ventrem
 excrementa quaedam deiciantur aliqui
 quidem rameta, aut veluti membrana
 rum rasura, aut cruentum aliquid, ac
 aliqui simul omnia, intestinum vlcere
 affectum nemo dubitauerit. At ve
 ro vtrum in exilibus intestinis, an
 crassis vlcus consistat nondum ma
 nifestum est. Sed, ut nuper diceba
 mus, & ex rasura, & ex ius tem
 pore, & ut tertium adatur (ex

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mixtione cum stercore, vt modo magis, modo minus, interdum nequaquam misceatur, distinguere oportet. Quippe infimarum partium vlcera, nullas omnino vlcum habent notas alui excrementis admixtas. earum vero partium, q̃ paulo altius collocatæ sunt, vlcera, mixtas quidē cū stercore habent notas, sed id leuiter duntaxat. Quemadmodū si multo sint altiores, vehementior erit mixtura, præcipue vero in supremis intestinis, vlcis notæ vehementer stercore videntur admixtæ. ¶ Porro accidit interdum, vt ex vno indicio, simul & locus, & dispositio, deprehendantur. aut locus, vna cum causâ, veluti locorum notæ, & ab actiōe læsa & excrementis, & positu, & doloris proprietate, & proprijs accidentibus sumuntur. Affectū vero, & ab excrementorum specie, & loci natura, & doloris proprietate & proprijs accidentibus. ¶ Sane actio læsa, affectū parat

tē indicare potest. & qdē hoc modo. si enī accidēs aliqd̄ circa cernē di officiū euenerit, oculū affici constat. verū an proprio affectu, an p̄ consensum, aut vtroque modo laboret, alia consideratione inquirendum est. ¶ Excrementorū species, affectam partem indicat, veluti iā antea dictū est, & per partium ipsius essentiā, & per cōtenta in ipsa. Ac positus quoq; affectam partem nimirum commonstrare sufficiēter potest. quippe durus in dextra præcordiorū parte tumor non lienis, sed iecinoris affecti, nota est. quemadmodum si fuerit in sinistra, non hepatis, sed splenis affectum portendit. Ac positus, interdum, vbi similiter se habent excrementa, affectam partem cōmōstrat. Si enim membranosa tunica frustulū excernatur, id vlcus esse alibi ostendit, verum in qua sit particula, ex positu discere poteris. Nam si vomēdo fuerit reiectum, aut gulæ, aut ventriculi.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

si tussiendo, gutturi, aut asperæ
arteriæ. si screando, faucium. si cū
vrina, eius fistulæ. si a sede, alicuius
ius intestinorum. si per mulieris pu
denda, vteri affectum portendit.

At vero constat, quod singuli do
lores, pro positus varietate, affe
ctum locū ostēdere possunt. Hoc
etiam pacto, ea quæ supra propo
suimus distinguere oportet, Quip
pe apparentibus per vomitum vl
ceris notis, animaduertendum
est, vtrum anteriores partes cir
ca præcordia, aut posteriores cir
ca dorsum, dolor aliquis infestet.

Etenim qui in anterioribus perci
pitur, Venter, qui vero in
posterioribus, gulam occupare cē
setur. Haud aliter os ventriculi,
a spacio ipsius distinguendum est.
si deuoratis quibusdā acribus, hoc
quod in ore ventriculi, aut in par
te inferiore mordicationē excitet,
illud vero in thoracis meatu. Oīa
enī hæc posita definiunt, quæ ad
modum alia ex doloris specie. Vc

rum de doloribus latius in secundo libro dicemus. Sed nunc exemplū aliquod afferre, operę precium videtur, quomodo scilicet affectus locus, ex proprijs accidentibus innoscatur. Nam supra diximus, singula quę vulneribus adnascuntur, propriam ostensionem habere, id vero in pręsentia subiñciendum est. Ore quidam vētriculi affecto fastidium infestat. per hepatis vero imbecillitatem, excrementa per aluum deiecta, aquę in qua carnes nuper mactatę ablutę fuerunt, simulantur. item maxillę rubrę apparent in peripneumonicijs.

¶ Quinetiam proprię affectuum ipsorum notę, in excrementis deprehenduntur. vt ramensum, vlceris. si in vrina fabulosū residet, lapidis. cucurbitę vero feminibus similia excrementa, laserum vermium indicia sunt.

Atque a locis ipsis, morborum indicia sumuntur. eo quod quibusdam solis, morbus hic accadat,

GAL. DE LOCIS AFFEC.

quibusdam vero solis, nunquam
eueniat, quippe soli oculi, suffusi-
one laborant. lapis in renibus, &
vesica, dūtaxat nascitur, atq; (vt
nonnullis placet) etiā in colo. Lū-
brici in intestinis gignūtur. Rur-
sus impossibile est, vt abscessum
cor sustineat. quemadmodū neq;
pulmo, neq; syndesmi, dolorem.
¶ Ab accidentium quoq; propri-
etate, affectuum indicia oriuntur.
Nam quibusdā per tabificos mor-
bos vngues adtruci euadunt. In-
tempestiuus horror cum febre, ī-
flammationis ad suppurationem
transeuntis, indicium est. Lingua
nigricans, ardentem febrim por-
tendit. Sic etiā coloris in vniuerso
corpore proprietates, alia quidē
per hepatis, alia vero per splenis
affectus apparet, ita vt doctū me-
dicum haudquaquā possit fallere,
sicut ne color quidem quem hæ-
morrhoides induxerunt. ¶ Cæter-
um paucae admodum sunt ipsorū
affectuum notæ, quæ non si-

mul locum affectum ostendant. Etenim vt actionum noxæ, affectam dūtaxat particulam, ita earum differentia, ipsius affectum declarant. ¶ Hæc ergo sola sunt affectuum propria signa, quæ per accidens ipsos sequuntur, id vero clarius in vniuerso huius operis discursu patebit. Necnon videntur communes quoque notæ, quæ simul & affectum, & sedē affectam, aut duos affectus, aut duas particulas indicare possit. ¶ Huic itaque libro in præsentia finē imponere statui, si de proprijs affectibus, & hīs qui per consensum eueniunt, aliquid addidero. admonēs in primis q̄ affectus, qui a reliquis medicis primarij vocantur, equidem cōmodius proprios affectus appellauerim, quanquam nihil refert, si eos primarios nominare volueris. Quippe satius est rerū differentias intellegere, quam contendere de nominibus. ¶ Sane quum vel vapores vitiosi, vel
e. h.

GAL. DE LOCIS. AFFECT.

ipsi quoque humores, a ventriculo ad caput ascendunt, mens leditur. primogenio igitur cerebrum affectu tum laborare, dicet nemo, quanquam omni affectu carere ipsam, haudquaquam defendi potest. verum id quod de huiusmodi affectibus in confesso est, quod scilicet per consensum afficiant, verissimum est. quippe ex hoc vocabulo (per consensum affici) partem non penitus ab affectu esse liberam, sed ipsam cum alia affici, declaratur. Atqui melius, clariusque enarraueris, si eam partem quae per consensum afficitur, ab altera affici dixeris. ¶ Igitur quod multi medicorum veluti somniantes obscure intellexerunt, atque ipsum utpote non intellegentes haudquaquam clare enunciauerunt, id equidem veluti instituto operi perquam necessarium, docere aggredior: inde sumpto initio. Sunt nonnullae actiones quae idonea indigentes materia, ipsam ab alijs partibus preparata,

accipiunt. qua de re interdum optima ratione fit, vt nulla existente in actionis cuiuspiam proprijs instrumentis, noxa, actionem ipsam perire contingat, defectu scilicet materiae, ex qua fieri consuevit, veluti i voce res sese habet. Nam in libro, quem de ipsa conscripsimus, ostensum iam est, quod flatus, materia quidem vocis est, & efficiunt cum commisso thorace, intercostales muscoli. Igitur in his nihil agentibus, animal vocem amittit, & quidem nullo interdum in proprijs vocis particulis, apparente affectu. Sunt vero huiusmodi partes, summatim quidem loquendo, totum guttur. Si vero particulatim explicare volueris, sunt tres cartilaginee, a tribus motu musculis, quibus accedunt nervi a cerebro demissi. Est praeterea in gutture ligula (Graeci epiglottida vocant) haec maxime proprium vocis instrumentum est. Etenim quando moderate & aperitur & committitur

c m

GAL. DE LOCIS AFFEC. .

titur, vocem efficit. quanquā vocem reddi impossibile est, nisi vehementer spiritus egrediatur. id vero, intercostales musculi perficiunt. ¶ Cecidit quidam ab alto, ita vt dorsi initium affligeretur, is tertio die exiguam admodū vocem emisit, quarto deinde die omnino obmutuit. resolutaque simul fuerunt crura, manibus omnino illæsis, sed neq; spirationem amittebat, neq; difficulter spirabat. Quum enim tota sub ceruice spina esset resoluta, accidit thoraci, vt & septum transuersum, & musculi superni, numero quidem sex, mouerentur. quippe nerui ex spinali medulla, quæ i ceruice est, ipsis adueniunt. At intercostaliū musculorum nerui, per quos flatum fieri diximus, omnes affecti erant. Quum itaq; frustra medici negotium subirent, circa crura quidē, vtpote resoluta, circa guttur vero, propter vocis affectū, equidem id interdixi, atq; affectio

don taxat loco curationem adhibui. Proinde finita tandem spinæ inflammatione, a septimo die vox restituta est iuueni, & crura motionis facultatem recuperauerunt. Huiusmodi ergo noxæ speciem, magis proprie per consensum euenire dixeris, quàm ubi ab humoribus in ventriculo contentis, caput dolore têtatur. quippe per huiusmodi dispositiones, eleuatur ad ipsum aliquid. sed in dictis nuper dispositionibus, nihil noxium ad crura defertur. Nam contra, priuatur ea facultate, quàm antea spinalis medulla ipsis suppediabat. Guttur vero, quum vox ablata est, non omnino priuatur spiritu. quippe spirare animal per ipsum, etiam dum videmus. At vero flatum admittit. qui quidem fieri solet, cum affatim plurimus spiritus per guttur animalis foras effertur. Sed de nominibus cõtendere cæteris permittamus, nobis enim res, quas illi penitus ignorant, pertractare scilicet e. uñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tis fuerit. Quippe alter dolet caput, ubi contenti in vetriculo humores eleuantur, qui simul & calare facere, & distendere caput possunt. atque aliter per suffusiones, apparerent visa quedam, neque calactis, neque intentis oculis, sed solo vapore per ipsos transeunte. Preterea aliter affici videtur is, cui meatus a cerebro descendens obstructus est. Alter ille (quamuis huic quodammodo sit similis) cui propter spinæ inflammationem resoluta sunt crura. atque aliter is, cui vox aut perit, aut vitata est. Et enim ad crura facultas quedam, sed citra essentiam, descendere prohibita est, ad oculos vero cum essentia. verum ad guttur, quamuis materia perueniat, sufficiens tamen ipsius quantitatis haudquam accedit. Qui vero ob intercostalium musculorum perforationem obmutuit, is totam vocis materiam amisit. Porro quemadmodum crura, per dictas spinæ dispo-

sitiones resoluuntur, ita etiā gut-
 tur, vocalebus nervis vel incis,
 vel laqueo interceptis (vocare au-
 tem vocales nervos consueui cos,
 quos ipse inueni. Nam præcepto-
 res mei eos duntaxat qui ad artes
 rias pertinent, cognoscebant) at-
 que ob horum quoque vitia, vox
 perire solet. quoniam propr̃ gut-
 turis nerui, quos equidem recurrē-
 tes nominare sum solitus, ipsorum
 essentia pars esse censentur. Sed
 quum ad multas alias partes distri-
 buti perueniant, nullam habeo al-
 liam magis propriam appellatio-
 nem, ea qua vocales ipsos nomina-
 ui. quippe ad instrumenta vocem
 concinantia, proprie pertinent.
 Atque idem est modus, quo gut-
 turis musculi lēdūtur, siue recur-
 rentes, siue hi qui iuxta arterias
 sūt, vitientur. vtrinque enim as-
 nimalis facultas desideratur, sine
 qua a consilio, & voluntatis īpes-
 rio, moueri potest nemo. Et quis-
 dem incis musculis, qui ligulam

GAL . DE LOCIS AFFEC.

(id est epiglottida) mouët, animal
penitus mutum euadit. sed neque
simili omnino modo, neque etiam
in totum diuerso, ab eo quo læsis
neruis, vox perit. Nam vtriusq;
noxa, hoc cum altera habet com-
mune, quod ligula continuitate,
quam ad mouens principium ha-
bet, priuatur. id vero fieri solet, si
ue neruus, siue musculus incida-
tur, aut laqueo intercipiatur, aut contoda-
tur, aut quomodolibet aliter vitietur.
Egdem vocem vitiatam fuisse memi-
ni, adeo ut pene perderetur, infri-
giditatis vehementer neruis re-
currentibus, quum per hyemem
cervix fuisset incisa. quod quum
intelligerem, caloricis remedijs
naturalem temperaturam neruis
restituens, vocem reuocaui. Cate-
rum ut ob materie priuationem,
perforato thorace, ita etiam aspera
arteria tota incisa, vox perit,
quod nullus supersit spiritus, qui ad
propriam vocis instrumentum
transmittatur. Idem efficit, sed a

lio modo, laqueus collo circumda-
tus. verum hic non solum mutū
reddit animal, sed etiam suffocat,
tollendo scilicet spirationem. Ar-
teria autē dissecta, voci quidem
nocet, sed tñ animal respiratione
nō priuat. Angina vero vocata,
quū sit internarum gutturis par-
tium inflammatio, strangulationi
proportione respondens, tolles-
re potest respirationem, ipsius
meatum obstruendo. Idcirco vo-
calis instrumēti, maxime propri-
us affectus est, ac deinceps exte-
rū ipsius musculorū noxa est. Cæ-
teras ptes omnes quarum memi-
nimus, non proprie, sed per cosen-
sum potius afficit. ¶ Quum ex cer-
uice quidā choeradas (id est strus-
mas) in profundo incumbētes ex-
cideret, vnguibus eas euellens, im-
prudens ob ignorantiam simul
recurrentes nervos distraxit, at-
que hoc pacto puerum liberavit a
strumis, sed mutum reliquit.
¶ Quidam alius, in puero alio sec-
tionem faciens, ipsū similiter sec-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

minutum reddidit, læso videlicet altero duntaxat neruo. Mirabantur vero omnes, quo pacto neque aspera arteria, neque gutture affecto, vocem lædi contingeret, qui quum vocales neruos (me ostendente) cōspicerent, admirari desiderunt. Quibus igitur partibus, vel materiæ, vel facultatis copia, non transmittitur, actionem lædi probabiliter dixeris, parte ipsam faciente nequaquam læsa. At vero si vel a vaporibus, vel humoribus aliunde ad ipsam venientibus, lædatur, eam non recte dixeris illam læsam. Neque minus etiam probabile est, partem vel materia, vel facultate priuatam, lædi, vtique si officium suum, quum hæc reciperet, secundum naturam exercere posset. Proinde ex huiusmodi vtrâque partem conatu, dialecticorum problematum cōsideratio, neq; ad affectuum notitiā, neq; ad curationem, neque etiam ad futurorum euentuum præfagia, quicq;

quam utilitatis afferre posse videtur. Animaduertas ergo veli, quomodo equidem curationem ex affecti loci notitia inuentam, hac consideratione neglecta, narrare aggredior.

¶ Occurrit mihi quidam, medicamentam tribus digitis adhibitum ostendens, dixitque triginta iam diebus, sensum ipsorum facultatem se amisisse, illaesa seruata mentione, sed nihil praesidium ab impositis medicamentis percipere. Ego vero quod in huiusmodi casibus facere consueui, ne tunc quidem obliuioni tradidi. quippe vocato medico, qui digitorum curationem susceperat, interrogavi cuiusmodi remedia adhibuisset, quae quum intelligerem ad hanc rem esse idonea, causam inuestigare coepi, cur nullum ab ipsis homo praesidium consequutus fuisset. inquirens itaque quae praecesserant accidentia, inueni, ipso dicente, neque inflammationem, neque refrigerationem, neque ictum praecessisse.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

se, sed ipsum paulatim sensum perdidisse. Captus itaque admiratione, rursus interrogavi, num superiorum partium aliqua icta fuisset? ille respondit, digitorum quidem non fuisse ictos, sed dorsi initium fuisse afflictum. Deinde quomodo, & quando id accidisset quum interrogarem, respondit, se quum Romam proficisceretur, a vehiculo decidisse, ac non multo post digitorum incepisse affectum, quocirca coniecturam feci, nervorum qui primi a septima vertebra procedunt, partem quampiam ob ictum fuisse inflammata, ac nunc duram habere dispositionem. Id vero intellexi, doctus ex arte secandi corpora, quod nervi per propriam circumscriptionem, veluti venae, exoriri videntur, adeo ut unusquisque exquirat unum esse putares, quemadmodum & venam. Verum protinus ab origine multi sunt simul concreti, qui communibus vinculis consenti, a cerebri membranis exoriantur.

tur. Ergo nervorū, qui a ceruice
prodeunt vltimi exigua pars, ad
minores peruenit digitos, per cu-
tem ipsos continentem, ac præ-
terea per medij digiti medietatē
disperſa. Quod vero ceteros me-
dicos in maximam duxit admira-
tionē, quod media duntaxat pars
afficeretur, id mihi perſuaſit potif-
ſimum, eam tantum nerui partem
quæ in cubito ab ipſo egrediens,
in iam propoſitis digitis finitur,
eſſe affectam. Igitur adhibutum ei
medicamentum abſcercere iubens,
illi præcipue ſpinæ parti, quæ in
affecta particula principatū obti-
nebat, ipſum adaptaui. Secutaque
eſt res, vt aſpicientibus videbas-
tur, & admirabilis, & inopinata,
q̃ digiti manus adhibitis ſpinæ
medicamentis eſſent curati, & ab
affectu omnino liberi. Sed orta eſt
inter medicos quæſtio, quænam
ſit eiſmodi nervorum diſpoſi-
tio, vt per ipſam ſeruato eorum
motu, ſenſus pereat.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Equidem id ipsum dicebam, quod priores medici dicere solebāt, qđ scilicet sentire per affici, moueri vero per facere aliquid, explicatur: quapropter vt qđ moueatur, opus est robore, sed vt sciat, vel minima facultas sufficit. Cunque recte me hunc dixisse sermonem putarent, quid igitur (inquam) num vidistis aliquando contra euenire, quam vt seruatō sensu motus periret? Tum cæteris fere omnibus se nunquam conspexisse dicentibus, vnus id confiteri audebat, ac nomine laborantis citato, testes quoque adhibere pollicebatur. Quamuis hoc cum proposita ratione pugnare videretur, in partibus motis illis quidem, non vero sentiētibus (etenim qđ ad hanc rationem pertinet, fieri haudquā potest, vt perduto sensu, motus a voluntatis imperio prodiēs seruetur) rursus orabant, vt causam explicarem, quamobrē vtrasque appareant. Ea vero (vt plane

intelligunt ſi, qui neruorum diſſe-
ctionem didicerunt) talis eſt. Om-
nis ab impetu prodiens motus, ad
muſculorum officiũ pertinet, q̃p-
pe nullus neruorũ per ſe, ſine muſ-
culo, vllam huiusmodi in animã
tis particulis actionẽ efficere poſ-
ſunt, ſed per muſculos, õnes a cõ-
ſilio & voluntate prodeuntes, mo-
tus perficiunt. ad partes vero mo-
uendas, muſculi ipſi aliquãdo qui-
dẽ manifeſte perueniunt, aliquã-
do vero p̃ medios tendones, quos
aponeuroſeis(id ẽ a neruis ortos)
aliqui cognominãt. Atq; ex hoc
genere ſunt tẽdones, quibus digi-
ti mouentur, haud abſimiles his,
qui toni ab Hippocrate nominã-
tur, rotũdi ſcilicet. Si itaque muſ-
culorum neruos affici contingat,
motus digitorũ perit. ſi vero eos
qui ad cutem perueniunt, tangen-
di ſenſus corrũpitur. Sed vbi tota
reſoluũtur membra, cũ videlicet
commune principium affectũ eſt,
ſimul & ſenſus & motus pereũt.

f.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

atque tum locū primario affectū,
ex leſorum neruorum multitudi-
ne duntaxat, inuenire poteris, idē
que, ſi exquiſite cognoueris com-
munia ipſorum principia, quæ in
neruorū diſſectione percurrimus,
cū nullus ante me huiusmodi diſ-
ſectionem accurate tractaſſet, vt
pote nemine non plus minus errā-
te. Igitur ſolus ille, qui in ipſis fu-
erit, exercitatus, exquiſite cōſide-
rare poterit, in qua vertebra, ſpi-
na ſit affecta, ſiue tota, ſiue altera
cius pars afficiatur. Nam accidit,
vt dextera pars duntaxat afficia-
tur, altera omnino illæſa, aut ecō-
trario, vt illa manēte integra, ſo-
la ſiniſtra affectum ſuſtineat. At-
q; hac ratione, interdum tota p^r
ſiniſtra reſoluitur, dextra pte ma-
nente illæſa, interdum cōtra, dex-
tra pars duntaxat & afficitur, &
reſoluitur, Vbi vero nō affecta ſpi-
na, tantum vnus nerui proceſſus
læſus eſt, eas duntaxat ptes reſo-
lutio conſequitur, in quas neruus

ille distributus est. Accidit enī interdū, vt duo, aut tres duntaxat neruorū processus afficiātur, quū interim spinā nulla noxa infestet. Sic affectus erat is, qui p reliquas quidē manus ptes ōnes, ita fuit resolutus vt neq; sentiret, neq; moueret, sed in tribus solis digitis sē sū habebat integrū. Porro cuidā alteri, nō solū n̄ manserūt illæsi, sed etiā eorū musculorū, in quos neruorū ppago sub. 7. vertebra exorta distribuit, motiones seruare sunt. Atq; alius, ob casum ab alto vehementer afflictus, solos eos musculos resolutos habuit, qui huius nerui ptes suscipiūt. Idē etiam in n̄s dūtaxat cutis ptibus sensū amisit, ad quas prædicti nerui ramusculi demittuntur. Igitur si scire re desideras in qua vertebra sit affectus, vtrum in sola nerui cuiuspiam propagine, an in spinali quoq; medulla, resolutos musculos exanatomicè cōsiderare oportet, ac simul eam cutis partem quæ sen
f n̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sum amisit . nā spinali medulla in aliqua vertebrarum affecta , ōnes ptes inferiores resoluūtur . Quod si in altera pte lēdatur , altera manente illeſa , partes duntaxat quæ illi edirecto respondent , resolutio infestabit . Si vero nerui radix afficitur , reliquę partes omnes affecto loco inferiores , quibus singuli nerui distribuuntur , resoluentur . Hęc si accurate didiceris , nullo negotio circa resoluta membra relicta spina occupaberis , huic enim adhibitis remedijs , partem affectā curabis . Sic etiam si non circa spinam , sed in regione illam sequente , neruus afficitur , partē ex musculis , partim ex cute , quærendæ sunt notæ . Cutem quidem facile est cognoscere , nam oculis subiicitur . Musculi vero ex actione , quę perñt , deprehenduntur . Proinde necesse est , circa musculorū sectionem te exercites , vt cognoscas , cuius actionis quilibet sit istrumentum , Sic enim duntaxat discerne

re poteris ptes, quarum actio pe-
rit, nullo morbo corporalem ipsa-
rum essentia infestante, aut in qui-
bus pcedit morbus, vel fiens, vel
factus. Verum morborum genes-
ra & differentias omnes ex eo dis-
dicisti libro, qui de morborum dif-
ferentijs inscriptus est. atq; simi-
liter ex alio accidentium differen-
tias. at de causis vtrorumque eti-
am separatim scriptum est. In vno
quidem de morbis, in tribus vero
de accidentibus, in quibus exerci-
tari oportet eum, qui facile volu-
erit inuenire, discernereq; et caus-
sam, & affectam, & sedem affecta.
Etenim fieri non potest, vt omnia
per concursum doceantur, quam-
uis eorum, qui ab experientia em-
pirici vocantur, huiusmodi fuerit
opinio. Qui vero accurate & pce-
dentia, & presentia cognouerit
accidentia, atque sic ad curandos
rum morborum experientiam via
& ratione peruenierit, inueniet &
locum affectum, & simul ipsam dis-
f iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

positionem. Sed id magna ex pte
accidit p'tibus, quę in intimo cor-
pore constituuntur, veluti paulo
ante de his qui sensum & motum
perdiderunt, ostendimus:

¶ Atq; nō ab re fortasse fuerit nar-
rare quādā quę iam facta fuerūt,
cuiusmodi hæc sunt. ¶ Puer an-
norum fere sex, inuitus, per aluū
excrementa deñcere incēpit, reso-
luto derepente circa sedem mus-
culo. Quinetiam seni quondā hu-
iusmodi euenit accidens, atq; rur-
sus alius puer, ætatis fere annorū
quatuordecim excrementa inui-
tus per aluum deiecit, infestāte si-
mul vesicam dolore, atque alteri
vrina quoque fuit suppressa. Con-
tra, alius vrinam iuitus excreuit,
atque alius nō solum vrinam, sed
alui quoq; excrementa inuitus de-
iecit. In hīs omnibus, ea quę præ-
cesserūt, scrutari oportet. Nam in
totum aut refrigeratam, aut ictā
ipsorum spinam arbitrādum est.
Sed frigus quidem, vni duntaxat

affectio musculo nocet, ictus vero,
 magna ex parte pluribus noxā in-
 fert. Nam perrarū est, ut icta spina
 vnus afficiatur musculus, quon-
 niam nervi ex spina orti in plures
 musculos diuiduntur. Verum vbi
 ob ictum affectus est musculus,
 si superueniēs inflāmatio, ob neg-
 ligentiā induretur, resolui ipsum
 contingit, quanquam id raro acci-
 dere videatur. At vero frigus se-
 penumero vnū lædit musculum,
 maxime eum qui in superficie se-
 dis est, siue sederit quis super lapi-
 dem frigidum, siue in aqua frigida
 supra modum fuerit versatus.
 Igitur puer cuius & vesica, & se-
 des lædebatur, cum in flumio pis-
 ces venaretur, sic fuit affectus. Nō
 nullis etiam in aqua frigida natā-
 tibus, itidem accidit. Hos itaque
 sic affectos, curare oportet, caloris
 sicilia auxilia locis affectis adhiben-
 do. Quibus vero nervorum a dor-
 si spina ortorū quispiam fuerit af-
 fectus, eius prīcipio adhibēda sunt
 f iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

remedia. Sæpenumero etiã ubi ab
alto loco quis cecidit, aut vehemē
tem, fortemq; ictum spina subiit,
inflammatio ad plures partes ex
tensa, non solum musculis, sed ve
sicę quoque noxam intulit, quibus
ob vesicę ipsorum affectum, vrina
supprimitur. Sunt quibus non so
lum vrina, sed alui quoque excre
menta penitus retinentur, affectis
scilicet intestinis. Nam vt muscu
li affecti, actiones a consilio & vo
luntate pendentes, ita & vesica
& intestina, naturales actiones le
dere possunt, eo quod ipsis cõmis
sis excernuntur ea quæ cõtinent.
Atque in hac re plurimũ differũt
naturalia ab animalibus instrumē
tis. siquidem naturalibus cognas
tam actionis vim esse, animalibus
vero instrumētis, a principio (ve
luti lumen a sole) ipsam defluere,
iam ostensũ est. Ergo vt magneti
lapidi vis inest, qua ferrũ attrah
re potest, ita nřalia quoq; instrume
ta omnia, facultatẽ habent, qua a c

ctionem suam perficiunt. Proinde si permanēs fuisset ipsorum essentia, neque arteriis, neque venis, indiguissent. verum quia nutrimento egent, seruareque oportet at intimi caloris intemperie, hanc ob causam, & venis indigebant, & arteriis. Sic etiam muscoli, ut essentiam suam seruare possint, non secus quam naturalia instrumenta, & venis, & arteriis indigent. At quia cognatum sensus & motus principium non habent, idcirco neruis, per quos hoc ipsis influat, semper indigent, qui illis ea suppeditare possint, quemadmodum sol omnibus rebus quas illuminat, splendorem affert, Quamobrem solis partibus, quæ & sentiendi, & mouendi vim habent, accidit, ut ipsis interdum haudquaquam affectis, nihilo minus eorum actio pereat. id quod naturalibus instrumentis accidere non solet. quoties enim horum actio leditur, semper primario affectu laborant. Ves

GAL. DE LOCIS AFFECT.

rum animalibus instrumentis omnibus, naturale quoque munus debetur, quippe & arteriarum, & venarum adminiculo indigent, ad essentiam ipsorum seruandam. Ideo accuratissime intueri, ac discernere oportet, quæ accidentia eis, ea ratione qua aut naturalia, aut animata sunt, soleant euenire. veluti alterari (vt dicam) a vicinis, ipsis vt naturalibus, alterationem vero sentire, vt animatis, euenit. Sic oculis quoque sæpenumero contingit. Nam vapores a ventriculo elati, ipsos omnino alterant. verum tam exigua alteratio non ab omnibus sentitur, nisi syncerissimam habeant sensificam facultatem. Voco autem syncerissimam, quæ minimas quasque res cernere potest.

GALENI DE AFFECTORVM
LOCORVM NOTITIA,
Liber Secundus.



Copus est, iubēte semper Erasistrato, exercere mentem cum in alijs artis opibus, tū vero in ea, quam nunc proposuimus, affectorum locorum notitia. Circa quam tres sunt exercitationis modi. Vnus circa singulas corporis partes, quas locos nomināt. Alter circa causas & dispositiones. Tertius est de accidentiū differentia. ¶ Igitur a locis sumptus modus, huiusmodi est. Affecto cerebro, huiusmodi separatim eueniunt accidentia. Ventriculo affecto, hæc sunt propria, Colo affecto, hæc. Atque in reliquis similiter. ¶ A dispositionibus, & causis, talis est. Inflammationis seorsum, huiusmodi sunt accidētia. Scirri, huiusmodi. Refrigerationis, hæc. Plenitudinis, hæc. Cruditatis (id est corruptionis ciborum) hæc. ¶ Ab accidentibus, vt hoc doloris genus, hæc dispositiones portēdit, aut hosce locos. tussis vero hæc, ita

GAL. DE LOCIS AFFECT.

& vomitus, sāguinis pfluuiū, fla-
or alui, cōuulsio, cōcussio, horror,
deliriū. Quū enim hēc omnia in-
ter se hoc pacto distinguūtur, fa-
cile itelligetur, qd vel bene, vel
male dictum fuerit. Quod enī sic
sefe res habeat, plane disces. si sin-
gula consideraueris.

¶ De his quæ ab Archigene scrip-
pta sunt, putante ex doloris spe-
cie sedem affectā posse discerni.

Caput I.

Ita p̄tinus quū in hoc
gñe abūdaret Archi-
genes, ex dolorum diffe-
rētia, affectas particu-
las declarare tentauit, proinde dos-
lorū modos exq̄site speculemur,
¶ Nam stupidum quidem dolorē,
neruis euenire dicit, sed plane pec-
cat. quippe stupor a frigida dispo-
sitione oritur, non neruorum dun-
taxat, sed etiam venarum, arte-
riarum, carnis, membranarū, tu-
nicarum, & cutis. Igitur si ob id,

quod hæc omnia per nervos sensum habent, ad nervos dispositionem refert, cur nō reliquas omnes dolorum differentias, proprie ad nervos pertinere dicit? Quippe ut dolor tristis sensus est, ita voluptas, blandus est sensus. Ergo nō solum stupor in nervis est, verum etiam reliquorum dolorum omnium, quos ipse quoque Archigenes descripsit, unusquisque, Quod si rem acuratus inspexeris, haudquaquam doloris species dicendus est stupor, veluti neque ulceris species, vlcus inflammatum. Sed duarum potius rerum, in his quidem vlcere, & inflammationis, in illis vero doloris & stuporis concursus est. Etenim stupor refrigeratio insignis est, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit. Quemadmodum completa refrigeratio, & sensum & motū omnino tollit. Sed quod stupor dispositionis sit nomen, non sensus, aut

GAL. DE LOCIS AFFECT.

doloris, sic dicēte Hippocrate de-
claratur. Stupor enim mediocris,
dolorē soluere potest. Nā stupor
ob refrigerationē fit, vt plane vi-
dere est in his, q̄ in hyeme p̄ frigo-
ra profiscuntur, atque in refrige-
rantibus quoque medicamentis.
Nā si extrinsecus immodice adhi-
beant, particula ipsa stupida eua-
dit, quæ sensum quoque omnino
amittit, si vehementissime refri-
geretur, idque non solum a medi-
camento, sed etiā a circumfuso no-
bis aere. Equidem noui quosdam
adeo refrigeratis pedibus, vt in-
primis quidem sensus periret, ses-
quētibz vero deinde diebus, emor-
tui pedes, putrescerent. Ergo vt
perfecta refrigeratio, & sensum
penitus aufert & motum, sic mo-
deratior, & sensus & motus diffi-
cultatem inducit. Nominaturque
(vt dixi) huiusmodi refrigeratio,
stupor. Itaque stup̄ dum dolorē,
dispositio efficit frigida simul &
dolorifica, indicāte id nomine, nō

doloris(vt dixi)differentiam, sed
dolorem simul, & frigidam dispo-
sitionem, aut ab ipsa inductā par-
ticulæ, & sensus, & motus difficul-
tatem. Constat autem q̄ constric-
tias vehementer particulas, atq̄
eos quoque, qui torpedinem ani-
mal, dum adhuc viuit, tetigerit,
stupor infestare solet. Et quibus
membrum aliquod stupidum fue-
rit, q̄ quicquid tetigerint, obscu-
ro, & hebeti sensu percipiūt, neq̄
moueri possunt. si vero moueri co-
gantur, dolēt. At citra hoc quod
moueri tentent, affectū ipsum stu-
poris haud obscure sentiunt, sed
tum nequaquam dolent. Proinde
male Archigenes enunciauit, stu-
pidum dolorem ad nervos pprie
pertinere. Stupor enim dispositio-
nis, non loci affecti indicium est.

¶ Atqui paulo post rursus Archi-
genes duobus in locis proprie ip-
sum ad musculos pertinere ait, in
quorū altero sic inquit. Nerui au-
tem contorti, distendūtur, & ins

GAL. DE LOCIS AFFECT.

durantur, atque hi stupidos inducunt dolores, atque dure intenduntur. Deinde paulo post, in hunc sermonem prorumpit. Musculi autem carnis, nervorumque priorum, ac denique arteriarum mixtura constantes, in doloribus referunt, stringentes (ut ita dixeris) atque late distenti, ac stupide pulsantes. In horum sermonum priore nervos ait stupidos inferre dolores, In altero vero musculos stupide pulsare, stupidum non ad affectus, sed ad partes, referens. Sed ut dicebam, stupor non particulæ cuiuspiam, proprius affectus est, sed dispositio, quæ quidem in omnibus corporibus fieri potest, sed non in omnibus sensibilibus apparere, quippe in his duntaxat apparet, quæ suos affectus sentire, & pro voluntatis imperio moveri nata sunt. Ceterum his, quæ manifeste in musculis apparet, sermo ipsius repugnat. qui etiam indistincte prolatus est, ac fortasse non intelligit, nusquam

in corpe carnem ipsam per se inueniri. Nam muscoli quidē in plurimis vel capitibus, vel extremis partibus nervosi sunt, vbi etiā tēdones inueniuntur. Id vero quod in medio cōtinētur, omnes homines carnem nomināt, nemine intelligente, quum exquisite diffecatur, carnē haudquāq̃ manere, sed cum tenuissimis quibusdam, veluti fibris, in quas nervosum genus resolutū est. Voco autem nervosum genus, in vnicam appellatīonem cogens, tum vīcula, tum tēdones. quippe ex nīs per carnē dispersis, musculorum ostēdimus essentiam consistere. quę vt permanere posset, venis indigebat & arteriis, At qui citra dolorem pulsare, ad solas arterias pertinet, animalietiamdum bene valēte. Vbi vero ingens oborta est inflammatio, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarum pulsus cum dolore sentimus, quum antea per bonam valetudinem, neq̃ cum dolore, neq̃

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sine dolore ipsū sentiremus. Quī
etiam euenire videmus, vt duas
bus præcipue occasionibus, vehes
mens dolor inflammatis partibus
inferatur, quum mouentur, aut
quum a re quaq̃iam conprimun
tur. Inflammatio igitur omnino
musculo, duplici modo, productis
arteriis, dolorem sentimus. Nam
& mouentur, & ab adiacente car
ne conprimuntur, & ipsam con
primunt. Atque hac ratione pars
tes inflammatae pulsant, quē ves
terrimi quique solum vocant pul
sum. Posteriores vero omnem ar
teriarum motum, quē sensus pers
cipere posset, similiter nominaue
runt. Sed nō protinus stupide pul
sare, inseparabiliter, aut omnino
proprie, ad musculos ptinet. quū
ne pulsare quidem cū dolore, pulsa
su id omnino (vt dictum est) de
clarante. Nam in scirris, & œde
matis, qui proprie tumores appel
lantur, atque in intemperantibus,
quæ sine tumore consistunt, mos

tus arteriarum dolorem haudquaquam excitat. Ac ne per inflammatos affectus quidem, nisi quum maiores effecti sunt, dolor infestat. Etenim sine musculo, arteria inflammatorium sustinens affectum, ipsa per se cum dolore pulsatur. Dico autem inflammatorium affectum, ut simul cum inflammatione, & erysipelas, & abscessus intellegatur. Huiusmodi igitur affectum, quum maiores fuerint, pulsus accidens esse censetur. Quod si aliquando in his pulsus, ipsi scilicet laboranti, stupidius esse videatur (hic enim stuporis affectum sentire potest) tum scire licet dispositionem in musculo nervis consistere, sed ita consistere, ut ad paralyfin (id est resolutionem) tendant. Quippe stuporis dispositio, inter resolutionem, & integram valetudinem media est. At pulsus cum dolore factus, cum inflammatoriis affectibus notatu dignis numerari debet, idque semper in ipsa

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sis arteriis, atq; in continentibus
ipsas ptibus, quū ob angustia ca-
premunt, et quum attolluntur p-
tem affectā, quæ sentire nata est,
veluti percutiunt. ¶ Ergo neque
in peripneumonia, neque laterali
morbo, dolor pulsatorius euenire
potest, idque ob partium naturā.
Nanque pulmo sensum nō habet,
morbus vero lateralis membranę
costas succingentis, morbus est.
quę vbi costis quidem vicina est,
necessario cōprimitur. At media
ipsius pars conprimi non potest,
sed inflammationis duntaxat rati-
one dolet. Atque in hoc spacio ar-
teriæ sunt, quæ per intercostalia
vocata spacia, & p crassas, laxas
que laterum partes extenduntur,
ac in profundo magis delitescunt,
& succingentem costas tunicam
haud quaquam attingunt. Harum
igitur arteriarum motus in mor-
bo laterali ab ægrotanti sensu nō
percipitur, tātum abest vt ei do-
lorem inferat. Nam inflammatis

interdum intercostalibus muscu-
lis, arteriarum productionem, do-
lorem inferre necesse est. proinde
laborans ipsum facile percipiet,
atque pro inflammationis magni-
tudine, sentiet in parte inflamma-
tiva pulsationem. Ob hanc quor-
que causam, ubi vehemens fuerit
pulsatio, suppuratur particula, cō-
sequente suppuratiōe ingētes dū
taxat inflāmationes. Cōstat igitur
ex his quę iam diximus, quod
pulsatorius siue pulsatiuus a medi-
cis vocatus dolor, per inflamma-
torios affectus fiat, atque in corpo-
ribus sēsibilibus, idque vel per se,
vel proprie, vel primario affectu
in arteriis (nominet enim quilibet
ut voluerit) in reliquis vero
partibus sensibilibus omnibus, p-
consensum, eo quod a vicinorum
contactu premantur, neque in he-
pate, neque in renibus vnquā hu-
iusmodi pulsatio apparet. quonia-
am nullus per totum corpus ipso-
rum nervus dispersus est, neque eti-

g in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

am per pulmonē. Quocirca gra-
uitas in ipsis sentitur, quum tumo-
ris præter naturā genus aliquod
ea infestauerit. Nam in horū vis-
cerum quolibet, adiacēs membra-
na per quam nervus dispergitur,
sensu potitur. Quia vero tumore
qui est in viscere, ipsa extēditur,
doloris speciem appellatione dota-
uit. Proinde Hippocrates primus
omnium scripsit, in renem dolor
grauis. Post hunc vero optimo-
rum medicorū non pauci, nō acu-
ti doloris, sed grauitatis sēsū in
prædictorum viscerum inflāma-
tionibus fieri dixerunt. Enimue-
ro mēbranas, vt quibus nullę sunt
arteriæ, non pulsare rationi cons-
sentaneum est, quemadmodū ne-
que cutem, etiam si vehemens af-
sit inflammatio. Atque eadem ra-
tione, neque adenes, quibus nullę
sunt arteriæ. Etenim huiusmodi
partes, quum inflammatę sunt,
vnico dūtaxat doloris modo vex-
antur, extēSIONIS. Quippe huius

modi doloris species, a nullo senti-
entium corporum, in huiusmodi
dispositiōibus separari potest. Re-
liquæ vero doloris species, quibus-
dam partibus accidere possunt. qui-
busdam non possunt. Igitur me-
minisse eorum semper oportet, ac
cognoscere singulorum locorum
naturam. quinetiam intueri, quis
vnicuique parti modus doloris pe-
culialiter conueniat, quis vero cō-
tra. Proinde resumētes rursus ip-
sos dicamus. Quippe vnus dolo-
ris modus est, qui per inæqualem
intemperiem in affecta parte con-
sistit, vel nulla re ipsam extrinse-
cus attingente. Alius qui ob tensi-
onem fit, nō soli affectæ parti p-
prius. Nam hoc non raro & quidē
certo experimento videmus, vt
a vicinis interim partibus oriatur.
Est alius præterea dolor itidem a-
nimaduertendus diligenter, qui a
tangētibz duntaxat, i affectam
particulā plerumq; & q plurimū
transfertur, quum videlicet vel
g. iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

compressa, vel contusa, vel a re
quapiam superueniente vulnera
ta dolet. Quippe doloris modus,
qui a motu procedit, quemadmo
dum pauloante de arteria dictum
est, a re quadam media dolorē ef
ficiente pendet, etenim quæ ex is
psa mouetur pars, tenditur. & ad
vicinas accedens, cōprimitur in
terim, & contunditur, & vulne
ratur. Si vero nulli inciderit, eam
sola tensione, dolere necesse est.
Veluti partes totæ ab alijs motæ,
si nihil extrinsecus ipsas tangat,
nullo, præter eum qui necessarius
est, dolore afficiuntur. Ceterum a
libi me frequenter dixisse memi
ni, primas doloris species duas ef
se. quum affatim temperies altera
tur, atq; quum soluitur continui
tas. Quæ cū iam dictis haudqua
quā pugnare videntur. Nanquē
pars intenta, aut compressa, aut
contusa aut vulnerata, dolet ob
continuitatis solutionem. Neque
enim quum acu quispiam vulne

ratur, alio affectu laborat, quam si ab acri humore facta fuisset erosio, utpote per vtrunque affectum corrupta continuitate. Igitur non eandem doloris speciem excitat, mordax humor, & plurimus. Nam ille rodendo dolorem excitat, hic vero tendendo, flatuosi spiritus exemplo, ac veluti vrina vesicam intendit quum non redditur. Verum in erysipelate, & inflammatione, atque in totum in affectibus inflammatorum, non solum quia intentae sunt, partes laborant, verum etiam quia intemperantia affectae sunt, ac ne hac quidem, exigua, ad dolorem inducendum, vim habente. Id quod declarant hi, qui per vehementem hyemem profecti, manus ad ignem affatim calefacere tentant, intolerabilem nimirum sentiunt dolorem, & quidem maxime in vnguium radice. Porro memini, mihi ipsi accidisse dolorem vehemetissimum, ut videre mihi viderer in intis

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mo ventre terebro perforari, in
eo potissimum spacio, per quod a
renibus ad vesicam vreteras scia-
mus extendi. Iniecto deinde ruta-
ceo oleo, quum id paulo post ex-
cernere tentarem, excreui simul
grauissimo cum dolore, humorē
vitreum a Praxagora appellatū,
quippe vitro fuso, tum colore, tū
substantia, haud absimilis erat. atq;
id alijs quoq; accidere conspexi.
Quod vero hic humor sit frigidi-
simus, iam a Praxagora dictū est
qui ob hoc vitrei nomen ipsi ima-
posuit. Id enim haud obscure p-
cipitur sensu tactus tum ipsorum
qui illum excernunt, tum aliorū
si quis confectū ipsum tangere vo-
luerit. Sed dignum utiq; admira-
tione est, quomodo frigidus exci-
dere possit, neq; ab excretiōis vi-
olentia, quum excidit, calidus eua-
dat? Equidem putabam lapidem i
altera vreterarum impactum, a-
deo erat, vt mihi videbatur, do-
loris ipsius species perforantis si-

milis. Atqui vacuato humore, doloreque sedato, manifeste constabat, neque lapidem fuisse causam, neque in vreteris, aut renibus, locum fuisse affectum, sed in intestinis potius, precipue vero crassioribus. Neque enim ut a tenui corpore, breui temporis spacio exire poterat, sed a profundo quodam & quidem crassiori corpore, quam sit tenuium intestinorum tunica, ferebatur. Huiusmodi dolores, omnes fere medici colicos nominare videntur, quamquam ab ea parte qua dolor sentitur, nullum indicium sumi potest quod magis colon, quam tenue intestinum dolor afficiat. Nam huiusmodi dolores, perinde ac si te rebro partes perforentur, moleste stare solent, narrantibus ita infirmis. Sunt alii dolores per quos palus videtur infixus, qui & ipsi corpus affectum crassum esse significant. differunt autem inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei dolorem faciens

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tis potentia siue ea humor fuerit,
siue spiritus flatuosus. quippe pau-
cus plurimo, & tenuis crasso, &
permanens moto, minorem dolo-
rem excitare solet. Atque qui ad
vehementem refrigerandi vim
haudquaquam accedit, vehemē-
tissime refrigerante minus cru-
ciat. Verum hoc doloris genus,
ad crassum intestinum referen-
dum est, siue palum ibi infixum,
terebro perforari locum quis pu-
tauerit. Atqui huiusmodi dolo-
res, ab eo quo lapis impactus est,
discerni non possunt, nisi quis
accidentia quæ postea consequū-
tur expectauerit. Quauis ob hu-
iusmodi ignorantiam, quod ad
doloris mitigationē attinet, nul-
lam laborāti noxam inducamus.
siquidem vtriusque doloris præ-
sidia, omnia communia sunt, &
quidem calorifica in primis, si-
ue ea extrinsecus adhibeantur, si-
ue inñcianur. Deinde nisi miti-
gatus dolor fuerit, eorum medis

camentorum, quæ dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendum est, cuiusmodi est id, quod a Philone institutum est. Verum si lapis dolorem excitauerit, ipse interdum solus, interdum vna cum cruore excernitur. etenim radit ea corpora per quæ transit, maxime si vel asper, vel acutus fuerit lapis, ac si postea vrinas inspexeris, fabulosa quædam subsidere inuenies, Quod si in colo affectus constiterit, neque lapis, neque cruor, neque arena, sed humor aliquis, qualis iam dictus est, subsidere videtur. Atque alia, quæ ad affectum intestinum pertinet, apparent accidentia. Protinus enim inflatio quædam, & extensio, & flatus complures, & tormina, & excrementa, flatibus plena videbuntur. Ea autem discernere licet, si super aquam natet, ac bubulo stercore similetur, quin etiam cibi tum cupiditas, tum cōcoctio, deterior euadit. Intueri etiam os

GAL. DE LOCIS AFFECT:

portet & præcedentia & præsen-
tia, & ea quæ per continentia cõ-
munitatem consequuntur. pars es-
nim quæ primario afficitur, ven-
triculo continuitate quadam co-
hæret. Insuper colicos nomina-
tos affectus, magna ex parte præ-
cedit, & cruditas & spiritus flatu-
osus, & vomitus, & nausea, quæ
multo tempore inanis permanet,
& in præcordiis mordacitas, &
fastidium, & indigentia plurima.
Igitur ex huiusmodi quidem do-
loribus, quæ qui vehemētissimi sũt,
haud ab re in crassis intestinis cõ-
sistere putantur, qui vero mitio-
res sunt, ex duabus alterum neces-
sariũ est, aut quod in his ipsis sunt,
sed a leuiori causa, aut quod in tes-
nibus consistant intestinis. sed
qui mordaces sunt, a mordaci hu-
more intestinum erodente, fieri
solent. Ergo disenteriam semper
huiusmodi dolores præcedunt,
vtpote per quam intestina exula-
cerantur, quã vel solã, tũ recẽ-

tiores medici, tum antiquorū nō
 pauci, dysenteriam nominant.
 Quauis nonnulli, non solū hāc,
 sed aliam quoque quę cruenta, ob
 excretorum speciem, nominatur
 dysenteriam appellant. Nam in/
 terdum syncærus, plurimusq; sā
 guis, interdum veluti limus & fe
 ces ipsius non paruæ quantitatis
 excernitur. Verum hęc affecti ie
 cinoris accidens esse censetur. Ea
 vero per quam syncærus multusq;
 que sanguis excernitur, vniuer/
 sum corpus plerunque euacuat,
 haud secus q̄ hæmorrhoides, aut
 muliebri p̄fluuiū. Sed hęc postea
 hac percurrere in animo est. Rur
 sus ergo ad dolorum species redi
 re oportet, eas enim in hoc libro
 persequi potissimū proposuimus.
 ¶ Igitur iterū incipiamus a pun/
 ctorio vocato dolore, ac videtur
 quidē veluti radix ipsius affectus,
 inter pungendum, circa membra
 nas potissimum figi. verum do
 lor circa locum punctum, ad mas

GAL. DE LOCIS AFFECT.

gnum spaciū extenditur. atque hoc modo in laterali morbo dolo- rem punctoriū esse, & in inflā- matione pulsatiū, apud omnes fere medicos in confesso est. ¶ Ve- rum hæmodia quidem (id est dē- tium stupor) nihil simile cum mē- branosis corporibus (vt Archige- nes scripsit) habere videt̃, haud enī ignoramus ori dūtaxat, neq̃ toti tamen ori, eam accidere, sed dentes, gingiuasque infestare so- let affectus quidam, quem hæmo- diam vocamus. hanc vero oratis- onē quidem enarrare impossibile est, sed cū quispiam & austeros, & acidos cibos igesserit, ita vt af- fectus aliquis sequatur in dētibus, & gingiuis, eum in omnibus eū- dem esse credimus. siquidem vi- demus nos magna ex pte similes esse in affectibus tollerandis, ita vt ab iisdem causis, eadem susti- neamus. Hunc quidem affectum in ore duntaxat fieri scimus. Sūt præterea alia dolorum gene-

ra ab Archigene perscripta, quæ
 neque dum fiunt cognosci, neque
 dum proferunt intelligi possunt.
 veluti holscimos (id est tractoris
 us) austerus, dulcis, sensim acidus,
 falsus, viscosus, ferus, stringens.
 Atque huiusmodi nomina in libro
 de pulsibus scripta posteritati reli
 quit, quæ auditores nihilo doctiores
 res reddere possunt, eo quod do
 ctrina quæque propria desiderat
 nomina. Si enim de saporibus, aut
 omnino de proprijs quæ lingua ius
 dicant differamus, dicemus utique
 austerum, & acerbum & stringē
 tem, & mordacem, & falsum, &
 dulcem, & amarū. Si vero de his
 quæ tactu iudicantur, humidum
 corpus, & aridum, & calidum, &
 frigidum, & asperum, & leue, &
 molle, & durum, & acutū, & obs
 tūlum. Haud secus de his quæ vis
 su discernuntur, rubrum, flauum,
 nigrum, album, fuscum, aut aliud
 quidpiam huiusmodi. Quod si ap
 pellationes ipsorum permutaues
 h

GAL. DE LOCIS AFFEC.

ueris, quid dicas auditorum intel-
liget nemo, veluti de astringen-
te, aut austero dolore. quippe fieri
non potest, vt quid sit dulcis dor-
lor, intellegatur. Nam dolor sem-
per molestare laborantem solet,
atqui dulcia quæque iucunda sunt.
Igitur quam verissimum est, Ars-
chigenem circa medicæ artis ope-
ra fuisse studiosum, quo pacto tas-
men in huiusmodi nomina incide-
rit, quum sæpenumero inuestiga-
uerim, inuenire non potui. Vide-
mus ergo quid manifeste ex ipsi-
s colligere possimus, veluti paulo
ante de stupenti labore iam fecisse
videmur. Nam iustū est vt obscu-
ra nomina in dubio derelicta, inu-
tilia reputent, perinde ac si nun-
quam scripta fuissent. Quæ vero
clara sunt iudicentur non ratione
duntaxat, sed multo etiam præce-
dente experimento, quanquā hu-
iusmodi iudicium perdifficile est.
nam plærunque alijs nos credere
oportet, qui suos affectus ob animi

languorem, neque cōsequi plane,
neque si consequantur, eos enarra
re possunt, aut quia oratione quid
patiantur, declarare omnino ne
queunt (quippe nō exiguas ea res
vires desiderat) aut quia affectus
ipse ineffabilis est. Ergo relinquitur,
quod nemo singulorum dolo
rū species conscribere potest, nisi
ipsemet passus fuerit, sitque medi
cus, qui interpretandi alius facul
tatem habeat, & qui prudēter, &
sine mollicie, comprehendere pos
sit suos affectus, dum laborat. Atq̃
nemo inuentus est, qui per totum
ætatis suæ decursum, omnes affe
ctus sustinuerit, etiam si perquam
morbosus fuerit. Proinde nō pos
sum non mirari, quum eorū pro
prietates ab Archigene scriptas
lēgo, ita scilicet ipso narrante, tā
quam omnes passus fuisset, quan
nō admodum morbosus erat Ar
chigenes. Si enim vnam aliquam
partem, & infirmā, & morbidam
habuit, non protinus omnibus

h. ij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

laborauit . veluti nec reliquorum
mortalium vllus. Neque enī inue
nire est hominem eundem, qui si
mul & caput habeat infirmum, &
thoracem, & pulmonē, & hepar,
& lienem, & ventriculum, & in
testinum ieiunū, & colum, & ve
sicam, atque reliquas id genus p
tes. Videtur atq; Archigenes p
prians quibusdam consilijs, & qui
dem dialecticis potius, quam affe
ctuum ipsorum experientia fulcis
tus, pro viribus dolorum species
explicare voluisse.

¶ Quod ea quæ ab Archigene
dicta sunt, aliqua vere & ab
solute & clare, alia omnino obs
cure, imprecise, indistincte,
& falso dicta sunt. Cap. II.

Verum vt studiosi maio
ri a nobis copia dotati
recedāt, pposita eius
oratiōe, eos qui in arte
exercitātur, moneo & hortor, vt
quæ plane vera sunt ea duntaxat
cligant, ipsisque credant, q̄ vero

ab his abhorrere videbunt, ea pre-
 riri oportet. ¶ Igitur Archigenes
 quum reprehendisset Asclepiadem
 dicentem in articulari morbo ner-
 uum affectum, dolore haudquaquam
 cruciari, quod nihil omnino sen-
 tiant, carnem autem, quanquam non
 affectam, dolore tamen, utpote a
 parte vicina compressam. Postea
 ad verbum ita scribit. Porro vasa
 vehementer compressa, capitis do-
 lores sine inflammatione obortos
 arcet, veluti prohibita in ipsa in-
 cursione, id quod barbaricum vin-
 culum tum maxime perficere potest.
 Sphacelodes vero hemicranias,
 dissectio eorum, sed maxime arte-
 riæ circumscribit. Hæc enim si su-
 perauerit, pulsatorium turgidumque
 dolorē inducit, ac rotunda euadit,
 horrorem plane excitans, quædam
 modum venæ quædam veluti in-
 durantur. Nervi vero intorti dis-
 tenduntur, ac indurantur, atque hi
 torpentes inferunt dolores, dura
 distentione cruciantes, & profunde

h in

GAL. DE LOCIS AFFEC.

dos, & infixos, & angustiꝝ plenos,
& minime fusos. ¶ Membranę in
latum discurrentes, & inæquales
dolores excitant, atque crebro ita
laborant, vt hęmodię (id est den-
tium stupori) simile quidpiam ha-
beant trāsmiſſionis videlicet aspe-
ritatem. Ita superficies quoque, &
membranę in media carne con-
tentę, quę dilaniantes quoque do-
lores inferunt. ¶ Dolores vero a
mēbranis ossa circundantibus des-
pendentes, perinde affligere com-
periuntur, ac si in ossibus ipsis con-
sisterent. ¶ A venis, graues, &
descendentes, & æqualiter infixi
dolores suscitantur. ¶ A carne au-
tē & fusi & laxiores, quapropter
non adeo extendi vidētur, sed ar-
bitratur laborans sensum asperis
quibusdam rebus impleri.

¶ Musculi, quod ad dolores perti-
net, ex carne nervo atque arteria
quoque mixta idiomata referūt,
stringentes (vt ita dixeris) & cū
capaci latitudine intenti & torpis

de salientes. Ex reliquis vero vlcerosus quidem dolor, & in vlceribus leuiter acutus, & maxime dulcis, & qui pruriginem inducere potest, ad superficiem pertinere videtur. ¶ Punctorius autem profundas partes infestat, infixus autem, cū sinus accesserit. Stimulans autem, partim eorum quæ in loco sunt, aliquid affectum esse declarat, partim contra, vtpote qui haudquaquam profundas partes occupat. ¶ Lacerans autem est, qui in sinu videlicet consistit.

¶ Hic est primus Archigenis sermo ex libro priore de locis affectis, quo docere conatur, quomodo ex dolorum differentiis partes affectę possint inueniri.

¶ Igitur rursus ab initio ipsum examinemus. Nū incassum dixerit, sphacelodes hemicranias vasorum dissectio intercipit? Igitur quos dolores nominet sphacelodes, inuentu difficile est. nō enim inter oēs conuenit, quid hæc vox (sphacelos) sis

h iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

gnificet. Sunt enim qui dicunt ipsam vehementem dolorem declarare, alij tantum inflammationis excessum, vt partē ad corruptionis periculum inducat, quæ dispositio a nonnullis congenita appellatur, Alij partis affectæ corruptionem ipsam, sphacelon dici volūt, Alij conuulsionem, Nonnulli non eam quæ fit cōuulsionem, sed quæ per inflammationis magnitudinē expectatur, Alij etiam nō simpliciter conuulsionem, se eam quæ neruorum corporum inflammationi superuenit, Alij simpliciter fortem tensionem, alij putredinē. Ergo vocabulum sphacelodes, in iam proposita Archigenis oratione scriptum, ad tantam peruenit obscuritatem, vt nihil per ipsum explicari posse videatur, ipso nusquam in alijs libris medicorū nominum enarrationē cōscribente. ¶ Per verbum autem circumscribit, fortasse intellet quispiā ab eo, veluti celeriter & ex toto sa-

nari. ac subiiciamus vt ita dicat.
 Nā quid facere poterit is, qui in-
 telligere cupit ea, quæ ne is quidē
 qui scripsit intellegi voluit.

¶ Deinde pulsatorium, & turgis-
 dum dolorem, arterias inferre di-
 cit, cum ipse videlicet per sphace-
 lodes hemicranias primogenia af-
 fectione laborant. In primis itaq;
 quale sit pulsatorius dolor enarra-
 re tentemus, quāuis ante nostram
 enarrationem, omnibus medicis
 notus sit. siquidem ingentium in-
 flammationum accidens ipsum eē
 perhibent. Turgidus autem dor-
 lor est, qui a parte primario affe-
 cta, veluti a radice incipiens, cele-
 riter in partes adiacentes transfer-
 tur. Id vero nō solum in hemicra-
 nia, vt Archigeni placuit, sed in
 cephalaea quoque vocata, euenire
 solet. Etenim in hac nonnūquam
 arteriæ primario affecte huiusmo-
 di (qualem dixit Archigenes) do-
 lore vexantur. Ita vt fateant nō
 nulli, vasorum ipsorum se dolorē

GAL. DE LOCIS AFFEC.

sentire, id interpretari tentans,
arteriam subhorrentem, fieri ro-
tundam dixit. Igitur inquiren-
dum est, vtrum veluti per Sphas-
celodes hemicranias, arterias af-
fici dicit, intelligendum sit ab eo,
simili quoque modo affici venas,
vtpote per hunc solum morbum,
varicum exemplo obtortas, an
commune sit accidens venarum,
vel quomodolibet affectarū, vel
duntaxat inflammatarum. Ex eo
enim quod sermoni de venis, iun-
git sermonem de arterijs, par est
vt conñciamus, de eodem affectu
ipsum fuisse loquutum. Ex eo aus-
tem quod mox in vniuersum de
neruis, atque de alijs huiusmodi
partibus scribit, non adaptans
vni morbo sermonem, eadem ra-
tione putandum est, itidem de
venis quoque fuisse dictum. Ita-
que in hac ambiguitate satius fu-
erit, vt existemus in eo sermone
quem de hemicrania conscripsit,
simul cum arterijs, ipsum venas

rum quoque mentionem fecisse, atque reliquorum instrumentorum sine vlllo distincto affectu, neque in nervis, neque in his partibus, quæ illos deinceps cōsequuntur. in quibus dixit venas graues, ac detrahentes, atque æqualiter informatos dolores inferre. Verū hæc non nihil ambiguitatis continent. ¶ Quod vero deinceps sequitur vbi dicit, nervi vero distendantur, & manifeste contorti indurantur, recedit enim ab hermetica dispositione, definiens id in vniuersum ad nervos quomodo dolibet affectos pertinere, quod plane mendacium est. Neque enim quilibet nervorum affectus, ipsorum essentiam indurat, atque intorquet. Sunt enim nonnulli, per quos laxiores euadunt nervi, quæ admodum per alios quosdam aridiores. Quinetiam sæpenumero vbi nullam sensu perceptibilem habent differentiam, ita vt omnino exquisitè sani videantur,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nihilominus neque sensum, neque motum, præstant subiectis corporibus. Itaque in solis fortasse inflammationibus, aut inflammatorijs morbis, aut præter naturam tumoribus, dixit nervos & indurari, & intorqueri. At ne in ijs quidem manifeste apparet nervos intendi. Nam & laborantibus ipsis, & nobis aspicientibus, intenti nervi apparent. quapropter nisi curentur, & convulsiones & distentiones ad ipsos sequuntur. Atque omnium quæ in tumorem attolluntur, commune accidens esse videtur, ut intendatur. Nam & arterias, & venas, ubi per summa membra, orta inflammatione, panus exurgit, intendi videmus. Plærunque etiam totum vas intentum videtur, ac rubere magis, & calere, atque maiori dolore (si tangatur) affectum. Itaque constat totum inflammari, incipiendo ab ea parte, quæ primario affecta est, usque ad alas, & inguina. Proinde recte dixerunt omnes

fere medici, inflammatis partibus, accidit vt rubescant, tendantur, renitantur, intumescant, & doleant. Verum (vt diximus) nō omnibus, sed his duntaxat accidit pulsus, quæ arterias habet notatu dignas, & partem sensu præditā, aut vbi ad notabilem magnitudinem inflammatio attollitur, tunc enim pulsatorium dolorem sentiunt laborantes, vel nullo existente sensibili vase in affectio corpore. Sed interrogabis me fortasse, quæ sint singulorum instrumentorum propria accidentia? Id vero iam antea neque semel duntaxat explicatum est, quod videlicet propriæ actionis noxa, qualiscumq; sit specie, cuiuslibet partis proprium est accidens. Neq; enim aliud eis necessario accidens, neq; etiam noxarum differentia existunt. Nam differentie quidē variantur, pro affectus, tum specie, tum magnitudine, Accidētis vero ad vitiatā actionē pertinetis,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

siue genus, siue spēs, aut vtcunq;
nominare volueris, sēper perma/
net. Cēterum satius fuisset Archi/
genē, qui omnia, via & ratione se
explicaturum professus erat, abū
dātius hāc persequi, sed alia quo/
que permulta negligenter admo/
dum tractauit, quorum non pauca,
in plurimis alijs libris conscri/
psimus, quemadmodum & postea
hac deinceps dicentur. sed breui/
ori quidem cōpendio, ea q̄ exacte
alibi fuerūt exaratæ. lōgiori ve/
ro disputatione hic tractabūt ea,
q̄ alibi breuiori stylo pcurrimus.
¶ Nunc vero reliquas dolorū dif/
ferentias, quarum in præscripto
sermone Archigenes mētionem
fecit, persequamur. Quod enim
peccauerit, dicens stupidos dolo/
res neruis euenire, quodq; stupor
non vnius cuiuspiam partis sit af/
fectus, sed causæ potius, ac dispo/
sitionis rationem habeat, iam an/
tea dictum est. Quod vero dolo/
res dure distendentes in ipsis fieri

dicat, recte dictū est. q̄q̄ melius erat, si simpliciter dixisset distēdētes, nō addendo, dure. Nā neruorū dolores, vtrinq; vehemēter distēdere possunt. quia ad vtraq; extrema tenduntur, tum id a quo incipiunt, tū illud in quod finiuntur. Non secus quam chordæ in cithara, quæ sæpenumero, vbi nimis intenduntur, dirumpi solēt. Quapropter citharistæ, quum instrumenta sua post vsum reponere voluerint, chordas relaxāt. Nam plane cōstat eas a contrarijs, tum caussis, tū dispositionibus intēdi, siue humidus fuerit ambiens aer, vt rigare ipsas & implere possit, siue vehemēter aridus. Ab vtraq; enim ambiētis aeris temperie, ad vltimam tensionem perueniunt. Proinde recte dixit Hippocrates neruorum conuulsiones & a plenitudine & ab inanitione euenire. vtpote per quas nerui immo dice scilicet tenduntur. ¶ Sed qđ profundos dixit esse dolores,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

id ab accidentibus, quæ plurimis
ex nervis eueniunt, sumptum est.
Etenim quum venæ quidem sem-
per priores, in superficie sint, de-
inde post eas arteriæ, quibus pos-
tea nervi subduntur, idcirco labo-
rantes tensionem in imo sentiunt,
quanquam multi tendentes, qui ob
id, quod nervosa sunt corpora, a non-
nullis plane nervi nominantur, non
profundos, sed in superficie dolo-
res habent, si quando ipsos quoque
sic intendi contigerit, ut sunt illi
qui digitos extendunt, sunt autem
& qui illos incurvant, in superfici-
e quidem, sed non similiter ut ex-
tendentes. ¶ Porro Archigenes ner-
vorum dolores infixos esse dicit, quum
huiusmodi doloris species, ut an-
tea diximus, ad colon magis perti-
neat. Atque accidit etiam auri, cum
quadam pulsatione, atque denti-
bus molaribus: quinetiam oculis,
sed infixus dolor nervis minime e-
venire potest, etenim magna ex par-
te utroque extenduntur, & ad su-

pernas, & inferiores animantis partes. Quod vero deinceps ab Archigene dictum est nervos angustie plenos habere dolores, inepte quidem dictum est. Nam nihil amplius declarat, quam quum dicit & minime fufos, re vera enim minime fufos idem est, quod in latitudine porrectos dolores nervi non habet, sed magis circumscriptos, utpote perueniente ipsorum tensione, & ad supernas, & ad inferiores partes, magis vero sursum usque ad caput. Ac tum primum ipsos uniuersi corporis, & conuulsiones & distentiones comitantur, nulla nervi tensione huiusmodi accidit, aliquid inducere potente, antea quam caput ipsum attingat.

¶ Post hæc consequenter scripsit Archigenes de membranis, quod in latitudinem perueniant ipsis dolores, quum afficiuntur, quod quidem verum esse fatemur. Quod vero aliquid hæmodiæ (id est dentium stupori) simile habeant, non

GAL. DE LOCIS AFFECT.

est verū, vt ātea dictū est. Neq̃
etiam in totū verū est, quod mē-
branarum dolores sint inēquales.
siquidem contrariū magis veri-
tati consonat, quippe ex propria
ratione, videntur æquales indu-
cere dolores, eo q̃ vniuersū ipsa-
rum corpus, æquale est. Nā q̃ ob
communicationem cum vicinis,
inæqualitatē quandā afferunt, id
interdum per accidēs euenire so-
let. Quū cū ad affectū ipsarū p-
tem, circūiacētes & ducuntur, &
tenduntur, dissimilē fieri dolorē
necesse est. Vbi enim intenta par-
ticula acutioris ē, ibi dolore
vehementiore cruciātur. Vbi ve-
ro sensum habet hebetiorē, ibi mi-
nus dolēt. Atq̃ ex eo quoq̃ quod
vel attingunt, vel nō attingunt
id quod ī particulam ipsam tēdit,
non ab re dolorum differentia de-
penditur. Atq̃ hac ratione nō
nulli pleuriticorū, iugulū dolent,
porrecta in hūc locū mēbrana co-
stas succingente. Aliquādo tamē

non ad iugulū, sed ad p̄cordia dolor transit, percepto ipsius sensu ī septo trāsuerso, utpote qđ necessario mouetur, quū pleuritici respirant, idq; oībus thoracis partibus magis. Quum em̄ veluti radix doloris in latere consistit, tū laborātes, musculis q̄ illic sūt, respirare pigritāt. q̄ re tū soli septo trāsuerso, natura respirationis officium committit. quē admodum in bene valentibus, qui libera vātuntur respiratione, cōtingere solet. Igitur quum in partibus laterū infernis, oritur inflāmatio, septū transuersum intentū, magis dolet. quū vero in ptibus supernis tum iugulū potius dolor infestat. Nam septum transuersum, quia mouetur, iugulū autem, quia durum est, causę rationem obtinet. ¶ Vbi vero ingens in hepate oritur inflammatio, aut vbi ipsū induratū est, dolor qui tū iugulū in dextra parte infestat, concavæ venaē magis, quam membranas i. n̄.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

rum tentionem sequitur. Quum autē dixit, hoc modo sæpenu-
mero superficiem quoque separat ido-
lere, plane declarat id esse, quum
membranæ affectum quempiā ha-
bent. Vnde Archigenes dixit is-
pas, dolores habere hæmodiæ nō
dissimiles. Quia enim simul cū hæ-
modiæ proprietate, stuporis etiā
sensus percipitur, vt ab eadē caus-
sa vtroque affectu dependente. Mē-
brana autē quæ in superficie cuti
substrata est, sæpenuero stupēti
dolore afficitur, vtpote qui ab ex-
ternis caussis, & quidem frigidis,
celerius noxam subit. Idcirco de-
ceptus Archigenes dispositionis
communitate, cæteras membra-
nas hæmodiæ simile quidpiā ha-
bere dixit, ac sæpenuero super-
ficiem quoque, non secundum affec-
tæ particulæ essentiam, factō do-
lore, sed ob membranarum ipsarum
essentiam, quæ exanguis est,
& frigida: quapropter facile a fri-
gidis affectibus infestantur. Quia

vero affectum ipsum, huiusmodi
 dolores comitantur, idcirco sepe/
 numero dixit fieri huiusmodi do/
 lores, non veluti per affectæ par/
 ticulæ essentiam, sic enim insepa/
 rabiles essent, sed per accidens su/
 peruenientes. Substrata igitur cu/
 ti membrana, quæ cum ipsa simul
 excoriatur, dolores facit tenuos,
 & torpidos. membranæ vero quæ
 in media sunt carne, veluti deuel/
 lentes dolores excitant. sūt enim
 plurimæ, & inæquabiliter insitæ,
 atq; eam circundantes. Quumq;
 aliquando e diuerso, contra natu/
 ram, tendi carnem contigerit, hu/
 iusmodi dolores euenire necesse
 est. Sane a multis exercitationis
 bus, aut tensiui, aut vlcerosi pro/
 ueniunt dolores, qui totos muscu/
 los occupare consueuerunt, inter
 quorum partes, carnes quoq; nu/
 merantur. Verum de huiusmodi
 doloribus, satis in salubribus præ/
 ceptis iam dictū est. ¶ Sed qđ mē/
 branarū quæ ossibus adjacent do/
 i. iñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

lores, & profundi sunt (id est in i-
timo corpore sensū excitātes) &
ostium ipsorū, veluti dolentiū, in-
ducūt imaginē, haudquaquā mi-
randū est. Nā n̄ a quā plurimis os-
trocopi (id est ostium labores) no-
minantur, & magna ex parte ab
exercitationibus euenire solent.
quāuis interdū vel a frigore, vel
plenitudine, fieri possint. ¶ In sup-
venas dixit graues, & detrahē-
tes, & æquabiliter irruētes infer-
re dolores. Verū ab initio, vbi he-
micrania mentionem fecit, ve-
nas veluti varices incuruari ait.
Ergo in hoc solo fortasse accipere
oportet, ipsū hoc dicere. Atq; sci-
re licet propriū arteriæ venæq;
dolorē, extensi secundū longitu-
dinem corporis, veluti chordę cu-
iusdā speciē referre, nulla vtique
grauitate simul apparente. A-
quabiliter aut̄ infigi venarū do-
lores, admodū obscurū est, quip-
pe infigi, ad nihil qđ ipsis accide-
re solet, referri potest. ¶ Deinde de

carnibus dicit, qđ & fusos, & las
 xiores inducit dolores. Atq in to
 tū nullus dolor laxus est. nisi eos
 fortasse, qui minus intendūtur, la
 xiores vocitet. quoniā & vasorū,
 & mēbranarū dolores, magis ine
 tendi videātur. Id em cōfiteatur.
 eos non adeo extentos cōspici, ob
 hoc quod carneæ musculorū p
 tes, breuibz lineamentis continē
 tur. Sed id quod deinceps scribit,
 videri tactū, veluti asperitatibus
 quibusdā plenū, an proprie ad do
 lores, qui in carnibus consistunt,
 pertineat, inquirendū est. Nam
 quod interdū aliquid huiusmodi
 per ipsarū dolores eueniat, a veri
 tate haudquaquam abhorret. Ac
 quia non semper euenit, ad factā
 in ipsis dispositionem. idque ma
 gna ex parte vnicā quandam, nō
 ad ipsarum essentiam, proprie re
 ferendum esse videtur. neq sim
 pliciter intellegendū est eam dis
 positionem esse affectum inflam
 matorium, sed qui cum humo
 i. iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

re fit, exaspere suapte natura po-
tente. ¶ Porro deinceps de muscu-
lis scribēs Archigenes, eos ex car-
ne nervisq;, mixta idiomata refer-
re dicit, vtpote peculiari ipsorū
essentia ex his consistente. Addit
vero arterias, quoniam in ipsis in-
veniuntur. Atq; hoc pacto, venas
quoq; dicere debuit, atq; membra-
nas. ¶ Vocabulum autē astringē-
tes, patrio sermōe de his dicitur,
qui quanquā pleni sunt, a bono ta-
men habitu non aberrant, atque
idcirco de iunioribus dūtaxat dici
consuevit, de senibus vero mi-
nime, quod non possit ipsorū cor-
pus boni habitus, plenitudinē sus-
cipere. Igitur Archigenes ad a-
liquam rem, quæ nō ita facile pos-
sit inueniri, vocabulum hoc refer-
re videtur, maxime quia confun-
dere, & corrumpere solet, patri-
orum nominum significata. Qd
si astringentes, de his dici intelles-
xeris partibus, quæ a plenitudine
intendantur, non proprie ad mus-

sculos, sed communiter ad omnia repleta corpora pertinebit. ¶ Quū vero eos capaci cum spacio extēdi dixit, puto ipsum hāc, a nervorum plenitudine voluisse seiūgere. ¶ Torpide autē pulsare, haudquaquam fuisse recte dictum, iam antea declaratum est. ¶ Reliquorum vero dolorum, vlcerosus, inquit, leuiter acutus est. Est autem hāc quoque oratio obscura, neque per se quicquam docere potest, haud aliter quā cæteræ ipsius obscuræ orationes, quas ne enarrare quidē possibile est, nisi quis rem ipsam per se intelligens, eam orationi adaptare conetur. Quum itaque sciaueris, tum medicos, tū exercitationis principes, eos dolores vocare vlcerosos, per quos inter mouēdum, vel tangendum, in laborāte parte, sensus excitatur, qualis in vlceratis partibus percipi solet, facile intelleges, per dolorem leuiter acutum, huiusmodi quampiā speciem significari, qualis ab acu

GAL. DE LOCIS AFFECT.

et æ acus punctura, fieri consuevit.
Ergo constat ipsū, neq; continuū
esse, neq; æqualiter per omnes p
tes porrectū. Hūc itaq; dulciore
esse dicit, quū dicere deberet im
becillio rem, aut obtusiorē, aut nō
vehementē, aut minus molestū,
aut id genus aliud quidpiam. Nis
hil em̄ quod molestum est, pprie
dulcius appellari potest. ¶ Id autē
quod dicit, & pruriginem indu
cere potest, inarticulate dictū est:
q; ppe haud obscura est inter prur
iginis sensum, & vlcerosam dis
positionē differentia. Verū quia
crebro pruriginosa dispositio, vl
cerosā antecedit, atq; soluta quies
centeq; vlcerosā, in pruriginoso
sam transmutatio fieri solet, inde
est quod de ipsis cōfuse, indefinis
teq; Archigenes scripsit, quem
admodum neq; causas harum di
positionum exacte tractauit. Ve
rum nos eas ī libris salubriū prae
ceptorū perfecte exarauimus. Igi
tur Vlcerosus dolor, non solum ad

cutē, sed ad imas quoq; partes, vt ossa extēditur. Pruriginosus autē reuera ad solam superficiem pertinet, non tamē primario, pro ratione ipsius propria, sed per accidēs. Ipsa enim omnes pelli subiacētes partes, spissitudine superat. Horum ergo dolorum vterque, propriæ dispositionis est accidēs, fiunt autem ob acres quosdam humores, atq; tantū ipsi, quantū dispositiones ipsæ inter sese differūt. Sed vt dixi, satis de ipsis in libro salubrium præceptorum definitum est. ¶ Fodicus vero (inquit) dolor, in profundo est. sed non recte, nā ad mēbranas, non ad imas partes proprie pertinet.

¶ Infixus autem (vt inquit) quū sinus accesserit. Hic sermo non omnino absurdus esse videtur. Quippe sinus, concauitas quædam est, quum partiū antea coniuncta sum, altera distat ab altera. Quum itaque fluxione impletur, ita vt adiacentes partes

GAL. DE LOCIS AFFECT.

distendantur, tum tensuum dolo-
rem sentiunt laborantes, non qui-
dem longo spacio porrectum, sed
proprijs limitibus circum scriptum.
At excreto quolibet e sinu humo-
re, protinus dolor conquiescit, ni-
si ambientia sinum corpora, adeo
distendantur, ut inflammatoria di-
spositione torqueantur. Hæc sunt
que proprie ad sinus pertinet. Quod
vero ab Archigene dictum est, ali-
ud ab his est. verum quid intelles-
xerit, quum ita scriberet, haud faci-
le inueniri potest. ¶ At quod de-
inceps scriptum est, non minorem
habet dubitationem. Nam stimu-
lans (inquit) dolor non in imo sub-
sistit. Hic enim sermo, cum eo que
in initio præmisit, pugnare vides-
tur, quo in hunc modum scripsit.
Stimulans autem, partim corpora
quæ in loco sunt, quidpiam affec-
tum esse declarat, partim contra.
Id enim fieri potest, & in parte os-
sibus maxime vicina, & in cute,
atque omnino in medio, huius

modi dolore facto ab humore mordaci, sensibilem partium aliquam erodente. ¶ Deinde quod in fine eiusdem orationis sic scriptum est. Lacerans autem est, qui in sinibus consistit. si lacerans quidem idem significat, quod diuellens, mendacium est. Nam illi qui in sinu est, minime contingere solet. Quod si non hoc, sed aliud quidpiam dicere voluerit, quomodo id poterit iueniri? Atque huiusmodi sunt quæ in præscripto sermone Archigesnes posteris memoriæ prodidit.

¶ Igitur transeamus ad alium, qui & ipse ex dolorum differentia, affectas partes cognoscere docet. Est ipsius series huiusmodi. ¶ Hepatitis vero dolor, holcimos (id est tractorius) & inhærens, & torpidus est, atque atrocius molestans.

¶ Splenis autem acutus non est, sed & gravitatem simul, & extensionem habet, atque similis videtur ei, qui ad elisionem quidem atque expressionem, sed extrinsecus in-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cumbentem, renititur. ¶ Renes
& austeros dolores inducunt, &
cum permanente astrictione pun-
gētes. ¶ Vesica vehementer strī-
gentibus vtitur doloribus, atque
tensionibus punctorijs. ¶ Vterus
autem acutis, turgidis, pungentibus,
distendentibus, torminatim
incidentibus, quippe qui huiusmo-
di mixtiōe, dolore natus est, quā-
obrem idiomatis quoque ambiguis-
tatem inducit. ¶ In hoc sermone,
iterū Archigenes protinus ab in-
itio, hepatis dolorem holcimō (id
est tractorium) esse dicit. Verum
hoc vocabulū holcimos, apud Græ-
cos in usu non est. proinde quid si-
gnificet haud facile inuenire est.
Nam vocabulorum significatio-
nes, ex longo usuprehendun-
tur. Atqui video eos, qui illo vs-
tuntur, viscidum per ipsum vesi-
le significare, quale viscum esse
videtur, ut cuius vna parte tras-
cta, potest per ipsā reliqua illi con-
tinua simul attrahi. Sic pasta quos

que ex frumēto, holcima dicitur, maxime si accuratissime subacta fuerit. sed ex ordeis, aut milio pasta, holcima nō dicitur. Atq; sub hac significatione, hepatis dolor haud quā holcimō euadet. proinde aliam significationem quaerere oportet. Itaque vnus ex his qui Archigenis sectā reliquis proponere conantur holcimon hepatis dolorem dici asserit, quum hepar, vel induratum, vel inflāmatum, detrahare iugulum videtur. Alius quum diuturno morbo latorat. Alius quum mediocri dolore afficitur. Sunt qui tardum ipsum significare velint, vtpote qui acuto aduersetur. Atque vrgentem, & adeo vehemētem, vt nullam admittat requiem. Hunc acutū eū vocare solitū, contrariū vero, nēpe tardū, holcimō dixisse autumant. Nonnulli eum dolorē, holcimon vocant, qui grauitatis speciē refert. Nā grauē dolorē vocari ex cōsuetudine diūt tractū,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quia gravitate fit. Multa insuper
alia varie explicant, admirandi il-
li quidem enarratores, sed quæ in-
tellegantur a nemine. Cōstat igitur
hoc vocabulum holcimos, qđ
in propositæ orationis initio inue-
nitur, nihil nos posse docere. ¶ At
vero deinceps consideremus, qđ
vtiq; sit dolor inherens. Nā hunc
quoq; hepatis propriū esse dixit.
Mihi quidem facile persuasū est,
turgido dolori, inherentem per
contrarietatem opponi, ipsum di-
cere voluisse. Quid enī aliud cō-
ŕcere quis posset? Etenim hepa-
tis dolor, si quispiam alius, vicina
corpora ad consensū inducit. Nā
& ad iugulum vsque porrigitur,
& spirādi difficultatē creberrime
affert, atq; interdū tussī qđq;, ac dy-
senteria, neq; raro nothas costas
ifestat. Igit quonā pacto vere dis-
cet eodē in loco pmanere? At for-
tasse satius fuerit putare, quod in-
herentem dolorem dixerit, ves-
luti īfixum. Atqui hepatis dolor,

vt nuper ostendimus, haudquaquam
huiusmodi est. ¶ Similiter antea
iam declaratum est, ne torpidum quidem
dolorem, particulæ cuiusquæ
proprium esse. Nam ad dispositio-
nem potius referendus est, hæc au-
tem non in iecinore, sed in nervosis
potius corporibus inuenitur.

¶ Porro atrociter molestant, cum
torpido pugnat, utpote qui vio-
lentus est, atque continuus. Sed
nec huiusmodi quidem hepatis do-
lor est, sed potius grauis. At ne
grauis quidem, exacte proprius he-
pati est, sed spleni quoque, ac reni-
bus inflammatis communis. Equi-
dem non satis mirari possum, quo
pacto Archigenes ad lienem dunta-
xat, hanc doloris speciem referre
tentauerit. Nam vel Hippocratem
audire debuit dicentem. Et in rene
dolor grauis. Verum hoc peccas-
tum exiguum forte censebitur.

At longe maximum est illud,
quod committere solet, nota scri-
bens cæteris sensibus peculiaribus,

k

GAL. DE LOCIS AFFEC.

quemadmodum nunc de renibus quidem, austeros scribit dolores, de vesica vero, astringentes. Hec enim saporū sunt nomina, qui lingua vt instrumento, & gustandi sensu dignoscuntur. Igitur res quędam declaratur, generatim quidē per hoc vocabulum stringēs, sed magis particulatim per austerū, & acerbum. quippe ambo astringunt, sed magis acerbum, qualis est omphacia vocata galla. Porro austera sunt multa, vt mali punici genera, atque cotonea mala, ac reliqua complura mensis apta. Sane acerba, haudquaquā sunt munda, non solum ea quę medicamentorum speciem referunt, veluti hypocystis, & balaustrum, & galla, & rhus, sed etiam illa quę quum sint huiusmodi, recipiuntur tamen in cibos. Quapropter non excogitari quidē potest, quid vel austerum, vel acerbum dolorē dicere voluerit Archigenes, non magis q̄ aut ceruleū, aut rubrum,

aut fuscū, aut alium aliquem, a coloribus nominatum. ¶ Nunc autē quid dixerit doctor quā ex Archigenis familia, tempus est considerare. Nam dolorum proprietates Archigenem arrogantia metum interpretari voluisse censet. at quia reuera ineffabiles sunt, cum in huiusmodi nomina absurda incidisse, non intellegens vnāquāque qualitatatum, siue gustabilem, siue tāgibilem, effari posse. Vbi vero multae qualitates circa vnā essentia apparent, ibi & proprietatē fieri cōtingit, idque maxime in gustu videre est, si aliquando & amaritudinem, & dulcorem, & austeritatem, & acrimoniam, in vna essentia apparere cōtigerit. Sic enī in gustu pprietas quādam oritur, ineffabilis illa quidem, si vnico nomine ipsam explicare tentaueris, sed quā dici tamen potest, si per singulas qualitates discurras, coaddito, quod & magis & minus declarare, haud impossibile est. Ita &

k. n.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

herbas vniuersas, & reliquā quorū
que materiam, enarrauerūt medi
corum non pauci, singulas qualita
tes, quę enūciatis rebus insunt,
explicantes. Ergo Archigenes, si
vniuersam essentiaē proprietatē,
vnico nomine comprehendere vol
uerit, indoctus omnino fuisset, id
quod de Archigene nequaquam
sentiendum est. Si autem simplices
qualitates, ipsę quidem ineffabiles
non sunt, earum vero quantitas,
exacta quidem mensura, ineffabi
lis est. quāquā sub latitudine quas
dam explicari potest. Igitur lon
giori sermōe vti nō oportet, quū
species ipsa plane sermonē decla
ret, illa videlicet species qua vti
debet is, qui quālibet rerum sensibi
lium interpretari aggredit̃. quip
pe omnium tangibiliū qualitātū,
propria habemus nomina, haud se
cus quam gustabilium, visibiliū,
& audibilium. Atque omnibus q̃s
patrio more vti debemus, & neq̃
stringentem, neque austerum no

minate dolorem, vtpote quę sapo-
rum proprię appellationes sunt.
Plurimi enim medici Archigene
antiquiores, quum dolorum differ-
rentias conscriberent, haudqua-
uisi sunt a consuetudine in nomi-
num usu recedere, quę & ab ipsis
laborantibus audire licet, qui per
inde se dolere interdū aiunt, quas
si acu pungātur, ac rursus perins-
de, ac si terebro perforent. Quin
etiam videri sibi aiunt contundi
se, & diuelli, & tēdi, & retrahi,
& detrahi, & grauitatis cuiusdā
sensum percipere, qua interdum
subiectarum partium aliqua suspē-
di videtur, interdum vero circun-
dantibus incumbere. Igitur vt hu-
iusmodi nomina omnia facile in-
telleguntur, ita astringentes, &
acerbi, & austeri dolores intellis-
gi haudquaquam possunt, ac præ-
terea ab usu omnino aberrāt. Hęc
intelligere debuit Archigenes,
quum docere nos vellet, quomo-
do loci affecti possint cognosci.

k in

GAL. DE LOCIS AFFEC.

Nam omnis qui de doloribus habetur sermo, vanus, nugarūque plenus esse censet, nisi ex his, quae laborantes ipsi dicunt, eos cognouerimus. Ergo si ab ipsis, quomodo dolent, discere oportet, nunquam vero dicant, acerbū, aut austerū, aut atrocem, aut holcimonē dolorē, rursus inutilis erit huiusmodi doctrina. Præterea huius sermonis locus ille, quo dicunt Archigenem interpretari velle dolorum proprietates, ad doctrinam, tum impossibilis, tum inutilis esse plane videtur. Primum enim non omnis ipsorum proprietas enunciari potest, quod cum ita sit, omnino fieri non potest, ut ad doctrinā aliquid conferat, utpote quam non duntaxat quod sensibilibus ipsam percipiunt, nos scire possunt. quippe quae nobis non affectis, incognita est, nisi fortasse Archigenes, omnes sui corporis partes habuerit affectas. quod licet concesserimus, fieri tamen non potest, ut credamus, vnum hominem,

omnes singularum partium affectum fuisse expertum . donemus tamen (si volueris) hoc quoque, quanquam impossibile est . Nam vteri saltem affectus nunquam scilicet percepit Archigenes . nihil minus huius proprietates conscripsit, quæ duntaxat a solis mulieribus expertis, dinoscuntur . Itaque admirationem (ita dñ me ament) sæpenumero mihi induxit, ex qua tandem ratiocinatione, tam absurdam hanc doctrinam collegerit, Quam & si verum contendas, nihil tamen ex ea utilitatis provenire fateri cogaris, nullo infirmo suos affectus per Archigenica nomina interpretante . Nam quod nonnulli laborantium fastidire stomachum aiunt, id nobis, eo q̄ aliquādo ita fuimus affecti, plane notū est, sicut etiam mæsticia torqueri, quippe quosdā sic fuisse affectos satis constat . An vero austero dolore, ab Archigenea dicto, q̄spiā fuerit affectus, itel

k iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

legi non potest, vtpote nemine
sciente, cui nā rei nomen hoc ada-
ptauerit. Nam punctoriū, & dis-
tendentem, atque eos qui confor-
miter nominantur, atque n̄s mula-
to magis vehementem, & fortē,
& violentum, & continuum, &
intermittentem, nemo est qui nō
nouerit. vtpote qui per nomina a
cōsuetudine nō abhorrētia, enar-
rantur, & quos quotidie euenire
videmus. At austerum, & astring-
gentem, & atrocem, & holcimō,
vt nemo profert, ita si quis fortas-
se proferat, nemo intelligere pōt.
¶ Cēterum oportet, & affectū esse
communem, & appellationē ip̄m
declaramentem, ab auditorum cōsue-
tudine nō aberrare, veluti quum
stomachū stringi dicimus, id qđ
nemo non dicere solet. quippe tali
sepenumero sensu afficimur, quā-
lem extrinsecus onus aliquod in-
cumbens, inducere potest, idq; in
nonnullis oris ventriculi disposi-
tionibus, quod per abusionem nō

solum populares, sed probatissimi quoque medici stomachon appellant. ¶ Quinetiam inter vehementer respirandum, nonnunquam grauitatem in dextra præcordiorum parte sentimus. id si citra febrim eueniat aut obstructione aut dura dispositione hepar laborare conueniendum est. Veluti in inflammatione infestatur, febrim comitari necesse est. ¶ Itaque omnia huiusmodi & dici possunt, & manifesta sunt omnibus medicis. Archigene prioribus, atque sine absurdis illis nominibus doceri possunt. Archigenis vero doctrina hoc habet exacte proprium, ut non nouarum rerum, sed nominum rem nullam declarantium, enarrationi studeat. Nam librum de pulsibus, huiusmodi nominibus impleuit. quauis ille, ut in commentarijs de pulsibus ostendimus, haudquaquam translatis indigeat nominibus.

¶ De via & ratione, qua simul & sedes affecta, & ipsius dis

GAL. DE LOCIS AFFEC.

positio possit cognosci.

CAPVT TERTIVM.

EQ V IDEM voluisssem
Archigenem, tantos
rum medicorum suc
cessorem, addere ali
qd, quo clarior euasisset doctria,
nō demere tantū, vt ne nos quis
dem, qui in artis operibus iam ses
nuimus, dicta ipsius intellegere
nequeamus. Igitur qd ab illo omis
sum est, id p̄ficere aggrediamur.
docebimus enim in primis viā &
rationem vniuersalem, cuius ada
miniculo, & ipse affectos locos in
uenire, & ceteris viam ostendere
possis. ¶ Igitur vt in priore libro
dictum iam est, via & ratio huius
modi est. In primis querere oport
et singulorum locorum propria
signa, vt quomodocunque afficiā
tur, aut per singulos affectus alte
rentur, inuenire possis. Deinde
vtrum singulorum affectuū pro
pria sint signa, an circa quolibet

partem varientur. Itaque oportet & loci, & affectus non immemores, deinceps signa perstringere. ¶ Veluti si ita acciderit, ut pulmo inflammatione laboret, tanta inducetur spirandi difficultas, tantaque angustia, ut suffocari laborantes videantur, ac recti sedere contentur. quem affectum orthopnoeam nominant. Quinetiam calidam sentiunt respirationem, idque maxime si erysipelatis particeps fuerit inflammatio, quocirca ubi plurimum effluant, iuuari videntur, ac multum aerem frigidum attrahere concupiscunt, atque intertussendum sputum expuunt, idque modo hoc, alias alio colore infectum, ut interdum rubrum, interdum flauum, aut rufum, ac spumosum quoque, & nigrum, & liuidum appareat. Insuper grauitatis cuiusdam thoraci incumbentis sensum, saepenumero percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipsum peruenire, & ad pectus, & ad spinam. Praeterea acuta

GAL. DE LOCIS AFFECT.

est ipsis febris. Pulsus vero hñt,
qualem in libro de pulsibus dixi-
mus. ¶ Sic vbi membrana costas
succingens inflammata est, acuta
febris infestat, accedēte, pulsus ea
quam in commētarñs de pulsibus
diximus proprietate. est autē do-
lor punctorius, quum spiritus dif-
ficulter trahitur, ac magna ex p-
te sputum colore infectū apparet.
haud secus q̄ in peripneumonia.
Igitur vtroque affectus spirandi
difficultas necessario comitat̄, co-
q̄ affecta particula spiritus sit in-
strumētum, oritur autem febris,
& propter affectum ipsum, & p-
pter positum. Nam & pulmo, &
succingens costas membrana ppe-
cor constituuntur. Inflammatio
vero calidus affectus est, sic etiam
tussis ipsis vt spiritalibus cōuenit.
Sed q̄ aliquid exequitur, id ab affe-
ctu ipso pcedit. Quippe iam ostē-
dimus, omnem inflammationem,
ex affluēte fieri sanguine. quapro-
pter si biliosus fuerit sāguis, flauū

aut pallidum erit sputum. Si pituitosus, & spumans, & candidum. Si melancholicus, aut nigrum, aut liuidum. Si nihil horum sanguine infecerit, rubrum. Quinetiam in laterali morbo saepenumero magis biliosum. In peripneumonia vero magis pituitosum, sequi consuevit. Sed de hoc satis iam declaratum est. Quod autem inflammationum partium excrementa per asperam arteriam referuntur, eius rei causa, tum ad positum, tum ad formationem referenda est, quippe quæ per solam hanc viam effluere possunt. At vero ventriculus duos habet meatus, vnum per quæ natantes in ipso humores euomuntur, alterum per quæ humores ad inferiora delabuntur. Verum id quod in eo vitiosum inuenitur, supernatat magis, ac vomitione reñci consuevit. Reliqua per intestina deñciuntur. Veluti renum, vesicæque excrementa, meiendo excernuntur. Cerebri vero redundā

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tia, per nares præcipue, nonnunquam vero per palatum, & aures vacuatur. ¶ Igitur sedes affecte dinoscuntur, & ab accidentibus, & ab actione læsa, & excrementorū qualitate, & a tumoribus præternaturam, & doloribus, & a coloris vitio quod sequitur, vel in vniuerso corpore, vel in vna quapiam parte, vel duabus, idq; vel maxime in oculis, & lingua quibus addere potes, si vis, eam quoque affectionem, quæ proprie per consensum afficere dicitur, veluti in priori libro iā diximus. ¶ At nunc tempus esse videtur, vt amicos, quorum petitioni obtēperans, hos commentarios scribere aggressus sum, ad exercitationem inducā. fit autem exercitatio omnis; quā particularia sub eandem viam & rationem ducūtur. Huiusmodi autem doctrinæ specie, vt per sæpe ostendimus, non aliud inuenitur vtilius. q;ppe viæ, & rationes, vbi solę sine multifaria secundū ipsas

exercitatioe cognoscuntur, haud
quaquam possunt perfectos efficere discipulos. Altius igitur viam & rationem dicere aggressi, ad exercitatiois modum accedamus. In primis quod deintueri oportet, num actio aliqua sit laesa, quippe cum ipsa proprium actiois instrumentum affici necesse est. deinde ubi actionem laesam esse perspexeris, ad modum lesionis accede, considera ad quam affectionem proprie pertineat. Postea affectam particulam nota, num tumore quopiam, aut dolore infestetur, & quidem accurate cuiuslibet horum speciem inuestigando. sic enim non solum tumorum, verum etiam dolorum quoque, varios modos addisces. Aspice subinde affectae partis excremeta, per quem meatum vacuentur, ac vide, num aliquid essentiae ab affecta parte secernatur. Postremo utrum omnino intacta sint ipsius excremeta, an mediocriter cocta. Ac deinde quid ad universi corporis, & quid ad quae fundam

GAL. DE LOCIS AFFECT.

partium vsum, ipsa conferat, partim per suas actiones, partim vero per colorem, & figuram ipsa fruuntur. Esto enim vt quispiam inter respirandum in notharū costarum loco doleat, non protinus hūc esse pleureticum suspicari debes, sed i primis quidem, an tussiendo aliquid expuat, intueri. id est nim si coloratum, vt dictum est, videris, tum ipsum pleureticum esse dices. Quod si tussiendo nihil omnino expuat, fieri potest, vt nihilominus pleureticus sit ille quidem, sed inflammationem habeat, & incoctam & strictam, adeo vt nihil ab ea foras eñci possit. Ac fieri quoq; potest, vt ob hepatis inflammationem, dolor in iam dicta sede excitetur. intentis videlicet internis vinculis, quibus nonnullorum iecur costis alligatur, atq; sic dolor ad succingentem costas membranam perueniat. Verum nequaquam similis est pulsus, in hepatis, & membranæ costas succinus

gētis inflāmatiōe. ac ne alui quidē
dem sedimenta similia sunt. quāq̃
non in qualibet iecinoris inflāma
tione eadem sunt, sed in his af
fectibus q̃ proprie iecorari nō nomi
nantur. Igitur vbi nihil excernit
tur, a quo indicium aliquod sumi
possit, satius fuerit p̃cordiorum
dextram partē tangere. qđ si nul
lus apparet tumor, ne sic quidem
desistere oportet. quippe fieri pos
test, vt in sola sima hepatis partē,
sit inflāmatio. similiter etiā ī giba
bis partibus, vbi non omnes, sed
hæ duntaxat intumescent, quæ a
nothis costis conteguntur. Itaque
laborantem, vt vehementer res
piret, monere oportet, deinde ī
terrogare, nū grauitatem sētiat,
aut suspensam a superioribus, aut
incumbētem vicinis. Accidit autē
aliquando, vt in his, haud secus q̃
in hepate, oriatur tumor p̃ter na
turā, cuius occasione septū trans
uersum oppressū, respiratiōē ef
ficat difficiliorem, atq; qui ita lae

GAL. DE LOCIS AFFECT.

borant, ab exigua tussi irritantur. Ergo in huiusmodi dispositionibus, solidū, firmūq; discernēdi iudicium per omne tempus morbi, a pulsu sumendum est. deinde tractu temporis, reliqua quoq; accidentia, considerata sunt. Nā & linguæ, & vniuersi corporis color alteratur, vbi hepar vitiatum est. Sicut rursus thorace affecto, tussis inaccessit, atq; eo tempore omnino apparent, ea quę tussiendo expuuntur. Igitur quemadmodū fieri non potest, vt illæsis spirandi, tum partibus, tū instrumentis, difficilis fiat respiratio. accidit autem interdū, nullo existente in ipsis proprio morbo, sed transuerso septo, aut detractio, aut oppressio, vt homo difficulter spiret. Ita etiam vsu venire solet in ea sedes, quę principem in se animę facultatem continet. Nam cum & scis etia, & opinio, atq; cogitatio hominis, in ipsa cōsistat, si harū alis qua lædi videatur, p̄tinus ipsam

quoque affectu quopiam laborare arbitramur. Nam ubi vel in pleuritis de, vel peripneumonia delirium incidit, nemo vel a costa, vel a pulmone, accidens hoc provenisse dixerit. Quippe universi eam partem, in qua princeps anime vis residet, consentire putant, ac nititur quisque, ut modum consensus secte sue conformem ostendat. Verum in aliis affectibus, non consentire, sed primogenio ipsam affectu laborare aiunt. veluti in lethargo, & phrenitide. at vero vndique affici, ubi propriam ipsius actionum aliqua laeditur. Proprias actiones dico, quia nulla alia parte, ut in strumeto sunt. nam reuera & videre illam, & audire haud quam negandum est, sed videre oculis, & audire auribus. Atque ut cogitet, & reminiscatur, & existimet, & eligat, neque oculis, neque lingua, neque alia quam propria parte utitur. Quod si haec animae pars, ita esset in continente ipsam corpore, ut nos in domo aliqua, in primis fortasse, nullam ei noxam afferri putaremus
l. ij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

a loco. quoniam vero ipsam lædi videmus, quomodo lædatur, esset inuestigandū. Si vero veluti forma quædā corporis est, ab ipso inseparabilis, eā lædi non inficiabimur, ob suscipientis ipsam corporis alterationē. At quia de hac re inter philosophos ingens pugna est, alijs eā veluti in domicilio contineri dicētibus, alijs vero ipsam corporis formam esse putantibus, idcirco quomodo lædatur, inuētum perdifficile est. Quod vero lædatur, ab experientia discere licet. Etenim vbi fractio capitis ossi, terebra adacta est. si quis vehementius comprimat, protinus sensum omnē amittit laborans. Quinetiā si inflammatio quædā oriatur, nam & hāc interdū euenire videmus, mentē itaq; lædi minime negandū est. Præterea nonnulli per vehementē capitis vstionē, delirauerūt. atq; per fortes ictus, capiti adactos, sæpenumero stupidū locuporē sequi videre est. multi quoq;

affectus in capite consistētes, mē-
 tem haud obscure vitiāt, ad eo vt
 etiam populares, quū aut delirare
 aliquē, aut mētem quomodolibet
 affici conspiciunt, capiti remedia
 adhibenda esse censeant. Verum
 enimvero quod prīcipiū sēsus &
 motionis ab impetu prodeuntis,
 sedem in cerebro habeat, & quod
 hoc a membranis (Græci meninges
 vocant) cōtegatur, id in alijs
 commētarīs, quā verissimū esse,
 declaratum est. Nunc vero quomodo
 distinguantur affectus pri-
 mitiui ab his qui per cōsensum ex-
 ueniunt, considerandū est. Nam
 huiusmodi speculatio proprie ad
 hoc nostrum institutum pertinere
 videtur, & quidē non sine ma-
 nifesta utilitate. quippe quod ad
 curandi rationē pertinet, primū
 omnīū scire oportet, cui nā parti
 remedia sint adaptanda. Nā per
 solum consensum læso cerebro, si
 ea pars quæ primitiuo affectu lae-
 borat, fuerit curata, prius q̄ cere-
 b. iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

bro propria aliqua eueniat dispositio, nullū in ipso reliquitur accidēs. Qd si ex consensu, permanens aliqua fiat in ipso dispositio, tum nō solū parti q̄ primitiuo affectu laborat, sed capiti quoq; remedia adhibere oportet. Quap̄pter exacte definire, utrū cerebrum, an mēbranæ ipsius primitiue afficiantur, haud magnā vtilitatē afferre potest. In vtracq; enī dispositione, capiti succurrit. Igitur huic rei non ita vehemēs studiū adhibere, sed morbi potius essentiam, qualis sit inuenire, quippe humidum exiccare, aridū humectare, frigidum calfacere, calidū refrigerare, oportet. Ac si cōiugatus fuerit affectus, per cōtrariam cōiugationē ipsum curare, vt calidum & siccum, humectare, & refrigerare, humidum, frigidūq; exiccare & calfacere, atq; in reliquis duabus cōiugationibus ad portionem, ac in cæteris morbis omnibus, eadē ratiōe similiter

facere conuenit. At vniuscuiusq;
 spetiem, in libro de morborū dif-
 ferētīs p̄sequuti sumus. Quū itaq;
 que & cerebri, & membranarum
 eius, q̄dē morbi simili curatiōe i-
 digeant, logica magis, q̄ ad cura-
 tionē utilis esse videtur quēstio,
 in vtrolibet illorum cōtineatur
 princeps aīæ facultas. Verum an
 in corde sit ea facultas, longe di-
 uersa, atq; omnino differēs est q̄-
 stio. Esto enī vt a flaua bile ī cor-
 de & accumulata, & putredine af-
 fecta, phrenitis sit excitata, nōne
 delirare videbitur is, qui caput ox-
 yrhodino (id est oleo rosaceo cū
 aceto) perfundere iusserit? Nam
 si hoc p̄sidio phrenitidis causa
 sanari possit, non capiti, sed tho-
 raci, ipsum adhibere poterat. Ne-
 que tamen vniverso thoraci, sed
 illi duntaxat parti, in qua cor cō-
 tinetur. Hactenus hęc explicas-
 se sufficiat, hoc addito, quod non
 affectum locum, verum etiā caus-
 sam illi noxam inferentem, cons-
 luit.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

considerare oportet. ut exempli gratia, delirium est accidens eius actionis quæ a loco mentis cōpote perdit. similiter sopor stupidus, sed a contrariis causis oriuntur. Quippe & vigiliam & delirium, causa potestate calida efficit. at quotquot somnolenti & soporosi sunt affectus, omnes a frigida causa perueniunt. Id quod ex medicamentorum natura, plane discere licet. Quippe frigida stuporem soporemque, calida vero vigilias, & varias motiones inducunt. Sed quid opus est fortia medicamenta enumerare, cum quotidie videamus & lactucas, & potabilium, calidarumque aquarum balneas, & vinum modice dilutum, somnum inducere? reliquorum medicamentorum exemplo, quæ & humectare & refrigerare possunt. Quæ vero contraria sunt, vigilias excitare. Itaque tenuis ratio victus, & vinum meracius, vigilias inducunt, idque multo magis, cum vinum meracum,

aut suapte natura fuerit calidum,
aut valde antiquum, veluti apud
nostrates Pergami olim accidisse,
memorie proditum est. Neque
absurda videtur historiae ipsius
narratio. Grammaticus quidam, singulis
diebus balneum petens, unum
ex pueris secum ducebat, altero do-
mi relicto, qui rem familiarem ser-
uaret, atque ea quae ad victum essent
necessaria, prepararet. Puer itaque
domum custodiens, quum vehementi
siti cruciaretur, nec esset ei aquae
copia, vinum antiquum liberaliter
potavit, atque ex reliquo tempore
vigil omnino permansit. Postea cor-
reptus febre, una cum vigilis ob-
orto delirio perijt. ¶ Caterum anis-
mantia quae frigidiori sunt natu-
ra, per hyemem ob frigoris vim, peris-
de ac si mortua essent, latitare so-
lent. Atque tum viperas quoque vis-
deres, si manibus tractentur, de-
feranturque, haudquam mordere.
Nam per aetatem, tum hoc animal, tum
serpentes reliqui omnes, maxime sub

GAL. DE LOCIS AFFECT.

caniculæ feruore, quū vehemen-
ter æstuant, furorem præ se fer-
re videntur, adeo vt ne exiguo
quidem momento quiescere poss-
sint. Quod intellegens Nicāder,
sic de Cenchride cecinit.

Non temere offendas calcando Cē-
chridis artus,

Dum fur̃ns agitur.

Verū de hīs alibi pleniorē iuenies
& enarrationē, & demonstratio-
nē. Siquidē calida caussa motum
excitat, atque idcirco vigilias as-
fert, frigus autem ociosum, & ad
motiones pigrum reddit animal,
ob idq; somnum, soporēq; indu-
cit. Igitur qui hęc intellegit, quū
per ardentīū febrium vigorē, ho-
minē viderit & vigilare, & de-
lirare, deinde inclinante iam fe-
bre, & dormire, & recte sapere,
in capite nullam propriam esse di-
spositionem, sed a febris abundāti
calore, delirium fieri existimabit.
Sic etiā in peripneumonia, & la-
terali morbo, quum ad vigorem

febris peruenerit, deliriū sequi so-
let, nullo existente in capite pro-
prio affectu. Quippe tum affectus
proprius esse putandus est, cū p-
manere in parte quapiā cōspicia-
tur. Vnde si in laterali morbo, p-
manens euenit delirium, caput
propriū habere morbū perpē-
de, ita vt quamuis lateris morbus
quiescat, possit tamē capitis mor-
bus permanere. Sēpenumero enī
vidimus panum ob vlcus aliquod
obortū, vlcere curato, deīde diu-
tius infestare. Ergo quū pars alie
qua simul cū alia sic afficitur, vt
irritata quidem vna, altera ve-
hemētius molestetur, remissa ve-
ro irritatione quiescat, eam per
consensum affici putandum est.
Hæc enim vna coniectura com-
munis est. Sed de cerebro, vt di-
ctum est, propriū sumitur indi-
cium, si non assidue delirium per-
maneant, sed auctā febrim sequa-
tur. Atque eadem ratione fieri so-
let, vt quum febrium accessio-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nes irruere incipiunt, sopore, labo-
rantes grauentur, quod hoc tem-
pore cerebrum vehementer sit re-
frigeratū. quippe quod alioqui pa-
ratissimum est, vt noxam huius-
modi subeat, quum intemperiem
habeat frigidam, non vero tan-
tam, vt hæc sola prædictorum ac-
cidentiū possit esse causa, sed quū
accessio ab initio processerit, frigus
adeo increfcit, vt soporem queat
iducere. Id vero, vt dixi, fieri con-
suevit, vel ab intemperie frigida,
vel a pituita in cerebro exupe-
rante.

**¶ GALENI, DE AFFECTIS LO-
CIS LIBRI SECYNDI
FINIS.**

GALENIDE AFFECTORVM
LOCORVM DINOTIONE.

Liber Tertius.

Quod actionum noxe, ipsarum
actionum instrumenta affe-
cta esse declarant, aut
primitiue, aut
per acci-
des.

Caput Primum.



De affectis locis, sic enī
vocant corporis par-
tes, pauci admodū me-
dici scribere aggressi
sūt, ac multo plura q̄
attigerint, omiserūt. Itaque cē-
teris silentio prateritis, vnius Ar-
chigenis haud indigni qui omnis
bus preferetur, meminimus. dixi-
mus enim eum sermone, quo asse-
rit actiones quasdam lædi, illa sa-
ea corporis particula, quę ipsis de-
putata est, discussiōe egere. Quā-
quam defendi potest, si videlicet

GAL. DE LOCIS AFFECT.

pars per alterius consensum læsa, nondum permanentem habeat dispositionē, sed veluti umbra quædam, vt ipse dicebat, insit hæc ei affectio. Nam si ad ignē quis propius accesserit, vt fere cōburi videatur, citra tamen vstionem, dolebit quidem vehementer, sed cas lesacta parte nihil adhuc patiente. Sic etiam vbi ambiens aer vehementer frigidus, aut aqua exacte frigida, aut nix infestat, grauis admodū dolor excitatur. At qui ablata re quæ nocuit, protinus conquiescit affectio. Quamobrem satius fuerit, vt dicamus, nomine id ipsum indicante, affici quodammodo eam partem, quæ alteri cōsentit. Neque enim pars quæ nihil patitur, sed ea quæ cum alia patitur, consentiētis vocabulo significatur. Itaque quū affecto stomacho, oculi similibus infestantur casibus, quales in suffusionibus apparere solent, dicendum est illos pati, elato ad cerebrum ab humoris

bus in ventriculo cōtēntis, fumos
 so quopiam vapore, non tamen
 adeo afficiuntur, vt ablata re quæ
 molestiam intulit, propria curatis
 one egeāt. Verum huiusmodi dis
 putatio, vt dixi, ad dialecticam
 potius pertinet. Quæcunque enī
 quæstionis vsum transcendunt,
 qualis sit rerum natura secūdm
 propriam essentiam indagantes,
 haud dubie logicæ esse censētur.
 Sic etiam Chrysippus philosophus
 de animi ægritudinibus scripsit.
 Vnum quidem de curādī ratione
 librum, quo scilicet maxime ad ea
 arum curationē vtimur. cui tres
 alios subiunxit, qui logicas conti
 nent quæstiones.

¶ Quod scire oportet, quomodo
 læsa actione, distinguantur
 partes primogenio affe
 ctu laborantes, ab his
 quæ per aliarum
 consensum af
 ficiuntur.

Caput Secundum:

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Igitur quot sint læsarū
actionū modi, Archi-
genes parum accurate
explicuit, quamvis hæc
questio, & melior, & huic nostro
proposito vtilior fuisset, quod &
primo affecte, siue pprie affectæ,
siue quomodolibet nominaueris,
corporis sedes, itaprehendun-
tur, & curadi quoq; facultas ab-
unde suppetit. Ego vero in vo-
calibus instrumentis id iam ex-
posui, ac in eo quoq; qui in manu
sensum amisit digitorū, ipsis non
affectis, quippe inuēta ī dorsi in-
itio pars, quæ primo afficiebatur,
idoneam curationem ostendit.

¶ Quod partes, quarum actiōes,
eo quod alijs consentiunt, læ-
dūtur, aliæ quidem in proprio
suo corpore habēt dīspositiōes
ipsas, aliæ vero priuantur, aut
materia, aut facultate, quæ ipsa-
rum viribus influere solebat.

Caput tertium.

S

Ed aliter eueniūt confuſionis accidētia, affecto ventriculo, atq; aliter ei, qui ab alto decidit, nullo exiſtēte in vocalibus inſtrumētis vitio, vox intercepta eſt. Deniq; alia cōſenſus ſpecie laborabat is, cuius digiti ſenſum amiſerant. Siquidem oculi vexabantur q̄ aſcenderet ad eos aliquid, vox autem q̄ materia eius eſſet obleſa. Sed digiti idcirco torpebāt, q̄ ſentiendi facultas ad ipſos non deſcēdebat. proinde ſatius fortasse fuerit, vt exiſtīmes, tum vocalia inſtrumenta, tū digitos nulla affectiōe laboraſſe, id quod de oculis haudquaquā dixeris. Nā his vt fumoſo vapore impletis, affectus ipſe ineſt. Vocaliū vero inſtrumentorum, atq; digitorum officiū læditur, non q̄ veniat ad eos quippiam præter naturam, ſed q̄ careat eo quod ſecūdū naturam ad ipſos venire debet. Sane ſecundum dorſi ſpinam leſa
m

GAL. DE LOCIS AFFEC.

nerui origine, vis sentiendi digi-
tis non influit. Neque guttur reso-
lutis intercostalibus musculis effla-
tum spiritum recipit. Nihilominus
recte dixeris, in ipsis hanc esse
passionem, quod non perueniant
ad ipsas partes ea, quæ antea quàm
secundum naturam se haberent,
venire solebāt. Etenim fontes as-
fici haud absurde putaueris, si nō
perueniat ad ipsos aqua. Sic Cerea-
lium quoque frugum e terra pro-
deuntium, squalor immodicus, pas-
sio est, & animalium, cibi potio-
nisque penuria. Quoties enim ali-
cui deest illud, sine quo secundum
naturam, munere suo fungi non
potest, ipsum optimo iure affectū
esse putandum est. Sed huiusmodi
questiones (vt iam dixi) ad diale-
cticam potius pertinēt. Cæterum
magna medicorum pars negligit
eas considerationes, quæ vel læ-
sis, vel deperditis actionibus, ne-
cessariæ sunt. Quum enim duæ
tresve fuerit aliquādo huiusmodi

actiones, accidit interdum, vt
vna particula affecta, reliquæ illi
cōsentientes in suis actionibus si-
mul lædūtur, interdum vero, vt
omnes eodem modo afficiantur.
Atque accidit interdum, vt harū
aliquę dispositionem habeant (vt
ita dicam) ecticā, id est, quę tena-
citer hæret. reliquæ vero (vt sic
dixeris) schesin, id est quę facile
discutitur. de quibus secūdo libro
de viuorum dissectione, atque in
eo qui hunc præcedit iā diximus.
ac nonnihil in sequētibus quoque
dicemus, vt videlicet futurū ser-
monem, qui sine huiusmodi defi-
nitionibus explicari non potest,
pficiamus. Sed iam enarrare ag-
grediamur id, quod admodū vti-
le fuerit pdixisse, propter eos, qui
verbo quidē demonstrare nitunt,
affectōrū locorū inuestigationē,
medicis eē necessariā, opere vero
illā evertūt. Atque vnū aliquem
affectū p exēplo sumamus, sitque
is pleuritis, i quo, latus eē affectū,
m. n̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

dolor ipse declarat. Sed utrū succingulum vocatum, siue membrana, siue tunica (nihil enim refert) inflāmetur, in pleuriticis, an alia quadam lateris particula, p̄terea utrū pulmo secundū fibras necessario afficiatur, an omnino affectionis sit expers, scire nihil ad rē pertinere autumant n̄, qui vsum, & experimenta præferūt. dicunt enī multos se vidisse pleuriticos, tum a præceptoribus, tum a se curatos, obseruatis n̄s præceptis, quæ ab Hippocrate in libro de ratione victus in acutis morbis, præscripta sunt. item quid ipsis proſit, & quid noceat noscere, euidentia signa habere, quibus discāt cui venam secare oporteat. Insup de fomentis, cataplasmatibus, victus ratione, alui ductiōe, nihil sibi ad cōpletam notitiam deesse, idque ex longa experientia. Sed quid vel Hippocratē, vel aliū quempiam illo priorē induxerit, vt hæc inueniret auxilia, se penitus ignorare,

satis ipsis esse, si iam dictis reme-
 dijs cōmode vtantur, id qđ alios
 quoque artifices facere videmus.
 Neque enim faber, siue lignarius,
 siue grarius, neque cerdo, quo pas-
 cto artes suę fuerint inuētæ, inqui-
 runt, sed a præceptoribus edocti,
 vfu eas probant, & confirmant,
 atque sic clarum nomen assequun-
 tur. Equidem, vt verum fatear,
 quū medicos qui se empiricos ab
 experientia nominant, talia pfe-
 rentes audio, inducor certe vt p-
 bables putem eorum ratiōes, via
 denturque mihi, qui rationalem
 medicinam profitentur, cōtra il-
 los parum idonea se responsione
 tueri. Proinde vt per omnē æta-
 tem, ne temere cuiquā assentirē,
 • semp me continui, ita apud egros
 diu, multūque debita auxilia inue-
 stigavi, an videlicet logica demō-
 stratione indigerem, an sufficerēt
 ea præcepta, quæ ab experientia,
 & præceptoribus, atq; ex meipso
 didicērā. Igitur ea q̄ diutina inqui-
 m in

GAL. DE LOCIS AFFEC.

fitione longe optima iudicaui, ita
me dñament, veritatis amatores
docere non grauabor. Nihil enim
causæ est, quamobrem mentiar,
quod facere solent ñ, qui vni sectæ
addicti, omnem ex ipsa gloriam
querunt. quippe cōtētiose eos de-
fendere oportet, eam sectā verā
esse, quam vnicam nouerūt. nam
ex nullo alio disciplinarū genere,
gloriā sperare possunt. Ego vero
re ipsa, & publice, & priuatī, apud
eos videlicet qui sectam quālibet
a me discere cupiebāt, ostendi, in
omnium sectarū scientia (ne mas-
sus quicquā dixero) me esse post
habendum nemini. Quod si vni
sectarū patrociniū ferre, vel bre-
uibus quibusdā rationibus aggre-
derer, nemo tam facile me depre-
henderet. Non enim, vt nonnulli
faciūt, ex libris eas didici, sed præ-
stantissimis in vnaquaq; secta pce-
ptoribus vsus sum. Itaq; innotui
Romæ, tum primoribus eius vrbis
ciuibus, tum imperatoribus deias

ceps omnibus, & quidem ob artis
opera, nō ob sophisticas rationes.
quāobrē nihil phibet, quo minus
de vnaquaque secta vere dicā ea
quæ sentio. Igitur per artis exer-
citationem comperi, eam inuen-
tionē quæ ex vera demonstratiōe
procedit, in his quæ raro accidūt,
remediorum copia experientiam
longe superare. Equidem multos
morbos curavi, medicamentis ab
experientia maxime alienis, quæ
quidem in libro de curandi via &
ratione latius explicata sunt. Nūc
vero ea dūtaxat perstringā, quæ
nostro pposito magis accommo-
data videbuntur. Nam compe-
ri læsas actiones non solum in si-
milaribus partibus laborantibus,
• verumetiam in alijs quibusdam
• particulis, quæ licet actionem nō
habeant, vsum tamen quendam
præstare videntur. Sic etiam
instrumentalium partium mor-
bos, actioni nocentes deprehens-
di. Quibus præcognitis, inueni
m iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

deinceps morbos quosdam, continenter plurimos homines infestantes, alios vero raro accidentes.

Atqui experimenta tñ spectantes medici, non ea quæ raro, sed quæ crebro accidūt, memoria, & imitatione assequūtur. Quocirca dispositionū raro euenientiū, nō solum curationē, verum etiam puenientes ipsarū notiōes neglegūt. Proinde primū inuestigauī quomodo cognoscendę sunt, inueniē earum quasdam artificiali deprehēdi posse notitiā, nōnullas vero artificiosā vocata coniectura, atq; idcirco ipsas magna ex parte rectas. Eiusmodi enī est artificiosā coniecturę vis. Verum & has ipsas, & dispositiōes eis priores, quę videlicet artificialem notitiā admittunt, indigere semper inueni affectarum partiū notione. Itaque medicinā pfectus, vsque ad senectutē, nullā in hodiernū vsq; diē calūniam subñ, neq; curādo, neq; p̄sagiēdo. id quod celeberrimis

quibusdā medicis interdū accidere
memini. Quod si quis gloriam ab
artis opibus non a sophisticis ser-
monibus assequi voluerit, is citra
arūnam facili compendio collige-
re poterit ea, quę per omnem fere
ætatem diligenti inquisitione in-
ueni. Idq; sibi persuasum habeat,
hac via & ratione, medicamenta
me inuenisse, quibus morbos raro
euenientes curarem, quum antea
neque præceptorem vidissem huius-
modi morbos curantem, neque
ipse aliquod expertum haberē re-
medium. id quod, per deos immor-
tales, affirmare nequaquā timeo.
Quippe vitiosa actione, semp in-
uestigare studebā, quæ nā sedes,
vel ipsa afficeretur, vel alteri con-
sentiret. quūque eam inuenisse p-
suasum mihi esset, tum dispositio-
nem ipsam q̄rere, atque ex vtrius-
que, totius curatiui generis indi-
cationem sumere, simul remedio-
rum & quātitatem, & qualitātē,
& idoneam materiam inuenire.

GAL. DE LOCIS AFFEC.

Præterea cum prædictis, & ætatē, & naturam laborantis, tum anni tempus, & terram, & id genus alia, quorum ī Hippocraticorum librorū enarratiōe memini, perpendere operẽpcium ducebā. Verum superioribus duobus libris hūc præcedentibus, nisi fluxa admodū fuerit memoria, didicistis affectas sedes quinque modis posse dephendi. Nempe ab excrementis, atque ñs quæ affectis partibus adnascuntur, item actione læsa, quibus connumerantur & color præter naturā, & figura. Sed excrementa trifariam diuidūtur. aliquando enim affectarum sedium partes, ipsarum videlicet essentia vel soluta vel dissecta excernuntur, interdum ea quæ in ipsis cōtinentur, nonnunquā aliquid quod morbosas dispositiones sequitur. idq; vel solas, vel semper, vel magna ex parte. Cum itaque in quibusdam affectibus, nulla alia mihi pateret via, sola actionis læsio, sæ

tis cōducebat ad affectarum partium inuentionē.

QUAE DE MEMORIA PER-
dita, deque alijs affectibus
qui circa principem
animæ facultatem eue-
nire possunt.

Caput quartum.

Igitur cum deperditam
cuiusdam memoriā res-
tituere oporteret, esse
q̃ adhuc iunior, ac ne-
que præceptorem vnquam vidis-
sem, qui huiusmodi affectionē cu-
rasset, neq̃ ab antiquorum aliquo
curationem didicissem, apud me-
ipsum inuestigavi. Primū quidē
quænam pars esset affecta, cui to-
pica, id est localia vocata remedia
adhiberem, prius videlicet vni-
uersæ corporis curatione p̃missa.
Id enim cōmune præceptum est,
quod diligenti accuratione in om-
nibus morbis observare opotet.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Deinde quæ via, ratione, remedi-
orum singula inuenirem. Ceterum
affecta sedē eā ipsam existimaui,
qua princeps animæ vis cōtinet.
Medicamenta autē ea adhibenda
esse, quæ huius sedis dispositioni
aduersarētur. Interim oratos ha-
bere velim omnes, qui in horum
commentariorū lectionē incide-
rint, vt pruritū, solitudinē, vel
insaniā, quā de lectis conceperūt,
deponāt. deinde sic, vt p̄bos vi-
ros decet, dicendorū seriem cōsi-
derent. Equidē quū ea quæ iam su-
pra p̄posui, perpenderem, accepi
Archigenē librū quēdam, de ob-
læsæ memorię restauratione edi-
disse, quocirca omnes bibliothecas
ilico percurri, cōuenique bibliopo-
las omnes, atque medicos quoque,
quos & viri, & scriptorum eius,
studiosos esse sciebā, quo eius libri
copia mihi daretur, sperans in eo
remedia me inuenturum, locum
autem affectum minime, quod
plane scīrem nullam aliam a cor-

de sedem huic affectioni ipsum de
stinasse, secta ipsius constanter des
fendente, principem animæ vim
in ea parte sedem sibi vindicare.
Porro intellegere cupiebam quod
intemperantiæ genus, eius affectis
onis causam esse putaret, neque
enim dubitabam, quæ distemperā
tiam aliquam pro causa afferret,
vtpote qui sectam eius non igno
rare. Sciens itaque octo intemper
rantia genera in qualibet particu
la posse consistere, quatuor simpli
ces, & quatuor compositas, noscere
cupiebam, quod intemperantiæ
genus Archigenes læsæ actionis
causam esse declararet, frigus ne,
an humiditatem spiritus in corde,
an compositum ex frigore, & hu
miditate, aut ariditatem cum fris
gore, putaret huiusmodi posse af
fectionem producere. Etenim ma
nifestum erat, eum in hac re nihil
tribuisse calori. Sed quid demum
mihi acciderit, hīs qui huius sectæ
insaniam absteriserit, iam narrare

GAL. DE LOCIS AFFECT.

aggredior. Sane primos eius libri
sermões scripsi, vbi videlicet Ar
chigenes curationem scribere ag
greditur de letē recordationis, si
ue obliuionis, siue memoriæ amiss
æ, aut læsæ, vel vtcunque eam,
quam supra proposui affectionem,
nominare volueris, aut si nō affe
ctionem, sed morbum, aut acci
dens, aut infirmitatem appellaues
ris. talia enim a sophistis tractan
tur, quæ ne minimā quidam vti
litatem ad curationis rationem af
ferunt. verum quo clariora reddā
tur ea quæ posthac dicemus, hoc
prædicere necesse erat. Archige
nes vndecī libros epistolarū scri
psit, ī quorū primo, extat ad Mar
sium epistola, qua consuit, vt pa
tri memoriam restituere nitatur,
atque ab initio statim post proce
mium, vbi curationē tractare in
cipit, ita ad verbum fere scriptum
est. itaque modici sanguinis itera
ta detractio, incipiente etiandum
malo, meo quidem iudicio, non pa

rum conferre videtur, nisi laborantis forte ībecillitas obstitit. Deinde rursus iquit. Consultum mihi videtur, vniuerso quidem corpori, & irrigationes, & fomenta, deraſo vero capiti, cucurbitulas, adhibere. His intellectis (vt verū fatear) fastidio affectus sum. idque nō ab re, quod spe, quam de viro conceperam, frustratum me viderem. quippe qui milles, in multis commentarīs suis, affectorum locorum, atque dispositionis ipſorum scientiam, necessariam ad rectam curationem eſſe dixiſſet. Sed quid utilitatis inde conſequemur, niſi ab ipſis ad remediorum inuentionē dirigamur? Qua igitur o Archigenes probabili ratione perſuaſi, caput aggrediemur, relicto corde. cuius cognatū qđdam officium memoria eſt? Quā diſpoſitionē ſanādo cucurbitula capiti adhibita, memoriā reuocat? q̄ ratiōe huiusmodi ſuades remedia? ita nūc quoq; inter viſitādū egros, p̄ cōſes cōſulta

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tiones, video medicos inter ipsos interrogantes, qua ratione hoc potius, quam illud adhibere suaserit. atque si ne minima quidem negligunt, tantum abest ut tam grandia, qualis est cucurbitula capiti adhibita, prætereant. Neque video, si pectori e regione cordis fuisset adhibita, qua ratione Marsi patrem iuuare potuisset. Præterea proposita iam verborum series, non explicat, utrum concisa ante scalpello, an integra cute, cucurbitulâ thoraci aptare voluerit. Si enim forte fortuna, ut nonnunquam euenire solet, frigida aridaque fuerit dispositio, sanguinis quidem destructio ad extremum ducit periculum, solæ vero cucurbitulæ, non alio nomine, quam caloris excitandæ gratia, vtilis esse cœntur. Cucurbitulæ enim attrahunt ad sese humorem ex imo, id quod aridæ dispositioni maxime adueriat. Ignota itaque dispositione, quæ vel caput, vel membranas ipsius afficit,

haudquaquam tutum fuerit, in exteriores caluariae partes materiam retrahere. Sic enim praedicere debuerat, si frigida humidaque affectio fuerit, capite hoc modo disposito, curationis summam in calfaciendo exiccandoque statuere, atque praesidiorum materiam, quae huiusmodi habeant facultatem, adhibere oportet. Quumque vix ex obscura me vertigine recollegissem, sequentia etiam legere aggressus sum, inuenire me posse sperans, si non per ordinem, saltem sine ordine, huiusmodi aliquem sermonem, qualis is erat, quem nuper exempli causa praecurrimus. deprehendi itaque omnia praesidia per delectum vehementer calorifica atque exiccantia, adeo ut totum caput, synapismo ab ipso vocato, calfaceret, quamuis vehementissimum sit medicamentum. Deinde ablato sinapi, caput nitro conspergere, mox aqua rigare iubet, quo medicamine nullum in arte medica violentius inuenies. si

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quidem dolorē veluti cauterium
excitat. sed diutius durat eius ope-
ratio. Itaq; Archigenes inferens,
inquit. Igitur intolerabilem habet
dolorē, neq; vlli vel maximorum
præsidiorū cedit hoc medicamē-
tum. quippe ex sinapi, nasturtio,
grano gnidio, vua taminea (sta-
phidagrian Græci vocant) apo-
phlegmatismos instituit, ac ster-
nutamenta mouere, & potiones
propinare iubet. vtraq; ex vehē-
mēter calidis aridisq; medicamē-
tis componens. Vt facile constet
ipsum credidisse. ad humiditatē,
& frigiditatem, vel cerebri, vel
membranarum, hanc dispositio-
nem pertinere. Huiusmodi enim
dispositio, si caluariam tantū affe-
cerit, hominem memoria haud
quā priuabit. Verum hæc obiter
propterea dixerim, quod exiccā-
tia calorisq; remedia inducit.
q̄q; nusquā ab ipso explicatū est,
humore frigoreq; obliuionem cō-
stare. Sed quis non indignabitur,

Videns caput tantis vexari ne /
 gocñs, alia videlicet parte affe-
 cta? Cæterum id quod de cucur-
 bitulis ab initio indeterminatè pro-
 tulit, postea pergens huiusmodi
 verborū serie manifestissime de-
 clarat. Atque irritationes (in-
 quit) quas sinapi, cucurbitulæque
 intulerunt, leuare oportet. quip-
 pe quæ interdum mitiores, in-
 terdum vehementiores esse so-
 lent. Atque efficaciores sunt il-
 læ, quæ concisa prius cute, ad-
 aptantur. Verum o clarissime
 Archigenes, nulla tibi suffragari
 ratio potest, quam obrem capiti i-
 sta adhibeas, si affectio consistat
 in corde. Neque ab experimen-
 to, vt interim empiricos alloqua-
 mur, talia possūt inueniri. Æstuās
 quispiam sub ardente febris, fris-
 gidam aquam per intemperan-
 tiam ingessit, & nonnihil præsi-
 dñ expertus, medicis imitationis
 viam, nulla interueniente ratio-
 ne, aperuit. Cucurbitula vero,
 n.ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nulla occasione duce, sed sola idi-
cāte ratione adhibetur. Neq; enī
sua sponte cucurbitula sese ada-
ptare, neq; etiā si hoc detur, per
occasionem aliquā capiti adhibe-
ri potest, præsertim in ea affectio-
ne, quę raro euenire solet. Inter-
roganti vero mihi nostrę tempe-
statis medicos, præcipue senes, &
exercitados, curassent ne vnq; hu-
iusmodi affectū? oēs pene respon-
derunt, nunq; id se tentasse, vno
duntaxat excepto, qui diceret cu-
rationem quidē aliquando se ag-
gressū, nihil vero p̄fecisse. Quo
pacto igitur eorum, quę ex occas-
sione duntaxat apparent, auxilia,
vel experimento, vel imitatione
cognoscemus, cū raro eueniat hu-
iusmodi affectus, neque sua sponte
possit cucurbitula per occasionē
capiti adaptari. Frigide enim pos-
tio, cæteraque id genus remedia,
quorū quotidie in multis creber-
rimū facimus periculū, per expe-
rimenta inueniri possunt. sed cū

curbitulæ appositio, siue concisa prius cute, siue ea integra fiat, ab experientia occasionem accipere non potuit. Quum enim reliquarum affectionum sedes, quamuis non exacte, ad inuentionem tamen remediorum, satis sensibus dinoscantur, in memoria id conceditur minime. Reliquas voco affectiones, vt lateralem morbum, peripneumoniā, nephritidē, dispositionem colicam, hepaticam, splenicā, aut vesicæ, aut vteri affectus, atque id genus cæterarum partium. In quibus omnibus, & dolores, & ea quæ per meatus excernuntur, & si non exactissime, saltem in latitudine, sedem affectam declarant. In laterali enim morbo facile est vniuerso lateri adhibere quicquid volueris, similiter venter in colica, quemadmodum si hepatis aut lienis inflammetur, præcordiis, atque haud secus in cæteris partibus. Deperdita vero memoria, nullum affecti loci signum, n. iñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

neque tumor præter naturam,
neque dolor aliquis, neque excretio,
neque aliud quidpiã extat. Quæ
admodum neque in melancholia,
phrenitide, mania, morbo comi-
tiali, lethargo, sopore, & in ea af-
fectione quam recentiores medici
catochen, id est vigilantem sopo-
rem nominant, atque catalepsi, id
est occupatione, ac ne in his quidẽ
affectibus, qui vel toto corpore re-
sident, vt spasmus, & saltibus, vel
altera duntaxat medietate, vt pa-
ralysi. nullum enim signũ ab his
tanq̃ ex radice prodit. quippe ne-
que tumor præter naturam, neque
dolor, neque color a priori muta-
tus, neque excrementa, vnde Ar-
chigenes potuisset iuenire reme-
dia. siquidẽ nugaces sunt empiria-
corum occasiones, atq; Archige-
nis sermo nos ducit ad cor. Verũ
si concedamus ab experientia, dia-
ctarũ affectionũ auxilia prod̃isse,
nunq̃d manifeste deprehendetur
falsa illorũ arrogãtia, qui rationa

les vocātur? ac ne simplex quidē
 illa reprehensio erit, sed gemina.
 atq; vtraque fortis? Si enī vsque
 adeo vtile est experimentum, vt
 non solum citra rationem inue-
 niat remedia, verum etiam coar-
 guat rationem tanquā aperte fal-
 sam, tantū abest vt ratio dogma-
 ticus medicis sit vsui, vt etiam no-
 cere videatur. Sed (vt aiunt) satis
 reprehenditur id quod inutile esse
 ostenditur. Quod si ratio alie-
 quando etiā nocere videatur, qđ
 maius argumentum desideras, qđ
 rationis vitium ostendatur? Por-
 ro multas de principe vi aīę ratio-
 nes, dialectico more interrogā-
 do inductas, vna cum affectorum
 locorum vsu, quibus euincere pos-
 sis, in animalibus affectibus, auxi-
 lia cordi adhibenda esse, ita subia-
 to contempsit Archigenes, alios
 qui in curandi ratione exercitas-
 tissimus, vt neglecto pectore, ca-
 piti cucurbitulas adaptaret, ipsū-
 que, licet haudquaquam affectū,

a. iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

& incideret, & vreret. Num igitur per Iouem mētitus sum paulo ante, cum dicerē rationalē viam, quod ad remediorum inuentionē pertinet, omnino prodi ab his scilicet, qui patriæ, quam sectæ suæ prodicionem, æquiori ferrent animo? quippe prodicionem esse arbitrantur, si vera discendo, dissentiendū sit his, quibus ea secta descenditur. Igitur vt in præsentia, turpem contentionem manifeste declarant, sic etiam haud obscure dementiam suam produnt, cum putāt omnia sua decreta turbari, si aliquando, vel in vno reprehēdātur. Placitorum enim alia, mutua consequentia cohærent, alia inter se pugnant, alia neq; consequuntur sese, neq; pugnant, vt in hac ipsa de principali animæ potestate, quæstione. siue enī in corde, siue in capite sedem ei statueris, poteris de naturæ elementis, quācunq; volueris eligere opinionē, cū priore sententia, neq; pu-

gnando, neq; consequens aliquod adducendo. haud secus de generatione quoq; & corruptione, de animę essentia, de dñs, de prouidentia, de fato, itē genitus ne sit mūdus, an ingenus, finitus, an infinitus, præterea an plures sint mūdi, numeroq; incōprehensibiles, an vnus duntaxat. quippe nulli iā dictorum placitorum repugnat, neq; ad vllum ipsorū sequitur, ea quę de animę vi principali habetur opinio, siue in corde, siue in cerebro eam contineri dixeris. Itaq; prodūt vniuersam sectam rationalē, qui huiusmodi scribunt curationes, cū de præcipua animi vi, adeo manifestæ sint demōstrationes, vt omnibus fere hominibus nota sit pars qua residet, solis medicis summisq; philosophis qui in corde eam collocant, nō apparet. Demōstrationes vero ipsas, in cōmentarijs quos de Hippocratis, Platonisq; decretis edidi, iam dixi. Porro rationalē animę vni in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cerebro, virilē vero, atq; irascibi-
lem in corde, concupiscibilem in
iecore sitam esse, nemini non per-
suasum est. Id quod quotidie dicē-
tes audiendo, discere licet. Qui p-
pe fatuum, aiunt cerebrum nō ha-
bere. Timido & pusillanimi, cor
deesse. Tityo vero iecur ab aquila
erosam, non solum poetæ, verū
etiam pictores, sculptoresque fin-
gunt. Sed tempus est vt ad propo-
situm redeamus. ¶ Sane in confes-
so est omnibus medicis, si opa spe-
ctes quę rationali potestate affecta
laborantes faciunt, caput propri-
am rationis esse sedem. proinde con-
sideremus oportet, qualis sit in v-
naquaque affectione dispositio, de
læsa memoria principium facien-
tes, tū quia iam de ipsa loqui sta-
tuimus, tum etiā quia crebro ipsa
nobis occurrit, vitiata simul quo-
dammodo ratione. Quemadmo-
dum si ratio lædatur, memoriam
quoque lædi contingit, vtriū-
que noxa ab eadē dispositione p-

ce dente, quæ ubi vehemētius intenditur simul cum memoria, ratio quoque deperditur. Quæ affectio, stultitia nominatur. Sic in lethargo etiam, atque omnibus soporosis affectionibus, utreque pereunt. Atque dispositionem ipsam, secundum primum genus, similem esse necesse est, nempe intemperiem. Iam enim explicauimus, eam similarium partium, quæ primo operantur, communem esse dispositionem. Secundum vero alterum genus, frigida omnino intemperies est, ipsa enim animales actiones torpidas efficit. id quod animalia quæ per frigora latere coguntur, haud obscure declarant. Id etiam in frigidis medicamentis videre est, ac frigidis quoque cibis. siquidem lactuca graues inducit somnos, si multam ipsius quantitatem quis ingesserit.

¶ Verum etiam capitis grauitates, quæ videlicet sine mordaci instant dolore, somnum, soporemque

GAL. DE LOCIS AFFECT.

afferunt, quibus apophlegmatiss
mi magnifice opitulari videntur.
Ad hæc non mediocri argumen
to sunt, capitis & ardor & refri
geratio. siquidem ardor, vigilias,
refrigeratio, soporẽ inducit. Item
biliosi calidique morbi, vigilias,
deliria, phrenitides. contra, pitui
tosi frigidique, ignauiam, soporẽ
que efficiunt. Quippe quod ad vis
galias, soporesq; per morbos per
tinet, calida, frigidaque intempe
ries, primã sibi facultatem vendi
cat. altera vero ab hac, ad humi
ditatem ariditatemque refertur.
Item balneæ quoque, eo quod ca
put madefaciunt, soporiferæ sunt.
haud secus vini moderata potio,
omnes cibi humectantes, atque ex
ætatibus pueritia quidem, ob hu
morem somnolenta est. Senes ve
ro ob ariditatem, vigilis vexan
tur. Igitur omnia hæc argumẽto
esse possunt, ad animi ignauia in
ducendam, humiditatem præter
naturam, secundas partes obtine/

re, frigiditatē vero priores. Pro/
inde vt humiditas abūdās, vel so/
la, longos, profundosque somnos,
ita ariditas quoque sola, vigilias ef/
ficat. de quibus dispositionibus ab
Hippocrate dictū est. Somnus aut
vigilia, si alterutrum modū ex/
cessit, malum est. Quod si frigus
cum humore vehementer inten/
datur, soporem, stuporemque cō/
stituit, sine hoc vero, memorię no/
cet, stultitiamque iducit. Quum
itaque non solū in frigiditate, hu/
miditateque, verum etiā in aridita/
te, & calore, non paruum, secū/
dum magis et minus, sit discriminē,
nihil mirum si multifarię inueni/
antur causę, quę animales actio/
nes lædere possint. Cæterum cla/
rioris doctrinæ gratia, rationalis
animę actiones, principales, irrati/
onalis vero, mortales vocentur,
sed has in præsentia silentio præ/
terire decreuimus, nondum enim
vel cordis, vel iecoris affectus, tra/
ctare proponimus. Igitur quemad/

GAL. DE LOCIS AFFECT.

modum somnus, & vigilia, si modū exceſſerint, ille ob humiditatem, hæc vero ob temperantiam fit arida, ita & in his ipſis, & magis, & minus, tum in ſomnis, tum vigilis, ſequitur maiorē, aut minorē, vel humiditatē, vel ſiccitatem. Cūque bifariam (vt iam declaratū eſt) fiant huiuscemodi intemperies, duplex quoque erit vtriuſque diſpoſitionis modus. vnus quædam in humidis, ſiccisque humoribus, alter vero in corporibus ſolidis, ſi aliquando in eaſdem intemperies ſolidę partes atque molles inciderint. Præterea quamuis iam dictæ temperies ſint contrariæ, fit tamen ex ipſis mixtum quoddam temperamentum, vt in vigilanti ſopore, quū pituiroſus bilioſusque humor abundauerit. Ita & calidi frigidiq; cōtrarietate, eoſdem quoque modos inuenire licet, tū ſimplicibus intemperantibus, tū ex ambabus cōpoſitis. Pituitæ enim ſi bilis miſceat, flauā dico, mixta

fit ex calido frigidoq; dispositio. Quod si in solidis corporis partibus, mixtam ex contrarijs dispositionem fieri fateamur, tres ab ipsa prodibunt in vnaquaque contrarietate intemperies. Igitur huiusmodi affectus oēs, capiti aduenire solent, sed inter se differunt, nō solum mixtionis varietate, aut eo quod magis minusue intenduntur, tum in simplicibus, tū mixtis dispositionibus, verum etiam quod ventriculi cerebri, interdum afficiuntur huiusmodi intemperantīs, interdum vniuersa eius vasa, aut humiditas quæ per corpus cerebri dispersa est. Accedit ad hæc quartus quoq; modus, quum videlicet ipsummet cor / pps cerebri intemperatum red / ditur.

¶ De stultitia, sopore, lethargo, phrenitide, & mania.

Caput quintum.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

QUORUM itaque vel memoria, vel intellectus per-
runt, somnos observare
oportet (quippe intelle-
ctus amissio stultitia est) utrum ve-
hementer, an modice somnolenti
sint, aut omnino non somnolenti,
sed quantum ad somnum pertinet,
secundum naturam sese habeant.
Sic enim vincentem inuenies in-
temperiem. Præterea consideran-
dum est, utrum excernant quipe-
piam, vel ex naribus, vel ab ore,
quod a capite defluat, an aridæ
huiusmodi partes sint. quippe ex
his dispositionem ipsam, coniectu-
ra consequi poterimus. Quem-
admodum in destillatione & gra-
uedine usu venit. siquidem in his,
& qualitas, & quantitas excremen-
torum, atque causarum quæ præ-
cesserunt contemplatio, capitis
dispositionem declarat, siue ca-
lida ea fuerit, ut in vitione, si-
ue frigida, vel in refrigeratione.
Nisi enim omnia hæc discrete co-

gnoueris, idoneam dispositioni curationem haudquaquam inuenies.

¶ Cum igitur vel perit, vel grauiter lesa est memoria, frigida omnino intemperies est. quocirca calefacere ipsam oportet, at vero exiccare, aut humectare, non necessarium est, sed si humiditati copuletur, arefacere, si ariditati, madefacere. Cæterum si inter has medium obtinet, ipsum conseruare oportet. Equidem noui quendam, *h. 7. stria* qui ob laborē in studiis, atque vigiliis, memoriam pene amiserat, læsa etiā ratione. Item agricolā, qui ob labores quos vites colendo subierat ac tenuem victum, eodem modo affectus est. atque non exiccantibus, calorificisque lædebantur, madefacientia vero, quæ calefaciendi quoque vim haberēt, haud mediocri ipsis erant præsidio. Interdum vero, ubi principales actiones læsæ sunt, febris quoque accedit, ut in phrenitide, & lethargo. interdum sine febre vitium est,

GAL. DE LOCIS AFFEC.

vt in mania, & melācholia, id qđ
modo per consensum, modo pri-
maria affectione cerebro laborāte
accidit. Quū igitur proprijs acci-
dentibus, exacte discernuntur hu-
iusmodi vitia, & perpetua sunt,
neque alijs p̄cedentibus supue-
nerunt, primogenia affectione,
quum vero proprijs accidentibus
discerni non possunt, neq; perpe-
tuo permanent, atque ad alias affe-
ctiones consequuntur, per consen-
sum ipsa cōstare dicimus. Neque
latere nos debet, vbi p̄ cōsensum
quis afficit, fiatq; adhuc affectio,
qđ deletis afficientibus ipsam causā
sis. ipsa quoque simul deletur. Si
vero consentientes partes, perma-
nentem iam habeāt dispositionē,
quāuis quiescat causa efficiēs, ipsa
tamen permanebit affectio. Igitur
qđ in cerebro cōsistant oēs princi-
paliū animæ viriū affectus, in
confesso habēt omnes medici, nisi
quis vni fortasse sectę addictus, ali-
ter in animo sentiat, aliter depro-

mat ex ore. At qualis sit intempe-
ries, non sine negotio inuenitur.
ea enim res laboriosum medicū,
qui inquirendo non fatigetur, desi-
derat. non quidem quo pacto ve-
teres reprehendat, qui de principe
animæ vi, & vere & clare scri-
pserunt, adeo vt priuatis quoque
p̄suasum sit, ipsam in cerebro cō-
sistere. Sed philosophis fortasse,
vtpote in ocio degētibus, facilius
pro hoc errore quis veniam dede-
rit. Medicis vero, qui iam in ope-
ribus ad senectutē vsque versati
sunt, quum de hac re contendūt,
tantum abest vt ignoscamus, vt
etiam ignominia dignos esse cen-
seamus, quippe qui vigilantibus,
delirantibus, phreniticis, lethar-
gicis, caput irrigare cōsueuerūt.
Nam & Archigenes quoque, vbi
vitiata memoria medicanda est,
aut stultum medicari aggredi-
tur, capiti remedia adhibet.
Quis vnquam exercitatus medis-
cus apoplexiam, morbum comi-

o. n̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tialem, opisthotonon, emprosthotonon, neruorum distentionem, aliter curauit? quis denique mediam partem corporis resolutam? Nūquid vero ubi nerui conuulsione afficiuntur omnes medici, vel experimenta etiam professi, summā curationis esse cēsent, primis veris febris remedia adhibere? quemadmodū ubi media quoque vniuersi corporis pars resoluta est. Porro cerebrū quoque calefaciūt, quēadmodū apoplecticos quoque curare consueuerūt. Sic etiam per morbum comitiale, quum enim vel a stomacho, vel ab alia quapiam parte affectio pcedit, eā maxime & in primis curare præcipiunt. Cerebrum vero ita preparant, vt non ita facile afficiatur. Hęc itaque potissimum inquirenda sunt, non principalis animę vis, quā nemo, nisi peruersa fuerit mente, nō aptissime cognoscit. Neque neruorum originem, diuinantiū more, a dijs petere, sed ab experto dissecatore

discere oportet. Sūt enim nōnulli
 qui sibi iam persuaserūt, neruos a
 corde oriri, eo q̄ nequeunt inter
 syndesimum, neruūque discernere,
 accedente etiā ononyma, quip
 pe copulæ a multis medicorū cola
 ligantes nerui appellantur. Verū
 nulla vexabimur nominis iuidia,
 si modo non syndesmos ipsos, sed
 voluntarios (vt ipsi aiunt) neruos
 intellegāt, quos scilicet a cerebro
 initium accipere dicimus, Neque
 enim illi, aut conuulsionem, aut
 paralyfin, ad syndesmos referūt,
 sed eorum neruorum qui volun
 tatis imperio obediunt, affectionē
 esse dicūt, Conuulso enī vniverso
 corpore, omnes quidem autumāt
 affici talem quāpiam partem, quē
 vt in arbore caudex ramorū, sic
 ipsa sit omnium neruorū commu
 nis origo, idq̄ veluti caudex, nō
 paucorū in vna parte, quēadmos
 dum ramus, vt si vel crus, vl alte
 ra manus forte fortuna conuellan
 tur, totius mēbris cōuulsio, neruos

o in

GAL. DE LOCIS AFFEC.

rum qui ad ipsum proueniunt, originem affectam fuisse declarat, ram cuiuspiam exemplo in arbore. Qd si vniuersum corpus afficiat, communem originē, omniū infra faciem neruorū, quæ arboris caudici proportiōe respondet, affectā esse putandum est. Hæc origo ad primas spinalis medullæ partes refert. Proinde exercitatissimi quisq; medici, huic remedia adaptāt. cordis vero, an originis rationem in hac affectione habeat, nullam omnino mentionem fecerunt. Si vero simul cum vniuerso corpore facies quoque conuulsa videat, nō solū eam partem quæ ex spina pcedit, verum etiam cerebrum ipsum curamus. etenī labra quoq; sæpenumero conuulsa videmus, item oculos, frontis cutem, totam mandibulā, similiter & lingue radicem. At quia omnes iam dictas partes, a musculis ex cerebro nervos suscipientibus, moueri ex anatomice didicimus, cerebrum, ipsis

sic laborantibus, credimus esse af-
 fectum. vbi vero ipsis illæsis, cæ-
 teras partes conuelli viderimus,
 spinæ initium affectum esse fate-
 mur. Hęc igitur sunt quæ prom-
 pte discere, mox ipsorum disposi-
 tiones considerare oportet. Sed
 sunt nonnulli medici, qui disposi-
 tiões ipsas ne aggrediuntur quidē,
 sed certant super rebus manifeste
 apparentibus, iacturāque tempo-
 ris, quod non consumere oportet
 respōdendo nōs qui recta medico-
 rum decreta euertunt, sed inue-
 niendo potius ea, quæ illi silentio
 præterierūt. Et vel haud quaquā
 res ipsas definierunt, aut eas sine
 demonstratione, aut sine idonea
 definitione, aut non satis abunde
 explicauerunt. Quemadmodum
 Hippocrates, vbi neruorum con-
 uulsionem, vel ob plenitudinem,
 vel vacuitatem fieri dicit. Etenī
 verus est sermo eius: quibus vero
 rōnibus fulciat, vt fides ei adhibē-
 da sit, non popularibus, sed doctis
 o iiii

GAL. DE LOCIS AFFECT.

duntaxat viris, & qui diligenter
prima medicinæ rudimenta didis-
cerūt, notū est. Hęc igitur quum
di dicissem, facile mihi persuasi, cō-
uulsionem fieri ob eas causas, quę
ab Hippocrate dictę sunt. quippe
si omnis motus q̄ a voluntate pce-
dit, attractis musculus in eas q̄bus
innascuntur partes, fieri videtur.
Neq̄ possit fieri attractio, nisi ad
suam originē retrahatur muscu-
lus. Constat conuulsionem in con-
uulsis partibus factam, hac sola ra-
tione a motu naturali differre, qđ
pręter voluntatem fit. Itaq̄ quę
admodū in eo, qui secūdū naturā
habet, voluntas in cerebro iuxta
neruorum originē ordinata, mo-
tionis principium, primis dat ner-
uis, ac per ipsos, musculis. Ita si si-
ne huiusmodi principio, inueneri-
mus, quę causa nervos conuellere
possit, modum quo cōuulsio fiat,
nos iam scire, non temere profite-
bimur. Etenī si videris aliquando
nervosa corpora, vt lyre chordas,

ob ambientis aeris immodicā intē-
periem, adeo vehemēter, vt rum-
pantur, intentas, haud difficulter
intelleges, idem in animantium
quoque neruis posse contingere.

Sed quomodo affecto aere tendun-
tur chordę, vt rumpantur, si vel
nimis aridus, vel admodum humi-
dus sit? Nempe humor madefacit
ipsas, vt in tumorem præter natu-
ram attollantur, qui mox eas ex-
tēdit. Ac veluti sol tergora arefa-
ciens contrahit, ita siccitas, chors-
das, & trahit, & extendit. Sic lo-
ra quoque, quum ad ignem exiccā-
tur, contrahi tendique videntur.

His ita præcognitis, haud difficile
inuentu fuerit, utrū ab ariditate,
quæ est humidę essentię defectus,
& vacuatione, an ab humoris ple-
nitudine, quæ egestati aduersa est,
& ab Hippocrate repletio noīata
est, affectus ipse prodierit. quippe
quū cōuulsio fit, vel a labore, vel
vigilijs, vel fame, vel sollicitudis-
ne, vel arida æstuantēque feбри,

GAL. DE LOCIS AFPEC.

qualem in phreniticis videre est, causam eius esse ariditatē, vacuationemque recte putaueris. Si vero temulento cuiquam, ac omnino pleno homini, qui videlicet in ocio degit, id euenire cōspexeris, non ab re a cōtraria causa cōuulsionē ortū habuisse iudicabis. Atqui euacuationi, contraria est repletio.

¶ Atque morbus quoque comitialis conuulsio est omnium corporis partium non perpetua, vt in emprosthotono, & opisthotono, atq; tetano (id est neruorum rigore) videre est, sed quæ ex temporum accidit interuallis, neque solū hac re, sed mentis quoque, ac sensuum oblesione, a iam dictis cōuulsionū generibus differt. vnde cōstat in supremis corporis partibus, cerebro videlicet, hunc affectum cōsistere. Ceterum velox eius discussio, crassum humorem, spiritus meatū in cerebri ventriculis, obstruentem, hūc maxime affectum peperisse declarat, neruorū prin-

eipio seipsum quatiente, quo excu-
 tiat id quod noxium est. Ac for-
 tass per morbum comitalem cō-
 uulsio haud absimilis est his quæ a
 spinali medulla incipiunt conuul-
 sionibus, singulorum neruorū ir-
 rigatis processibus. Verum nō ab
 ariditate, vacuatiōeq, sed a cras-
 so semper humore, hanc affectio-
 nem induci, argumento est, quod
 & subito fit, & soluitur cōfestim.
 nam subitariam meatuum obstru-
 ctionē a crasso viscosoque humo-
 re fieri constat. Etenim breui tem-
 pore fieri non potest, vt vel cere-
 brum, vel tenuior ipsius membra-
 na, ad tantā perueniat ariditatē,
 vt corio simile quippiam pati vi-
 deatur. Accedit ad hæc, vt is qui
 sic laborat, neque videat, neq, au-
 diat, neque vllō sensu quicquam
 percipiat, ac ne consequi quidem
 possit, quid factum sit. Siquidem
 cum memorię viribus, ratio quo-
 que læditur. Ex his igitur omni-
 bus plane constat, in cerebro hæc

GAL. DE LOCIS AFFECT.

affectionem consistere, impediēte humore animale spiritū, qui in ventriculis eius continetur, quo minus possit exire. Porro quam obrem hic spiritus vocetur aīalis, aut quēsit eius potentia, in eo commentario, quem de Hippocratis, Platonisque placitis scripsimus, iā demonstratum est. Sane quum ea, quę p dissectiones apparere solēt, accurate consideremus, rationi consonum videbatur, animam in cerebri corpore sedem obtinere, atque in ipso, & rationis vim, & sensibilibus imaginum memoriā residere, ac primum ipsius instrumentū, tū in sensibilibus actiōibus omnibus, tū in his quę a cōsilio & voluntate prodeunt, spiritū esse, qui in ipsius vētriculis, maxime, quę postremo, continetur: quāuis non contēnendus sit medius ventriculus, perinde quasi non valentissimus sit. multis enim rationibus inducimur, vt hunc amplectamur, duos vero anteriores des

seramus. Verum exacta horū notitia, ad curationis inuentionē nihil fere conducit. Nam satis fuerit ad probe curandum, nosse sedē affectam esse cerebrum, atque in eius ventriculis humorem crassū & viscidum comprehendī. ¶ Igitur quemadmodū ea, quorum gratia, & affectas sedes, & earum dispositiones inquirimus, sic crassorum quoque humorum differētię, vtrum videlicet pituitę, an atrę bilis naturam habeant, haud mediocriter ad curationem conferre videntur. Si tamen in pręsentia nō obliuiscamur, quod quum simpliciter dicimus, Pituitosos quid ē eos nominari, in quibus humiditas frigiditasque, Melancholicos vero in quibus siccitas atque frigiditas, dominantur. quamuis magnę, peculiareſque interim differētię, tum pituitę, tum atrę bilis inueniantur. Pituitę quidem, vnum genus est, quod quotidie vel feresando, vel vomendo, vel emungē

GAL. DE LOCIS AFFECT.

do educitur, vaporoso scilicet spiritu plenum, ut ne sensum quidē lateat, ipsum esse dissimulare. Aliam vero pituita, similis quidē videtur, licet fortasse non sit similis, qualis est crudus humor qui in vrinis substat, a Praxagora vitreus appellatus. Atque ex hoc genere esse videtur saliva, quæ neque fluida admodum est, neque aquosa. Verum saliva non unica duntaxat qualitate gustum afficit, nec dū vniuersa pituita. Sæpenumero enim & acrem, & acidam, & salinam in ore salivam, manifeste deprehendimus, veluti cū sani degimus, nulla qualitate infecta, sed p/inde quasi aquosa, saliva gustui offertur. ¶ Sic atrabilis quoque ob substantiæ varietatem non obscuras habet differentias. Nam alia est veluti sext sanguis, quā admodū spissa est, fecibus vini haud absimilis. Alia vero, quā superior, essetiæ ē multo tenuioris, atq; vomētibus ea, et olfaciētibus, acida videt, que

etiam terram radit, attollit, & fermentat, atque ampullas quales feruētibus iusculis supnatare videmus, excitat. Sed ea quam crassæ feci similem esse dixi, in terram effusa, non inducit feruorē, nisi forte in ardente febrī, ipsam præassari contingat, neque vlla etiam acida qualitate participat, quādoquidem & ipsam nominare consueui melancholicum succum, aut melancholicum sanguinem. Hæc enim, meo quidem iudicio, non recte atrabilis appellari potest. Prouenit autem huiusmodi humor in quibusdam plurimis, vel a temperie ab initio cōparata, vel a cibis, qui (quum in venis concoquuntur) in huiusmodi humorem transmutari solent. ¶ Igitur vt crassus pituitæ succus, ita hic quoque, comitialē morbū solet efficere, vbi ī meatibus vētriculorū cerebri retinetur, siue is medius sit, siue postremus. Vbi vero in ipso cerebri corpore abūdat, eā insaniæ spetie

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quam Græci melācholiā vocāt,
efficit. Quemadmodum alter atrē
bilis succus, qui præassata flaua bi
le nascitur, ferina deliramēta in
ducit, modo sine febre, modo cum
febre in cerebri corpore abundās.
Atque hanc ob causā phrenitis
nonnunquam mitior est, quā vi
delicet a pallida bilē ortum cons
traxit, interdū vehemētior, quā
flaua bilis eam peperit. atque insu
per alia nonnunquā dementia oc
currit ferina & melancholica, fla
ua bile præassata. Deliria autē, quę
per febrium vigores accidunt, nō
propria cerebri affectione, sed per
consensum fiunt. proinde eos deli
rare & desipere, non solum medis
ci, sed priuati quoque dicere cons
sueuerunt. Verum ita affectos non
nomināt phreneticos, eo q̄ phres
neticorum insania, non quiescit,
mitigato febrium vigore. Igitur
quemadmodū phreneticis, febris,
vnum quoddam accidens disposi
tiōem cerebri censetur. sic e cons

uerso in ardētium febrium demē-
tia, multis elatis ad ipsum vaporibus.
Haud secus fit ea affectio quæ
suffusioni in accidētibus similatur,
a ventriculi dispositiōibus ortum
trahēs. Nanque cerebrum vētri-
culo, & ventriculus cerebro, suas
affectiōes transmittit, idque pro-
pter neruorū a cerebro ad os vē-
triculi descendentiū magnitudi-
nem, per quos etiam sensus huic
particulæ, quam vlli reliquarum
corporis partium acutior est.

¶ Quocirca capitis fracturas, quæ
ad membranas vsque perueniūt,
biliosus vomitus, ac interdum do-
lores capitis, quomodocunque fi-
ant, nausea, stomachique morsio
comitatur. Hypochondriacas ve-
ro & flatuosas vocatas affectiōes,
melancholica tristitia sequitur,
haud secus quam acutam febrem
dementia, & quibusdam oris ven-
triculi dispositiōes, ea quæ in acci-
dentibus suffusioni similatur affe-
ctio. Sic neruosis partibus inflama-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

maticis, promptius quam reliquis, delirium superuenire solet, idque ascendēte ad caput interdum per cōtinuas partes, solo calore, iters dū vero spiritu vaporoso, vel fuz moso, aut fuliginoso.

¶ De melancholia.

Caput Sextum.

Porro quemadmodū hę passiones, quibus caput per consensū afficitur, ita illę quoque qui primigeniæ ipsius affectiōes sunt, nō parū inter se differunt. Igitur crassī humores, qui in cerebri substantia abūdāt, interdum ei vt instrumentali, interdū vt similari parti nocent. Quum enim meatus obstruuntur, vt instrumentali, quū vero temperamentum alteratur, vt similari. Proinde totus hic sermo in fine sexti libri de vulgari/ bus morbis pręscriptus est. Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur, & cōtra, morbo comitiali laborantes, efficiūtur

melancholici. Atque horū vtrūq;
libet magis accidit, prout vel in
hanc, vel in illam partem, infirmi-
tas repit. si enī in corpus, epilepti-
ci, si vero in mentem, melanchos-
lici redduntur. Hoc sermone pri-
mum quidem declarauit, quod nō
semper, sed magna ex parte horū
affectuum alter in alterum trāsit.
Quippe non solum atra bilis, ves-
rum etiam pituita morbum comis-
tialem committit. Igitur ea quam
atrabilis constituit, in melanchos-
liā transit. quę vero a pituita par-
ta est, in aliam affectionem de qua
paulo post dicturus sū, permuta-
tur, melancholiam vero haudqua-
quam efficit. Altera vero Hippo-
cratici sermonis pars, non parum
contēplandi locū desiderat. quipa-
pe quum anima sit aut temperas-
mentum actiuarum qualitatum,
aut ab ipsarum tēperamento per-
mutetur. Bilē, quū cerebro veluti
pti instrumētali nocet, ad cerebri
corpus cōuerti ait, id q̄ in obscuris

p n

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tionibus fieri constat. Quū vero temperamentū mutando, ei vti simili nocet, ad mentem eam reperire dicit. ¶ Verū hoc quod medici dereliquerunt, definire in primis necessarium esse videtur. Nēpe vti in manifestis corporis partibus, interdum omnibus, eadē apparet temperies, vti in morbo regio, & elephāte sic vocato, & aqua inter cutem, & malo habitu, quæ a Græcis cacexia dicitur. Insuper in his quæ ab hepate, atque splene pendent, colorum vitia. Interdū vero vnius duntaxat partis, quæ videlicet aut biliosum, aut pituitosum humorem suscipit, temperies permutatur. Ita etiam cerebro accidit. vti nōnunquam vniuerso in venis sanguine melācholicō effecto, ob commune vitium, ipsum quoque lædatur. Nonnunquam vero, reliqui corporis sanguine prorsus inocuo, solus is qui in cerebro contētus est, alteratur. idq; bifariā fit. Aut enim aliunde

in ipsum deriuatur, aut i ipsomet
melancholicus humor genitus est,
quum videlicet iterius calor aut
flauam bilem, aut crassum atrūq;
sanguinem, superaffaut. Atq; hæc
doctrina non parū habet in cu-
ratione momentum, siquidem vbi
vniuersum corpus sanguinē me-
lancholicum continet, curationē
a venæ sectione incipere oportet.
Vbi vero solum cerebrum, infir-
mus (quod ad hanc dispositionem
attinet) sanguinis detractione nō
indiget, quamuis ob aliam quam-
piam causam, sanguis mitti pos-
sit. Vtrū vero melancholicus san-
guis vniuersum corpus, an solum
cerebrum occupet, ita discernen-
dum est. In primis vniuersi corpo-
ris habitum, qualis sit, consideres
velim. meminerisque, quod mola-
les, & candidi, & obesi, nequaquā
humorem habent melancholicum.
Macri vero, & nigri, & hirsuti,
& quibus latæ sunt venæ, aptissi-
mi sunt, vt huiusmodi in ipsis ha-

p iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mor cumuletur . fitq; interdū vtrū
rūso colore homines, affati in melancholicam temperiem decidāt.
atq; post hos flauī, idē maxime,
quando & vigilēs, & multis laboribus, & sollicitudine, & tenui
victu fuerint educati. Quibus hęc
quoq; notę conueniūt, an hemor-
rhois aliqua restricta sit, aut alia
quæpiam consueta sanguinis vas-
cuatio, aut mulierum menstrua.
Insuper quibus cibis q̄s fuerit vas-
sus, vtrum q̄s qui suapte natura
melancholicum sanguinē pariūt,
an e diuerso. Porro qui melancho-
licum sanguinem efficiunt, hi fere
sunt, caprina, bubulacq; caro, mas-
gisq; hircinæ & taurinæ, sed ma-
xime asinorum, chamelorūq; car-
nes, nam & his nonnulli vescun-
tur, item vulpinæ, caninæq; car-
nes. atq; magnam in huiusmodi
sanguinis generatione vim obti-
net, ex lepore eibus, sed multo ma-
gis ex apris. ac limaces q̄q; me-
lancholicū sanguinē pariūt, si fres-

quens sit corū vsus, præterea oēs terrenorū animalium carnes sale cōditæ, aquatiliū quoq; carnes, vt thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atq; cetaceorū omnium. Ex oleribus aut, brassica fere sola, huiusmodi sanguinē genere consuevit, quemadmodum & arborum germīna, vbi vel muria, vel oxyhalme condiuntur, p̄cipue lentisci, terebinthi, rubi, canirubi. Leguminū vero oīm maxime lentes, inter melancholicos cibos numerātur, mox panis furfuraceus, & qui ex tipha, atq; vitiatīs seminibus factus est, quorū apud quasdam nationes vsus, loco frumenti habetur. Verū de hīs ī priō libro de ciborū facultatibus iā dictū est. Præterea vina crassa, nigraq; aptissima sunt, vt ex ipīs melancholicus humor fiat, p̄sertim si qsabū de ipsa iğerēs, oblata occasiōe ī multo corpus calore cōtineat. vetus dēiq; caseus vbi forte fortūa ī corpore fuerit sup calefas
p. inq.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Etus, facile huiuscemodipit humo
rē. Igitur si quis ātea q̄ in morbu
inciderit, huiuscemodī victus ra
tiōe fuerit educatus, maiorē quā
dam inde licet facere coniecturā.
Si vero boni succi cibis vsus fue
rit, considerare oportet, exercita
tiōes ipsius, mœstitiā, vigiliā,
solicitudines. Sunt etiam nōnulli
qui per febriles (vt dictū est) mor
bos, melancholicum humorē cō
traxerunt. atq; ad efficaciorē no
titiā, non parum confert, anni
tempus, ac præterita, præsensq;
constitutio, itē terra, ac laboran
tis ætas. His itaq; omnibus præ
meditatis, quum speraueris in v
niuersi corporis venis melancho
licum sanguinem contineri, quo
certiorem habeas notitiā cubiti
venam seca, præcipueq; mediā,
quæ communis est, & ei quæ hu
meralis nominatur. & ei quæ per
axillam ad manum fertur. Quod
si tum fluens sanguis non videat
tur melancholicus, statim suppriz

matur. Si vero talis appareat, vacua quantum pro laborantis corporis habitu satis esse conieceris. ¶ Est præterea tertium melancholix genus, morbi comitialis exemplum, quum ortum a ventriculo habuerit. Solentque medicorum aliqui, hanc dispositionem, hypochondriacum flatuosumque morbum nominare. Verum satis mihi fuerit, ea accidetia percurrere, quæ a Diocle perscripta sunt, in libro cui titulus est, affectio, causa, curatio, in quo Diocles ad verbum ita scripsit. Porro alius oritur a ventriculo morbus, qui supra propositis non dissimilis est, nominaturque ab alijs melancholicus, ab alijs flatuosus, quem sumpto cibo, maxime coctum difficili, & caustico, sputum humidum, idemque multum comitatur. item ructus acidus, flatus, æstus, in præcordiis fluctuatio non ilico. sed quum retinuerint, interdum ventriculi quoque vehemens dolores, qui nonnullis ad dorsum usque pro-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cedunt, cōcoctis deīde cibis quies-
 scunt, mox alijs ingestis, eadē rur-
 sus reuertūtur accidētia, quæ in-
 terdum ieiunos, interdū etiā a cœ-
 na molestant, atq; euomunt cru-
 dos cibos, & pituitā, vel subamas-
 ram, vel calidam, vel acidā. adeo
 vt nonnunq̃ dentes torpedine af-
 ficiātur. Atq; horum plurima ab
 ineunte statī ætate eueniunt. Vt/
 cunque tamē acciderint, omnibus
 protelantur. His pręscriptis. Di-
 ocles mox causam subiungēs, ita
 scribit. Cæterum flatuosas voca-
 tas, suspicandum est, plus caloris
 quā decet, habere ī his venis, quę
 alimētum a ventriculo excipiūt,
 sanguinemq; in ipsis crassiorē fa-
 ciūt. quippe cōstat has venas esse
 obstructas, vel hoc argumēto, qđ
 alimētū corpori nō distribuitur,
 sed in ventriculo manet, quod
 antea in sanguinē mutari solitum
 erat, quū a meatibus ipsis suscipe-
 retur, magnaq; ipsius pars, ī imū
 ventrem excerneretur, ac postea

ro quoque die, vomitu reñcere-
 tur, utpote non digestis per cor-
 pus cibis. Sed quod calor id quod se-
 cundum naturam est excedat, fa-
 cillime intelleges, tum ab aestu, quod
 ipsis accidit, tum ab his quæ inge-
 runtur, siquidem iuuari videntur
 a refrigerantibus cibis, qui vides
 licet calorem refrigerare, extin-
 guereque solent. Deinde alia quor-
 que Diocles iam propositis in hoc
 sermone addidit. Aiunt autem non
 nulli, os ventriculi quod intestinis con-
 tinuatur, in huiusmodi passio-
 bus inflamari, ac ob inflammationem
 ipsam & obstrui & prohibere, ne
 alimenta statuto tempore ad intes-
 tinum descendat. quãobrem diu-
 tius quã decet, in ventriculo ma-
 netia, & tumores & estus, atque re-
 liqua quod predicta sunt efficiunt. Hec
 sunt quæ Diocles quidem literis
 prodidit. verum inter enumerã-
 dũ præcipua totius cõcursus ac-
 cidetia, silentio præterit, quæ vi-
 delicet & melancholia, & flatus

GAL. DE LOCIS AFFECT.

osam, hypochondriacamque affectionem, tanq̃ caractere quorūdam designant. atqui omisit (ut puto) huiusmodi accidentia, eo q̃ ex morbi ipsius nomine manifeste declarantur. Etenim ab Hippocrate didicimus. Si metus & mœstitia longo tempore tenent, melancholicus est huiusmodi affectus. Verū haud absurda quæstio est, quare Diocles quū causas magnorum accidētū redderet, quā ob causam mens lēdatur, nō scripsit? siue enim venarum, quæ vētriculo contiguę sunt, calor exuperat, siue partes quæ iuxta portam sunt (Græci pylorū vocāt) inflammatione laborant, quid causæ sit, cur melancholica comitetur accidētia, derelictum est. Et enim quod venter flatuoso spiritu impleatur, ac deinde eructando ipsū leuetur, ac præter ea quæ dicta sunt vomitione quoq; iuuetur, vel nihil dicente Diocle, manifestum est. Sane propria melā-

cholię accidentia, simul cū dicta
 ventriculi dispositione scribere,
 haud ita facile ei videbatur. Id itaq;
 addere, ac simul qualis sit in huius
 iuscemodi affectibus, vetriculi dis-
 positio, manifesta interpretatio-
 ne enarrare aggrediamur. Atq;
 videtur quidem in ipso inflam-
 matio esse. Sanguis autem in parte in-
 flammata contentus, & crassior,
 & atræ bili magis cōformis. Ita-
 que quemadmodum elata ex vē-
 triculo, ad oculos, fuliginosa qua-
 dam, aut fumosa dispositione, aut
 crassis quoq; vaporibus, similia
 vt in suffusione accidentia contis-
 gunt, eadē ratione sublata ad ce-
 rebrum ab atra bile euaporatiōe.
 melancholica euenient in mente
 accidentia. Etenim q̄ frequentis-
 sime videmus, flaua in vetriculo
 bile contenta, caput dolore affici,
 mox ea per vomitum eiecta, ilico
 dolor mitigatur. Atq; huiusmo-
 di dolorū genera, mordēdo, ex-
 dendoq; infestant, quemadmodū

GAL. DE LOCIS AFFECT:

alia grauitate, alia tēſione, alia ſo-
pore moleſtare videntur. Atque
inter optimos medicos conuenit,
non ſolum hæc accidētia, verum
etiā morbū comitialē, capiti a vē-
triculo procedere. Igitur vt me-
lancholicos, timor nunq̃ deſerit,
ita præter naturam eis viſa, non
ſēper eodē genere continentur.
¶ Siquidem alius teſtā ſe factū pu-
tauit, atq; idcirco obuiantibus ce-
debat, ne collideret̃. ¶ Alter gal-
los cātare audiens, vt hi alarum,
ſic ille brachiorum plauſu latera
quatiens, animantiū ſonū imitas-
tuſ eſt. ¶ Fuit item alter timēs ne
Atlas, qui mundū ſuſtinere diciť,
grauatus ſub tanto onere, ipſum
a ſe excuteret, atq; ipſe cū illo col-
lideretur, ac nos quoq; cū ipſo pe-
riremus. ¶ Sunt alia huiusmodi i-
ſta finita eorum viſa. differūt autem
inter ſe melancholici. Nā omnes
timent, mœrent, vitam damnāt,
odio habent homines, ſed non oēs
mori cupiunt, Etenim hoc ipſum

nonnullis melancholice caput est,
 quod mortem pertimescunt. Quosdam
 etiam alieno admodum, atque extra
 neo videbis animo, utpote qui si-
 mul & mortem metuant, & tamen
 mortem sibi consciscant. Proinde
 recte videtur Hippocrates omnia is-
 pso rum accidentia in duo hæc coe-
 gisse, metum & mæstitiā, mæstitia
 nimirum eos inducit, ut odio pser-
 quant oēs quotquot viderint, nunquam
 non tristitiam præ se ferentes, ac-
 terrentur, ut in tenebris pueri,
 atque ex adultis indocti. Sane quæ-
 admodum externæ tenebræ omnia
 bus fere hominibus pauorem indu-
 cunt, nisi vel audaces admodum
 vel docti fuerint, sic atræ bilis co-
 lor, mentis sedem tenebris similem
 reddens, timorem efficit. Etenim sum-
 mis tum medicis, tum philosophis,
 in confesso est, & humores, & o-
 mnino corporis temperantiam, ac
 animæ actiones variare posse. id
 quod nos quoque vnico commẽs-
 tario docuimus, quo demon-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

stratum est, quod aīæ potentia, corporis temperatiam sequuntur. Quocirca humorum vim ignorantes, in quorum numero & Erasistratus est, ne scribere quidē de melancholia quicq̃ ausi sunt. Neque indignum est admirari, tum communes hominum sententias, tū plurima quoq̃ dogmata, quæ & philosophi, & medici, per ignorantiam præterierūt. Igitur ab omnibus, affectus ipse melancholia vocitatur, indicante nomine humorem qui ipsius causa est, quūque circa ventriculū prima inceperint accidētia, ipsūq̃ auctis melancholica sequatur affectio, deīde alui deiectione, & vomitu, & proba concoctione, ructibusq̃ leuetur is qui laborat, hypochondriacum, flatuosūq̃ morbū, ipsū nominabimus. Accidentia vero ipsius dicemus, & mæstitiam, & metum. Quū aut propria, melancholiæ accidētia, auctiora vident, circa ventriculū vero, aut nulla,

aut parua admodum sunt, aut ab
re existimaueris primitiuā in ce
rebro affectionem consistere, ob
atram bilem in ipso congestam.

Cæterum quibus signis discernas
tur, vtrum in solo cerebro, an in
vniuerso corpe huiuscemodi hu
mor cōtineatur, paulo ante dictū
est. Interim monendi sunt mihi
amici, qui me curantem viderūt,
frequentibus balneis, victuq; hu
mido, boniq; succi, nullo alio adhi
bito p̄sidio, huiusmodi me mor
bum curasse. vbi nondum ob lon
gum temporis tractū, nocuus hu
mor multū vacuationi resisteret,
quum enim diuturnus iam factus
est morbus, fortiora p̄dictis opor
tet adhibere remedia. fit autē hu
iusmodi melancholię species, affe
ctio prius calidis dispositionibus ce
rebro, aut estuat lone, aut inflam
matiōe, aut phrenitiāe quocq; ips
sum afficiēte, interdum a sollicitu
dine, mæstitia, vigilis. verum
satis fuerit hæc de melancholia.

GAL. DE LOCIS AFFEC.

dixisse.

¶ De morbo comitiali. Cap. VII.

ATque de morbo comitiali deinceps dicendum est, quandoquidem hic quoque interdum ipso met affecto, interdum alijs consensiente cerebro, euenire solet. ut enim tria melancholice genera, ita hunc quoque morbum, tribus contentum differetis, omnes fere medici definire neglexerunt. Verum omnibus commune est, quod cerebrum afficitur, vel consistente in ipso affectu, id quod pluribus epilepticis accidit, aut a ventriculi ore (quod stomachum vocare solent medici) ad cerebrum per consensum ascendente. Atque hoc genus proportionem respondet accidentibus que oculis a stomacho adueniunt, veluti in suffusionibus. Fit etiam, sed raro, tertium morbi comitialis species. Nec refert siue genus, siue differentiam nominaueris, cum a parte aliqua cui id forte fortuna accidit incipit

affectus, qui deinde sentiēte a gro
ad cerebrum vsq; ascendit. Hoc
genus primum vidi in puero, qui
tertiūdecimū etatis annum ages
bat, quū equidē adolescēs etiā dū,
cū optimis eius tempestatis medi
cis conuenissem, ad idoneā ipsius
curationem inueniēdā, audiui tū
narrāte puero, dispositionem ip
sam a crure initium capere, mox
illinc recta ascendere per femur,
& imminentes illi lumbos, ac per
latera ad ceruicē, donec ad caput
perueniret, quod quum primum
tangeret, ipsum haudquaquā sibi
cōstare. Interrogātibus aut medi
cis, quale eēt id qđ ferebat ad ca
put, nihil habuit puer qđ respōde
ret. Alius deinde adolescēs cōpos
mentis (quippe qui satis poterat,
& sentire quod fiebat, & alteri
enarrare) dicebat veluti frigidam
quandam aurā esse, id quod ascen
debat. Vnde ex duobus alterum
Pelopi praeceptorī placuit, aut
quod qualitas quaedam, alteratīs

qñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

per continuationem partibus, aut
spiritalis quędam substantia trans-
mitteretur, neque mirandum esse
dicebat, tam validam vim esse hu-
mori, qui in affecta pte præter na-
turam genitus fuisset, vt pernicio-
sarum ferarum venenis possit cõ-
parari. Quis enim crederet vel
scorpionum, vel phalangiorum
ictibus, totũ corpus ac tam vehe-
menti mutatione affici? nisi sæpe-
numero id accidere videret, præ-
sertim minimã quandã rem feris
in ipsum demittentibus. Quum
itaque phalangium aliquem mor-
mordit, quãuis parũ sit animal,
existimare tamẽ debemus, vene-
num ex ipsius ore in ictum corpus
descendisse. Porro marinę turtu-
ris, quemadmodũ & terreni scor-
piõis aculeus, in partem extremã
acutissimam illam quidẽ finitur,
vbi nullum foramen est, per quod
venenum deñci possit, necesse tñ
est. vt excogitemus, substãtiam
quandã esse, aut spiritalem, aut

fluidam, quæ ut mole minima, ita facultate quammaxima est. Etenim quum nuper ictus quidem esset a scorpione, videor mihi videre (inquit) quod grandine percussus sim, qui omnino in frigidatus est, sudore etiã frigido accedente, sed tãdem debitis adhibitis remedijs, nõ sine negocio seruatus est. Itaque Pelops, nõ impossibile est (inquit) in corpore similem aliquam essentiam generari, non accedẽte causa extranea, quæ ubi nervosã aliquam partem occupauerit, per cõtinuas partes, usque ad nervorum principium, vim suam trãsmittit, siue id per alterationẽ, ut ipse dicebat, fiat, siue spiritali essentia, veluti aura, ad ipm elata.

- Sæpenumero enim infigente aculeum scorpione, aut in neruũ, aut venam, aut arteriam, manifeste videmus percussos, vehementissimis infestari accidentibus. Atqui scorpionis aculeus, totam cutem penetrãdo, ad profundum usque

q in

§ 2. stoma

GAL. DE LOCIS AFFEC.

potest peruenire. Phalangiorum
vero paruorum ictus solam afficit
superficiē. vnde constat, interdū
a sola cute, veneni vim ad totum
corpus deferri, quippe totā cutis
& continua est, & nervosa. proin-
de haudquaquam impossibile est,
quum ex icta parte, per totam ip-
sam celeriter distributa fuerit ve-
neni vis, eam inde eodem rursus
contactu, in singulas subiectarum
ei partium recepi, mox ex illis in
alias continuas, atque iterum ex
his, quę afficiuntur, in alias, quūq;
ad dominātium partium aliquam
peruenerit, tum mortis periculū
homini instare. Ad hanc rem in-
primis conferunt vincula superio-
ribus partibus infecta, ab hīs enim
præsentaneum præsidium expe-
ctatur, id quod in viperarū, scor-
pionumque ictibus, item aspidum
quoque, quod propter imminens
subitaræ mortis periculū, magis
incredibile est, expertus sum.
Etenim quum Alexandrię essem,

rusticus quidē non lōge ab Vrbe,
 in vno manus digitorū ictus, eius
 radicem apud palmā validissimo
 vinculo ligauit, accurrensque in
 Urbem, ad familiarē sibi medicū,
 totum digitum ab ipsa dispositiōe
 ad palmam vsque abscindendum
 prēbuit, sperans inde nihil se mali
 passurum. Neq; frustratus est sua
 spe, quippe nihil aliud faciens sala-
 uus euasit. ¶ Similiter alium noui,
 qui epoto ex viperis medicamen-
 to, recisso prius digito, a periculo
 liberatus est. ¶ Vidi prēterea rus-
 ticum, cuius totū digitum vipe-
 ra momorderat, qui falce quā tūc
 forte habebat (erat enim vinitor)
 ab vltimo articulo ictam partem
 resecans, deinde inducta in digito
 cicatrice, nullo sumpto medicami-
 ne, sanatus ē. ¶ Sed puerū quoq;
 cuius morbus comitialis a crure
 oriri cōsueuerat, medici qui tunc
 ad curationē eius cōuenerāt, sana-
 re sperabant, si in primis vacuato
 vniuerso corpe, medicamē ex tas

q. iiij

{3} *Storie*{4} *Storie*{2} *Storie*

GAL. DE LOCIS AFFECT.

psia, aut sinapi parti adhiberēt. Ligato ī medio membro, supra eam videlicet partē, q̄ primaria dispositione erat affecta, atque hoc pacto, accessionem reuerti prohibuerunt. quāuis antea quotidie puerū infestare cōsueuisset. Verum hæc obiter, atque ex abundantia dicta sint, ne quis miretur, quo pacto, ab ignobili aliqua parte, tantus morbus ortum contrahere possit. Superest autem causam vestigare quamobrem in huiusmodi percōsensum affectionibus, epileptice fiant cōuulsiones. Nam ne Pelops quidem, vllam ad hanc rem attulit probabilem persuasionē. Neq̄ etiam alius quisquam, cū quo nobis aliqua fuerit consuetudo. Mihi vero per huiusmodi consensum, videnti aliquando laborantē, sine vehementi conuulsione concidere, simul quod per intervalla, breuibus quibusdam motibus quateretur. Probabile visum est, quem admodum frequentissime singula

tum fieri cernimus, affecto stomacho, ita hanc quoque dispositionē euenire. Etenim me ipsum quoque singultus ilico inuadere solet, si piperis aliquando immodicam quantitatē ingesserō. Id quod alij quibusdam nō paucis, quibus scilicet facilis erat oris stomachi sensus, accidisse meminimus. At qui iam supra memoratum est, id non solum medicis, verum etiam vniuersis hominibus stomachum appellari. Itaque quum cecidissent, qui non ex propria cerebri affectione, sed per consensum comitiali morbo laborabant, eos citra perpetuam conuulsionem veluti saliendo, per interualla concuti videbam. Proinde existimaui, similem aliquem cerebro motum euenire, qualis stomacho interdum, a re quapiam molestato accidere solet. quippe quum a ciborum mole grauatur, aut vbi corruptis cibis mordicus infestatur, tū singultu affici conspicitur. Atque acrem

GAL. DE LOCIS AFFEC.

quoque humorem, nō singultum
modo, verum etiam cōuulsionem
per vniuersum corpus efficere se
penuero consideramus. deinde
vomitu eiecto eo, quod mordica-
bat, ilico quiescere. Quo minus
mirandum est, si neruorum prin-
cipium, huiusmodi motu concu-
tiatur, vt a se expellat, quicquid
fuerit id, quod a parte primo affe-
cta ad ipsum effertur. Ad hūc mo-
dum reliqua quoq; accidētia om-
nia, quibus nerui cōcutiūtur, fieri
putauerim. Vbi vero deperdito sen-
su, quis conciderit, non accidente
motu, quo vel conuelli, vel salire
videatur, id a vehementi frigore
ortum trahere censeo, quo in ge-
nere lethargus quoque cōtinetur.
Apoplexię autē, quod subito eue-
nit, aut frigidū, aut crassum, aut
viscidum quidpiam, quod princī-
pes cerebri vētriculos affatim im-
plet, non totius essentiaē intempe-
riem, causam esse manifestū est.
veluti etiā lethargi, phrenitidis,

maniae, melancholiae, stultitiae,
amissae memoriae, sensuum hebetationis, resoluti motus. In omnibus
his affectibus, in quorum numero
apoplexia quoque continetur, per
riculi magnitudinem ex anhelitus
nocumento convincere oportet.

Sane quemadmodum dormientes
spirant, quamvis nulla alia acceden
te actione, quae a consilio prodeat,
utpote qui supini iacent in cubili,
ita in soporosis affectibus omnibus,
quanquam neque sentiat corpus,
neque moveatur, tamen sola spi
ratio, quae musculorum pectus mo
ventium munus est, saluatur. cuius
rei firmam, ac demonstratiua
lege stabilitam, habemus scien
tiam. quemadmodum quod muscu
lis etiam omnibus, motus princi
pium ab innatis ipsis nervis acce
dit. Atqui ex anatomice didici
mus, nervos omnes a cerebro pri
marius sumere initium. Neque
simpliciter initium, sed primarium
dixi, id quod spinalis medullae gra

GAL. DE LOCIS AFFECT:
tia, oratiōi adieci. Quamuis enim
per multi ex ea nerui prodire vis
deantur, vim tamen omnem quā
habet, cerebrū ipsi suppetit. Quū
itaque spirationem vehementer
impeditam, difficulterque proces
dentem videris, non parua in ce
rebro morbidam dispositionē eē,
cōfiteri debes, idque in soporife
ris morbis, quos nimirum omnes
in cerebro fieri manifestum est.

¶ De vertiginosis.
Cap. VIII.

Affectus autē qui scoto
maticus (id est vertigi
nosus) vocatus est, ex
ipsa appellatione, quas
lis sit, manifestatur. quippe a pua
occasione hebetantur, hi qui sic la
borant, adeo vt interdum cadāt,
maxime si aliquando in circū ros
tentur. siquidem ipsis ab vna raz
tione euenit, id quod ceteris, a plu
ribus accidere solet. proinde hebe

scunt, sine alium quempiam, siue
 rotā, aut id genus aliud quidpiā,
 aut ipsos quoq; in aquis vortices,
 circumagi viderint. Id vero ma-
 xime, quum vel sub sole estuau-
 rint, vel aliam ob causam calefa-
 cto fuerit capite. Nam quod alijs,
 quum in circo frequenter vertū-
 tur, accidit, hoc ipsis citra circū-
 sionem euenire videmus. Atqui
 vbi quis crebro vertitur, in equa-
 lem, & turbulentū, & inordina-
 tum motum, tum humorum, tum
 spiritus, in eo fieri in confesso est.
 Rationi igitur consonum est, hu-
 iusmodi accidentia, vertigine af-
 fectis, itidē euenire. Quamobrē
 nonnulli horum, ab arteriarū se-
 ctione præsidium petierunt, arte-
 rias pone aures ad tantam scilicet
 altitudinē secātes, vt medius in-
 ter duas partes locus cicatrice in-
 duceretur. Sed constat nō omnes
 huius auxiliū beneficio fuisse cura-
 tos. Etenim aliæ arteriæ q̄s maio-
 res, ad cerebri sustentamentum,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

per retiformem vocatam mēbra-
nam, ascendunt. per quas huius-
modi affectionem fieri rationi con-
sentaneum est, elato per ipsas va-
poroso, calidoque spiritu, atque im-
plente cerebrum. Atque fieri etiā
potest, vt inæqualis cerebri intē-
peries, huiusmodi cerebrum per-
ducat. Igitur hanc affectionem ad
cerebrum pertinere, ex ipso ver-
tiginosorū sensu, manifestum est.
Oritur vero interdū cerebro, pri-
mogenio affectu laborante, inter-
dum vero, quū ori ventriculi cō-
sentit, id quod Archigenes quo-
que fatetur, qui libro primo de lon-
garum affectionum notitia scri-
bit. Porro ea bifariam oritur, aut
enim in ipso capite, aut in his par-
tibus quę circa p̄cordia sunt. Mox
genera eius distinguere aggredi-
tur. Nam vbi ex primaria cere-
bri affectione, vertigo dependet:
aurium sonos, & capitis dolorem,
grauitatemque præcedere dicit.
item olfactus, atque alterius cuius

que sensus inde prodeuntis, ablationem. eos sensus (vt equidem puto) significare volens, qui a capite initiū sumunt. Vbi vero ab ore ventriculi oritur, cordis morsionem, nauseamque præsenti, Verum, vt iā antea sepe numero monuimus, licet caput p alterius partis consensum afficiatur, affectio tamen nihilominus ipsi ascribenda est.

¶ De cephalæa & hemicrania.

Caput Nonum.

ATque de ea quoque quæ cephalæa a medicis nominatur, nemo dubitauerit, quin cerebri sit morbus. Est enī (vt breuiter quis dixerit) affectus hic, dolor diuturnus, difficulterque solubilis, qui a parua occasione vehementes habet accessiones, vt neque strepitum, neque vocem, neque luminis splendorem, neque motum potestremo tolerare possit infirmus,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sed trāquillitatē, obscurūq; cubi-
culū q̄rat, idq; ob doloris vehemē-
tiam. quippe nonnulli veluti mala-
leo, se percuti arbitrantur. alñ ca-
put frangi, distendique sentiunt.
Non paucis ad oculorū quoque ra-
dices dolor extenditur. Verū hu-
iusmodi accessiōes, veluti ī mor-
bo comitiali, intermissiōes habēt,
interceditque tempus, quo perfe-
cte liberati videntur. Igitur cons-
tat, quod sicut in hoc morbo, ita
& in cephalalgia (id est capitis do-
lore) caput facillime afficitur. atq;
hoc est ipsis commune. verū per
cephalæam, affectæ partes, multo
redduntur, quam in cephalalgia,
debiliores. Cæterum inter capitis
dolores, nonnihil discriminis in-
uenitur. nā sunt nonnulli, quibus
caput aptissimum est, vt implea-
tur, ac vniuersi quoq; corporis ha-
bitus, ad ipsum implendum, admo-
dum idoneus. Alñ insuper omnes
huiusmodi partes aptas habēt, vt
afficiant. Quibus, vbi vitioso vis

Et utuntur, accidit ut cephalga
 arripiantur. Quo minus miran-
 dum est, si horum alijs, membra-
 nae cerebrum continentes, dolo-
 re afficiantur, alijs pericranium,
 id est exterior caluariæ membra-
 na. Discrimen autem ab oculorū
 radicibus sumitur, considerando
 utrū veniat ad eas malū, necne.
 siquidē cōsentaneum est, ut quis-
 bus intra caluariam dispositio est,
 nō ad oculorum vsq; fundamēta,
 dolor extendatur, eo quod & a ce-
 rebro, & ab utraq; mēbrana, atq;
 a vasis quæ in ipsis continentur,
 veluti germina quædā deducun-
 tur. ¶ Sed & eorum quibus media
 capitis pars dolore infestatur (so-
 lent aut vocari hemicranici) aliq;
 • extra caluariā, aliq; in capitis intis-
 mis partibus dolorē sentiunt. At
 vero dextrā capitis partē, a sinis-
 tra distinguit futura per lōgitu-
 dinē ipsius protracta, sub qua itra-
 capitis ossa, linea mediū cerebrū
 diuidens, protenditur, ad quam

GAL. DE LOCIS AFFECT.

etiam peruenit, anteriorū duorū
vêtricolorum sceptorum. Porro ea
corpa, suapte natura, idonea sūt,
vt ipsis caput impleatur, in qbus
voporosus, calidusq; spiritus ge-
neratur, aut quibus biliosa excre-
menta cumulantur, in ore vêtis-
culi. Atqui spiritus, dolores indu-
cunt tensiuos, qui idcirco sic vo-
cati sunt, quod extensionis sensū
inducunt. Biliosa excrementa, do-
lore mordaci afficiunt. Dolores a
plenitudine procedentes, graui-
tatis sensum afferunt. quibus si ru-
bor accedat atq; color, calidos, sed
sine hīs, nō calidos humores signi-
ficant. Sunt quibus caput assidue
dolet, vbi vel liberalius vinum in-
gesserint, vel meracius, idq; ma-
gis. si suapte natura calidum fue-
rit. Prætera calidi odores omnes,
vt styracis, aut cypheos, atq; i to-
tum odorata omnia, capitis dolo-
rem pariunt, adeo vt nonnulli,
ne thuris quidē odorem ferre pos-
sint. Neq; vero absurdum est, vt

quosdam ob sensus exuperantiam,
doler infestet, quemadmodū i ore
stomachi accidit. Sunt enim non
nulli in quibus id tam exacte sens
tit, vt neq; acre acetū, neq; sinae
pi, neq; aliud huiusmodi ferat. Ac
in vero contra, ipsum pene infes
sile habent: quippe videntur aliq
vel ructare, vel vomere, quēdam
vsq; adeo vitiosa qualitate infec
ta, vt nos ne odorem quidē susti
nere possimus, quū tamen ipsi in
terea nihil fere sentiant. Nihil igit
tur prohibet quo minus in homi
num cerebro similes notentur dif
ferentia, vt eosdem odores aliqui
impune sustineant, perinde ac si
omnino ab ipsis distarent, alij eos
sine molestia ferre nō possint. Igi
tur qđ omnes huiusmodi affectio
nes ad cerebrum pertineāt, iam
manifestum esse videtur.

¶ De apoplexia, nervorum resolu
tione, & conuulsione. Cap. X.

r. ij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Sic etiam neruorum resolutio, & per vniuersum corpus eorum cōuulsio, in quo genere neruorum etiam rigor (Græci tetanon vocant) cōtinetur. Itaq; si aliquādo per totū corpus, neruorum actio vitiosa redditur, ipsorum principium affectū esse cōstat. id vero ex sola anatomice dinosci potest. Quū igitur oēs pariter nerui, tum sentiendi, tū mouendi viamiserit, apoplexia huiusmodi affectio appellatur. Vbi vero alteri laterū, aut dextro, aut sinistro, id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua cōsistit affectus, interdū dextræ, interdū sinistrae. Quod si in aliquo mēbro rum idē euenerit, eiusdem membri resolutio esse dicetur. Nam & tota manus & totū crus interdū resoluitur, atq; solus in crure pes, & quæ sub genu sūt. Sic etiam de tota manu similiter proportionē dicendū est. Cæterū ex anatomia

ce didicimus, quod oēs animantis partes sub ceruice posite, q̄a consilio & volūtatis imperio moueri possūt, neruos habēt qui eas moueant, procedentes ex spinali vocata medulla. Atqui sepe numero audistis eā spinālē vocari medullā, addita scilicet medullæ appellatione, interdum vero sine additione simpliciter spinā nūcupari. Vidistis etiā in corporis dissectione, neruos qui pectus mouēt, ex ea spinæ parte, quæ in ceruice est, ortū deducere. ipsa vero ex transuerso incisa, si tota fuerit dissecta, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu, motuq; priuari. vtpote suscipiente spina a cerebro, vim tum sentiendi, tum mouēdi pro arbitrio. Præterea in anatomice vidistis, vbi per transversas spinæ incisiones, ad mediū vsq; secundū longitudinē secaretur, non oēs suppositas corporis partes, sed eas duntaxat, quæ e regione sectionis erant, resolutas. dext. iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tras quidē dextra spinæ parte dis-
 secta, sinistras vero, vbi reliqua
 pars esset incisa. Itaq; manifestū
 est, quod circa primum spinę p-
 cessum, facta aliqua dispositione,
 per quā cerebri facultas, quo mi-
 nus ad ipsam perueniat, prohibe-
 tur, oīa inferiora mēbra, dempta
 facie, sensu motuq; priuabuntur.
 vbi vero media eius processus p-
 fuerit affecta, nō oēs inferiores p-
 tes resoluentur, sed vel sinistra
 duntaxat, vel dextra. Videntur
 autē huiusmodi resolutionū aliq;
 faciē quoq; infestare. sed tū reso-
 lutum latus ad alterā faciei partē
 trahitur. Quūq; ex anatomicē di-
 diceritis, nervos qui per faciei p-
 tes sparsi sunt, a cerebro demitti,
 si earū aliqua, simul cū toto cor-
 pore resoluta est, haudquā vos
 latere debet, resolutionis disposi-
 tionem, in ipso cerebro cōsistere.
 vbi vero illę permanserint, spi-
 nę initium affici sciēdum est. Ac-
 cidit vero nōnullis vt faciei pars

tes duntaxat afficiantur, quemadmodum & reliquarum quoque partium interdum aliquae, ut lingua, oculus, mandibula, labrum. Etenim non omnibus, ab uno loco principium insunt, utpote quae ex diversis cerebri partibus nervos suscipiunt. Id quod in anatomice haud obscure conspicitur. Igitur apoplexia omnibus animalibus actionibus noxam inferens, cerebrum affectum esse manifeste declarat. Discernitur autem affectionis magnitudo ex noxae quam spirationi infert vehementia, quum enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam, quum vero paulum impeditur, parvam in cerebro noxam esse conficere oportet. Sane omnium pessima spiratio putanda est, quae & intermittitur, & magna cum violentia trahitur. Quippe ut mori contingit apoplecticos, ob id quod spirare non possunt, sic homo qui corporis partes movere nequit,
r.iiij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ad vitæ functiones censetur inu-
tilis, quamuis huic subitæ mortis
periculum haudquā immineat.
Itaq; vidimus quendam, qui relis-
quis partibus oībus resolutis, nula-
lam, quæ ad faciei partes pertine-
ret, actionem amisit, seruata etiā
spiratione. quomodo enim viuere
diutius potuisset, ipsa depdita? In
quo affici putauimus illā spinæ p-
tem, quæ paulo interior est, pro-
cessu neruorū ad septum trāuers-
sum tendentium, quinetiā & vri-
nam, & alui sedimina, ipsum præ-
ter voluntatis imperium emisisse
manifestum est. Insuper vidimus
aliū, cui propter casum omnes in-
feriores partes demptis manibus,
resolutæ sunt. Sic etiam vbi vni-
uersæ corporis partes, quæ sub fa-
cie constitutæ sunt, resoluūtur, fa-
ciei partibus illæsis, affectionem in
spinæ initio esse certum est. Atq;
eadem quoq; ratione, si toti cor-
pori conuulsio acciderit, eundem
spinæ locum, affectum esse declas-

93 *Historia*

rat, faciei partibus omnino seruatis illæsis. Quod si hæ quoque afficiantur, cerebro noxam iam illatā esse ostenditur. Vbi vero pars aliqua conuulsa est, neruum, qui eius motiōi deputatus est, aut musculus, affici necesse est. Igitur si ex anatomice neruorum ad singulas partes venientium, principia didiceris, perquam facile earū & sensum, & motum deperditū, curabis. Verum hæc indeterminata relicta sunt & Erophilo & Eudemo qui primi post Hippocratē neruorū anatomicē accurate scribentes, non mediocrē medicis dubitandi occasionem præbuerunt. Quo pacto per neruorum resolutionem, interdum sensus duntaxat, interdum motus, nōnunquā ambo simul pereant. Itaque neruorum resolutio potissimum dicitur vbi motus deperditus est. Vbi vero partium aliquarum sensus perierit, eam partem sensus expertem esse, resolutam vero non adeo dis-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cere consueuimus. Quæ sunt non
nulli, qui hanc affectionem, sensus
resolutionem vocitant. Nos vero
semper iubemus, ut cuique nomi-
nibus pro arbitrio uti liceat. etenim
hoc nobis esto propositum, ut af-
fectam scilicet sedem, simulque dis-
positionem eius inueniamus. Ni-
si enim hæc accurate cognoueris-
mus, nequaquam eas vero partes
quibus vel sensus, vel motus vitia-
tus est, recte curabimus. Sane Pau-
saniæ Syrus sophista, quæ Romam
aliquando venisset, secundum duos
minores sinistræ manus digitos,
atque mediam partem mediam, sensu-
sum in primis quidem difficile ha-
bebat, postea male curatis medicis,
sensum omnino amisit. Quis-
bus equidem cognitis, omnia quæ
præcesserunt inuestigavi, atque ie-
psum, quum per viam duceretur
vehiculo excidisse, atque in dorsi
initio læsum, mox partem læsam
breui quidem curatam, sed auctum
in digitis sensus vitium, audiui.

27. hui

Igitur remedia quæ illi digitis adz
 aptauerant, læsæ parti adhibere
 iussi, atq; sic vir ille celeriter sas
 nitati restitutus est. Etenim id quod
 in primis scire oportet, quod vis
 delictet nerui per vniuersæ manus
 cutē dispersi, quibus sentiendi ad
 ipsam facultas defertur, proprias
 quasdam habeant radices, quodq;
 nerui musculos mouentes, ab his
 differant, medici ignorant. Verū
 latius, quam proposueramus, iam
 nostra expatiata est oratio, proic
 de quiescere eā decet. quippe nos
 tra intētio erat, vt hoc cōmene
 tario omnes affectiōes, quæ caput,
 maxime vero cerebrum infestare
 consueuerunt, inueniremus. At
 quia ab ipso, nerui originē ducūt,
 per consequentiam, ad neruorum
 vsq; affectiōes, sermo peruenit,
 cui etiam finē imponendo, passio
 nes quæ reliq; a capite partibus
 accidere solēt, scribere aggredia/
 mur, si prius hoc tantillum super
 ioribus addiderimus.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

¶ De Olfactu.

Cap. XI.

Vbi olfaciendi vis laeditur, non eorū meatuū qui in naribus conspiciuntur, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, quā itemperantia quadam afficiūtur, noxa est, aut eorum meatuū, qui ethmoides (id est cola vocantur) si aliquando obturātur. siquidem odoratorum sensus, in prioribus cerebri sinibus p̄ficitur, elatis ad ipsos per coli foramiā vaporibus, quemadmodum in eo libro quem de olfactus fēlorio cōscripsimus, iam declaratum est.


¶ GALENI, DE AFFECTO-

RVM LOCORVM NO-

TITIA,

Liber Quartus.

PROEMIVM



Va via & ratione affectus sedes scrutari conueniat, superioribus libris satis dilucide perstrinximus, atque multis definitionum quarundam partium adductis exemplis. Quoniam vero, ut iam diximus, atque in alijs libris demonstrauimus, circa res particulares exercitari oportet eum, qui singula artis opera, quæ vniuersali via & ratione didicit, tuto & celeriter perficere voluerit, operæ pretium me facturum mihi videre videor, si rationales quasdam notiones, omnium corporis particularum, quæ sensum effugiunt, cum quomodolibet afficiuntur, perscripsero, sumpto a capite initio. Igitur de memoria, & cogitatione vitiosa, atque reliquis animæ functionibus, quas principes nominare consueuimus, in huius commutationis libro tertio iam diximus, simul in non paucis affectuum generibus, via & ratione inducto ex/

GAL. DE LOCIS AFFECT:
ercitationis modo. Nā & de phre
niticorum insania, & de ea quę cis
tra febrem accidit, quam melan
choliā nominant, præterea de
lethargo, sopore, morbo comitias
li, melancholia, vertigine, cepha
lea, hemicrania, apoplexia, & simi
libus ibi iam dictum est.

**¶ De affectis partibus in oculis
lorum morbis.**

Cap. I.

AT in præfati libro, qui
huius cōmētarij quar
tus est, de faciei partis
bus, quę intrinsecus,
afficiuntur, sermonem faciemus,
ab oculis incipiendo. Nam modo
ipsorum sensus, modo motus, ac
nōnunq̃ tā sensus, q̃ motus, resol
uit. idq̃ interdū in altero, interdū
in utroq̃ accidit oculo. Nōnun
quam solius palpebrę, nonnūquā
etiam eius partis, quā proprie ocu
lum vocamus, vel sensus, vel mo
tus leditur. Cum enim nullo i ocu

lis malo apparente, cernendi quos
 q̄ sensus deperditus est, demissus a
 cerebro neruus causā, vt vel in
 inflammationem, vel duritiem in se
 continet, aut aliter quomodolibet
 foramen ipsius obturatur. Atque
 huiuscemodi affectus, oculo, vt in
 strumentali parti, accidere neces
 se est. qui vero ei, vt similari, ad
 veniunt, octo intemperantiæ ge
 neribus continentur. Præterea ali
 ud quoque ipsorum vitiū est, quū
 vel nihil omnino, vel exiguū ad
 modum, visūci spiritus, a princī
 pio, quod in cerebro consistere po
 tandū est, ad eos descendit. Si ve
 ro vteruis oculorum, motum dun
 taxat amiserit, secūde copule ner
 uū, qui a cerebro oritur, molestari
 necesse est, ab aliquo videlicet cor
 rū affectuū, quos alteri neruo, q̄ a
 prima cōiugatiōe nascit̄, nup̄ ac
 cidere diximus. Quoniā vero, vt
 ex anatomice didicimus musculi
 oculū mouētes, senario nūero con
 stāt, ac p̄ter eos, alij quoq̄ sūt, q̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

descendentis in ipsum meatus radicem amplectuntur, quippe dissecutores ita nominare consueverunt primę conjugationis neruū, eo quod soli manifestū sit foramē, accidit interī quis ipse haudquā afficiatur, musculorū aliquis, aut in propria essētia, aut in neruo ad ipsum descendente, ab aliquo nuper dictorum affectu infestetur. siquidem singulis horum musculorum, pars quædam nervi a secunda conjugatione orti transmittitur, haud secus quā n̄s quoq; musculis, qui meatum ipsum cōprehendūt, siue n̄ duo, siue tres, siue vnus dūtaxat, dicēdus sit. id em̄ in præsētia non refert. modo nouerimus horū musculorū munus esse, vt & retrahāt oculū & firmēt, ne mollis ille neruus, quē & vesificū, & meatū nomināt, vllō pacto in p̄cessu diuertatur. Quū itaq; sex inueniantur oculū mouentes muscoli, si is quidem qui ipsum retrahere solet, afficiatur,

totus oculus delapsus videbitur. si vero is qui ipsum detrahare pōt, affectus est, oculus retractus apparebit. Ita etiam si minoris anguli musculus vitatur, ad maiorem, si vero hic lēsus est, ad illum oculus deflectitur. At si voluentium musculorum quispiā resoluitur, obliqua erit totius oculi conuersio.

Cæterum quum alij præterea sint muscoli, mollem neruū illū circū dātes, scire licet, ipsis resolutis totum oculum procidere, atq; a sua sede moueri, quāuis plerique eorū qui sic affecti sunt, sensim quidem intēto molli neruo, sed nequaquā affecto, citra noxam cernere possint, qui vbi quoquo modo afficiūt, visum efficit obscuriorē. vbi vero adhuc magis malum ingrauescit, constat eos qui sic afficiūtur, nihil omnino cernere posse. Porro quum oculi a sua sede remouētur, si ad alterutrum angulum fiat cōuersio, innocua pmanebit cernēdi facultas. si vero aut sursum, aut

GAL. DE LOCIS AFFEC.

deorsum, aut in obliquum quoque
vertant, quicquid ipsis obieceris
id omne duplū esse videbitur. Ma-
sculi vero supernā palpebrā mo-
uentes (nā inferior immobilis est)
quoniam perquā parui sunt, adeo,
vt in maioribus quoque aīalibus,
vix manifeste perspicī possint, ni-
hil mirū si nerui ipsis innati diffi-
culter videant. Nihilominus quē
admodum in musculis, quorū iam
supra meminimus, ita & in his
quoque euenire necesse est, vt in-
terdum musculi ipsi, peculiari ali-
quo affectu, ex his quos ad muscu-
los pertinere nouimus, interdum
vero nerui ipsis innati infestētur.
Igitur si musculus ipsam sursum
retrahēs exoluitur, laxam efficiet
palpebram, adeo vt oculus aperiri
nō possit. si vero detrahētes (ges-
mini enī sunt) resoluuntur, oculū
claudere non poterūt. Quorum si
alter duntaxat afficitur, ad opposi-
tum musculū palpebra deflectet,
vt fracta videat, in fine videlicet

circa mediam ipsius lineā. quippe
ea pars, quę iuxta masculum affe-
ctum est, retrahi, quę vero iuxta
illæsum est, detrahi, videtur. Hi
sunt partium oculi peculiare affe-
ctus, qui latentibus locis insident.
Ac sunt præterea alii, qui ex alijs
partibus ei per consensum adue-
niunt. Igitur accidentia, suffusio-
rum visis similia, videntur, ocu-
lis nulla propria affectione mole-
statis. sed aut oris ventriculi, aut
cerebri cognatione, id accidere so-
let. Verum hæc ipsa, ab illis quę a
ventre oriuntur, distinguenda sunt.
Primum quidē ex eo, quod vel alter
duntaxat oculus, vel vterque simi-
liter, visis occupetur. siquidem in
vniuersum visa ob humorum in-
• ventriculo contentorum vitium
oborta, vtrique oculo similiter
• accident. Quę vero per suffusio-
nes apparent, neque incipiunt si-
mul in vtroque, neque similiter ap-
parent. deinde ex tempore quoque
distinguuntur. Si enim tribus,

si n̄

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quatuorve aut etiā pluribus mensibus, suffusionis apparuerint accidentia, contemplantique tibi pupillam, nihil tenebrosum videat, ab ore ventriculi affectū pcedere inuenies. Si vero non ita multum temporis intercessit, quærendum est in primis, vtrum ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuo huiusmodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet interueniente die, qui omni reprehensione caruerit, an diebus quibusdā laborans exacte videatur conualuisse. Nam assiduitas suffusionē portendit. Intermissio vero, quod malū a ventriculo prodierit, suspicionē excitat. idq; magis, si pfecte quis concoquens, nullū sibi visum apparere fatetur, sed multo magis, si quum apparuerunt visa, mordicus in ore ventriculi doluit, maxime vero, si post hęc vomendo, eiecta re mordente, mitigata fuerint accidentia. Hęc sunt q̄ primo statim die, quum videris hominē,

interrogādo discere debes, qñ, vt
iam diximus, exquisite secundum
naturam se habuerint oculi. Vbi
vero altera pupilla tenebrosior,
aut turbidior, aut (vt breuiter dis-
cam) non exacte pura videt, suffu-
sionis esse initium censendum est.
Si vero quis piā suapte natura pu-
pillas ipas non admodū puras ha-
buerit, cōsidera nō vtriusq; simi-
lis sit affectus, ad hęc si nō ita mul-
tum tēporis a suffusionis acciden-
tibus pręterierit. Quibus sic se ha-
bentibus, impera, vt minus cibi,
quam pro consuetudine, ingerat.
eūque nihil mali succi habentem,
postero die vbi probe cōcoxerit,
qualia appuerint visa interroga,
si enim vel omnino nulla, vel dea-
bilia videātur, ad ventriculum
referendū est accidens. At si simi-
lia permanserint, non per cōsensu-
m, sed ex propria dispositione,
sciendum est huiusmodi acciden-
tia oculos infestare. Idque magis
vbi sumpto ex aloe medicamēto,
f iij

GAL. DE LOCIS AFFEC.

nihil variauerint. Voco autē medi-
camētum ex aloe, quod alij hierā
picram, alij simpliciter picrā ap-
pellant. Quippe si a ventriculo
prouenerit accidēs, huiuscemodi
medicamēto potui dato, facillime
curatur, accedente simul bona cō-
coctione, vt in idem conueniant,
& affectū sedis notitia, & ipsius cu-
ratio. Equidē quosdā sic affectos,
quāuis, vt scitis, non viderē, quū
in alienis essent terris, per literas
curaui. Nam quum nonnulli ex
Iberia, Celtica, Asia, Thracia, atq;
alijs regiōibus, per epistolas a me
peterent, etiā in suffusionis initio,
nullo adhuc vitio in pupilla appa-
rente, vt probatū aliquod eis me-
dicamentum transmitterē, volui
prius certiore me redderēt, nū
ex multo tempore ita fuissent affe-
cti, prēterea de alijs quoque, quorū
paulo ante mentionem feci-
mus. Qui quū per epistolas respō-
derent, sex menses, aut annū iam
exactum esse, vtrunque oculum

similiter affici, quum probe concoxissent, melius sese habere, p. cruditates, atque ventriculo mordicus dolente, grauius irritari, educta vero per vomitum bile, quiescere, nulla facta de pupilla quæstione, satis efficaciter me cognoscere putavi, non proprio affectu, sed per ventriculi cōsensum oculos infestari. Mittēs itaque picrā, ipsos quidem in primis, atque p̄cipue, per eos autem, alios quoque multos ipsorum conterraneos, sanauī. quū enim omnes quotquot epistolas meas acceperunt, docti essent, affectorum locorum notas ex literis meis didicerunt. quibus deinde facile cognitis, eos amaro medicamento curauerunt.

- ¶ At similia quoque suffusioni accidentia, in quibusdam phrenitidis speciebus, affecto scilicet cerebro, sæpenumero euenire solent. Nec refert, vtrum species, an differentias nominaueris.

Nam simplices quidem dug inue-

6 uij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

niuntur, ex quibus deinde tertia cōponitur. Quippe sunt phrenitici quidam, qui de rebus quæ oculis offesuntur, recte (quantum ad sensitiuam notitiam pertinet) indicant, cogitatio vero, a naturali indicio aberrant. Alii rursus cogitatione quidē falluntur minime, sensibus tamen disformiter mouētur. Sunt præterea qui simul & sensus, & cogitationis vitio laborant. Itaque cuiusq; lētionis modū, sic accipe.

Ex Ioue

¶ Quum Romæ quidam domi, cū lanifici puero cōtineretur, surgēs a cubili venit ad fenestrā, per quā & ipse videri, & prætereūtes videre potuit. Itaque ex vitreis vasis singula ostendens, interrogauit, imperarent ne vt ea proñceret? Illi vero ridentes, plaudētesque, vt ea proñceret, rogabāt. tū ipse deinceps omnia arripieus eiecit, at illi magnis acclamatiōibus riserunt. Postea iuberent ne puerum quoq; pñci? quū eos interrogaſſet, atque id illi iuſſiſſent, ilico

ipsum deiecit. quē ab alto cadentē
videntes, suppresso statim risu, ac
currerunt, & cōfractū iā puerum
fustulerūt. ¶ Ad contrariam affec-
tionem, non solū in alijs, verū in
meipso, quum puer adhuc essem,
expertus sum. Quum enim per
estatem ardente febris laborarem,
& festucas atro colore, ex cubili
eminere, & floccos similiter i ves-
tibus esse putabam, quos auferre
tentans, nihilque sub digitis edu-
ctum inueniens, accuratius, vehe-
mentiusq; id efficere conatus sum.
Audiens itaq; duos ex amicis, qui
tū aderant, dicētes. Vides ne hūc
iam & floccos euellere & festucas
colligere? statim intellexi, ad ipm
quod dicebant me fecisse. Quum
vero sic animo constarem, vt ras-
ionalis in me facultas nō vacillae-
ret, recte inquam dicitis, proinde
ne phreniticiis me arripiat, auxi-
lio estote. illi autem quum idoneis
irigationibus caput fouerent, tota
die, sequenteque nocte, grauibus

hystoria

GAL. DE LOCIS AFFEC.

insomniñs turbatus sum, vt interi
& clamare, & exilire viderer.
verum postero die, mitigata sunt
omnia accidentia. Igitur constat
q̄ licet ab eadem causa secundum
speciem accidentia proueniāt, nō
tamē ab eadem sede quē primario
affecta sit, emergunt, & in ñs qui
ex cerebro, atque illis qui per ven-
triculi consensum, vt dictum est,
laborant. ¶ Quū enim in cerebro
cuiuspiam biliosus succus abūdat,
acceditque febris ardens, is afficie-
tur perinde ac si ad ignem torres-
retur, oriturque tum fumus ves-
luti in lucernis ab oleo, qui per va-
sa, quæ ad oculum tendunt, dela-
psus, visorū in ipsis causa censet,
siquidē in anatomice vidistis, qđ
& arteriæ & venę, ab his vasis ex
quibus choroides membrana con-
texta est, simul cū nervis ad oculos
lū descēdūt. Verū huic sermoni,
vtpote satis iam definito, finē im-
ponētes, de reliquis oculi partibus
deinceps dicamus. si prius id in vni

uerfum monuerimus, nostri instituti nō esse, earū particularū quę manifeste sensu percipiuntur, si a naturali constitutione aberrauerint, notas perscribere, sed illarū potius, quę quom affectę fuerint, sensum latēt. Nam quum pupilla manifeste videtur aut fracta, aut distorta, aut præter naturā vel aucta, vel imminuta, haud difficile est affectā particulā cognoscere. at vero q̄ sit dispositio huiusmodi faciēs affectū scire, nō sine negotio a medica arte petēdū est. Verū de hīs in libro de causis accidentiū iam scriptum est. Proinde nō opus ēē vidēt, vt in hoc libro vel affectas sedes in oculis, quas sensus cōseq pōt, vel affectus ipsos declarare aggrediar. Quippe affectuū noīa vno puo volumīe, cui titulus est quō noscant oculorū affectus, p̄scripta sunt. Causas vt diximus in libro de accidentiū causis, inuenies. Tempus igitur est, vt ad linguam nostrā cōuertatur oratio.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

¶ De affectuū linguę notitia, item
de sopore, & morbo comitiali.

Cap. II.

A Tq̃ videmus interdū
ipsius motum, interdū
gustandi sensum lædi,
Atque nonnunq̃ tactū
quoque. Neque enim alio gustus
atque alio tactus nervo vtitur, vt
in motu videre est. Nerui enim a
tertia coniugatiōe orti, nō solum
tangendi, verum etiam gustandi
vim obtinēt. Verum crebrius lę-
ditur gustandi q̃ tangendi facul-
tas, quāuis h̃sdem nervis vtraque
vtatur. Nam ad gustum quidem
exacto iudicio opus est. tangendi
vero sensorium, vt crassissimum,
ita cernendi tenuissimum est, Au-
ditus vero sensorium, vt in tenui-
tate a visu, ita sensorium gustus
in crassitudine, a tactu, secundum
locum obtinet. Olfaciendi vero
sensorium in illorū quatuor me-
dio constituitur. Mouendi au-
tem vis linguę aduenit, a septima

neruorum a cerebro ortorum coniugatione, non longe a spinalis medullæ initio. Quuuque hos in loco vtraque cerebri pars, tam dextra, quam sinistra afficitur, ne apoplexia hominem rapiat periculum est. vbi vero altera tantum, in paralyfin fieri solet. Ea interdū alteram dūtaxat linguæ medietatem, a motu prohibet. Interdū ptes sub capite cōstitutas, & quidem modo has, modo illas ifestat. Nonnunquam alterum latus, per vniuersum corpus vsq; ad extremas pedum partes, afficit. Igitur ex faciei partibus, lingua sepe numero iam dicta dūtaxat noxa molestari quum nulla sit, neque in tactu ipsius, neque in gustu, lesio. Cuius rei caussa haud obscura est, vobis præcipue, qui vidistis neruorum a cerebro processum, ad faciem quidem a parte eius anteriore, ad partes totius animalis sub facie omnes, ab altera parte nempe posteriore. Aqua etiam eorum neru

GAL. DE LOCIS AFFECT.

uorū, qui ad lingue musculos veniunt, cōiugatio procedit, quibus ipsa motum ab electione perficit. Itaque nō ab re quum āterior dūtaxat cerebri pars afficitur, sola līguæ motio vitio carebit. Reliquæ vero faciei partes omnes, in altera parte, dextra, aut sinistra, & sensum, & motum, ab electione amittunt. ¶ Quod si aliquando tota anterior cerebri pars afficitur, supremum ipsius ventrem ei consentire necesse est, atque cogitādi quoque actiones vitari. Proinde qui ita affectus est, neque sēsus, neque motionis munere fungitur, spirandi tamen facultas haud quaquam lēditur, vocaturq; hic affectus caros, id est sopor. Si vero adeo vehementer spirationem opprimat, ut quis vel magno conatu, vix spirare possit, eorum exemplo qui per grauem somnum stertere solent, apoplexia nominatur. Atqui solutē apoplexię creberrime succedere solet, vocata paraly sis. Sopo-

re vero finito, bona valitudo magna ex parte subsequi consuevit. Fit autem sopor, Hippocrate auctore, musculis temporum affectis, præterea in acutis quoque morbis, ut idem Hippocrates scripsit. Inter soporem vero & apoplexiam, morbus comitialis medius est, convulsionem afferens vniuerso corpori, sed in paralyfin non finitur. Horum trium morborum, frigidus, ac crassus, aut omnino viscidus humor, causa est. Verum & in sopore, & morbo comitiali, ventres magis, cerebri corpus minus. In apoplexia vero utraque affici solent. In catalepsi vero & vigilanti sopore (grece catoche) posteriora cerebri magis molestantur, Quam autem osse quopiam terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, sopor hominem occupat, sed neque convulsionem, neque difficili facta spirationem, hæc apoplexiæ, illa morbo comitiali peculiaris est. haud secus quam catalepsi, soporiq; seruato secundum

GAL. DE LOCIS AFFECT.

naturā spiratio. ¶ Verum ut per
soporem palpebrę clauduntur, ita
in catalepsi manent aperte. Quę
admodum autem inter perforan-
dum, quum quis membranā neg-
ligenter ac ultra quam res postu-
lat, meningophylace (id est mē-
branę custode) premendo violas-
uerit, sopor accidere solet. Ita ubi
os caluarię vehemēter attritum,
ipsius ventriculos cōprimat, ma-
ximeque medium, sopor superue-
nire potest. Quinetiam ad vehe-
mentes dolores hic affectus sequi-
tur, concidente videlicet robore
spiritus animalis. Voco autem sic,
id quod ē in cerebri vētriculis pri-
mum animę instrumentum, quo
& sensum, & motum, in vniuersa
sas corporis partes transmittit. Hos
cerebri affectus, tum quod iā pro-
posito sermoni familiaritate con-
iunguntur, tum etiam quod ātea
non satis declarati fuerunt, ope-
repretium duximus in præsentiā
definire. ¶ Sed ad linguę affectus

redeundum nobis est. Quorū alī
 quidem cōmunes sūt, per cerebri
 neruorū ꝑ consensum. Alī ipsius
 duntaxat proprī censentur. Igit̃
 quod ad communicationē, quā cū
 cerebro habet, pertinet, vt ꝑ se/
 ptimā neruorū coniugationē mo/
 tus ipsius vitatur, ita sensus ima/
 pedi potest per tertiā, quē ner/
 uum dissecutores mollem appellāt,
 descendētē dispersumqꝫ (vt scis/
 tis) in tunicā quē linguā cōprehē/
 dit. quēadmodū is, qui a septima
 coniugatione ortū habet, muscu/
 lis ipsam mouētibus, distribuitur.
 Proprī autem solius linguæ affe/
 ctus, ex nīs quæ iam supra de oculo/
 rū proprīs affectibus diximus,
 haud difficulter inuenient̃. Quip/
 pe sicut musculorū ipsius intēpe/
 rantię motum impediunt, & quiz/
 dē vt simularium, ita ambientis
 ipsam extrinsecus membranę in/
 temperies, & tangēdi, & gustādi
 simul sensum vitiat. Instrumētis
 lium vero affectionum speciē res

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ferunt inflammationes, tumores duri, tumores molles, erysipelata, suppuratiões. de his vero, vtpote quæ tum visu tum tactu discerni possunt, nihil aliud in hisce commetarijs dicemus. quippe eas dū taxat affectas partes hoc in libro persequi proposuimus, quæ neque visu, neq; tactu, sed demonstratione, atque (vt summatim dicam) rationali via inueniri possunt.

¶ De sensu auditus. Caput III.

EAdem quoq; ratione i sensu auditus, quicunq; que affectus in aurium oculis obiecta concauitate, oriūtur, rationali inuestigatione non indigēt. Illeſo vero apparente aurij foramine, si audiendi facultas lēditur, simili via & ratione inquirendæ sunt notæ. Vbi enim præter hanc nihil læſū est, neruum proprium affectum esse, haud absurde conſicimus.

¶ De affectibus faciei.

Caput quartum.

Vbi vero reliquæ faciei
particulæ, simul cum is
psa læduntur, in cereb
bro dispositionē præ
ter naturā esse perpendimus, ipso
vel vt similari, vel vt instrumē
tali parte affecto. Sed tūc facies re
liquis in locis omnibus, nō solum
motum, verum etiam fēsum, aut
perdit omnino, aut vitiatum has
bet, idq; interdū partibus quæ læ
sas habent actiones, proprio affe
ctu laborantibus, interdum vero
nervis qui ad eas a cerebro defe
runtur, deniq; ipsomet interdum
affecto cerebro. Quorum discrim
en per copulata ipsis accidētia,
• facile deprehenditur. Quippe si
• forte fortuna vna quæpiam par
ticula, aut in sentiendi, aut mos
uendi, aut vtraque facultate læ
datur, ea sola causam dispositi
onis continet. Idque aut suis is
psius partibus, aut nervis, qui ad
t. ij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ipsam ex tertia coniugatione feruntur, vel instrumentaliter, vel per intemperiem laborantibus. At ubi plurimæ simul afficiuntur particulæ, considerare oportet, utrum ex vna neruorum origine, aut pluribus, sensum motumve, quum in naturali sunt habitu, sortiatur. Subiciamus enim ex arte secandi corpora, temporum, maxillarumque musculis, item labris, & narium pinis, sensum & motum, linguæ vero, omnibusque oris partibus, sensum duntaxat, a tertia neruorum coniugatione procedere. A secunda vero, ut oculorum musculis, motum, ita a prima oculis ipsis, cernendi sensum suppeditari. Igitur ubi particulæ quibus a tertia coniugatione nervi adveniunt, & quidem omnes, sed in alterutra duntaxat parte, læsæ videntur (nunquam autem huius præceptionis, vel nihil dicentibus nobis, obliuiscaris) nervum ipsum primario affectum esse putandum est. Si vero utranque simul par-

tē lēdi contigerit, nō neruī proprius, sed ī cerebro, loci cuiuspiā, a quo nerui procedunt, primus affectus est. Sane affecto in vtraque parte, tam dextra, q̄ sinistra, cerebro, in eo videlicet spacio, vnde tertia neruorum coniugatio prodit, omnes vicinæ partes simul affici consueuerunt. proinde & tertiæ, & quartæ coniugationis nerui, vnde sequitur, vt oculorū q̄q̄ partes lædantur. Qd si vnus dū taxat vel musculus, vel neruus, quoquo modo siue primaria affectione, siue per consensū, fuerit affectus, pars ipsa in aduersum trahitur musculū. Nā resolutō musculi, qui dextram labri partē mouet, ipsa ad sinistram deflectitur. At si is qui sinistram mouet resoluitur, ipsa trahitur ad dextram. Haud secus & totam mandibulā, & nariū pinnas, & genas vtraq̄ quas a musculosa latitudine (id est lato musculo) moueri didicistis, ī aduersam partem deflecti contine-
t. iñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

git. Id autē per nervos non a tertia cōiugatiōe, sed a cervicis vertebri procedentes, efficitur. Nam hi per totam pene faciem sparguntur, exigua ipsius parte excepta, quæ a quinta coniugatione prodeuntes nervos suscipit, in suprema videlicet latissimi musculi parte.

¶ De spinalis medullæ affectibus.

Caput quintum.

Sed iam tempus est, ut spinalis medullæ affectus persequamur. Igitur spinalis medullæ affectus, quantum ad præsentem inquisitionem pertinet, compendiosam habent doctrinam. ubi vero ad actiones venire oportet, compendiosam notitiam non habent. Etenim nisi quis nervorum ab ipsa procedentium coniugationes ita memoria teneat, ut ad quā corporis partem, singulæ perveniāt, cognoscat, discernere nō poterit secundū quā vertebrā, ipsa sit affecta veluti e cōtrario, si illarū me

minerit, facilis erit affectæ sedis
 notitia. Quinetiam si reliquarū
 quoq; partium omnium, notitiam
 quæris, vt nervorum qui a spinas
 li medulla oriuntur, memineris,
 necesse est. Veluti vbi primæ ver-
 tebræ afficiuntur, licet raro eueni-
 re tamē interdum angina potest,
 idq; in pueris magis, q̄ adultis, de
 qua Hippocrates libro secūdo de
 morbis populariter vagantibus i
 hunc modum scripsit. Erant an-
 gingæ affectiones huiuscemodi. Cer-
 uicis vertebræ ad interna conuer-
 sæ sunt, alijs quidem plus, alijs ve-
 ro minus, atq; in partibus exteris
 oribus, manifesta videbatur i cer-
 uice cōcauitas, dolorem laborās,
 quum tangeretur, sentiebat. Ace-
 cidit etiam angina cuidam, sub ea
 vertebra quam dentem nomi-
 nant, verum nō adeo acuta, quib-
 usdam vero ob rotunditatis ma-
 gnitudinem, omnino conspicua.
 Gulam licet inflammatio nō an-
 geret, ipsa tamen molestia mi-
 t. iij.

GAL. DE LOCIS. AFFECT

nime carebat. Ea quę sub genis erant, tumebāt quidē, sed inflammatione haud quāq̃ vexabantur. Inguina nullus dolor cruciabat, sed naturali potius habitu permanebant. Lingua haud facile mouebatur, atq; auctā ipsis videbatur, atq; exerta, venę sub lingua manifestę deglutire nisi magno cū labore nequibant. at si vi quadam deuorare conarētur, per nares effluebat id quod ingesserāt. Ex naribus loquebant. Spiritus ipsis nō admodū elatus, nōnullis, capitis, tēporum, atq; ceruicis venę attollebant. atq; horū quibusdā tēpora paululū calebant, quīs alioq nō febricitarēt. plurimi nō angebant, nisi quū vel sputū, vel aliud quippiā deglutire tentarēt. Neq; subsedebant oculi. Igit̃ quibus tumor non in alterutrā partem deflexus, sed rectus erat, nequaquā paralytici euadebant. Horū si quēpiam perh̃sse mihi cōstaret, id referre grauarer minime. nā quota

quot memoria nunc consequi possum, oēs superstites permāserūt.

Atq; alij q̄ celerrime sanitati sūt restituti. Alij non pauci, quadragessimū diē prēterierunt. Insuper nōnullos, febris omnino nō arripuit. Plurimis etiā vsq; in longū tēpus, pars quēdā tumoris protrācta est, cuius rei signū, & a deglutione, & a voce, sumi poterat.

Atq; eliquatæ quoq; columellæ, quāq; nihil mali habere videbantur, malæ tamen significationis nuntiū prēstabant. ¶ At vero quibus alterutra pars afficiebatur, n̄ ea parte a qua vertebræ resoluebantur, paralytici euadebāt, atq; hæc ipsa versus alteram trahebatur. Porro huiusmodi accidentiū

- notę, & ex facie, & ore, atq; septo quod gurgulionē distinguit, euidenterprehendebantur. Quinetiam inferiores genæ pro ratiōe mutabantur. Cæterum qui paralytici ab angina fiebant, n̄s nō totum corpus, vt in alijs fieri solet,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

resoluebatur, sed vsque ad manus
duntaxat malū procedebat. Atq;
ñ concocta quēdam, eaq; exigua,
& non sine molestia expuebant.
præterea quibus tumor in rectitu
dine consistebat, ñ expuere pote
rant. At ñ quos febris quoq; infe
stabat, longe maiori cum difficul
tate spirabant, ac inter loquendū
screabant. venæ ipsis attolleban
tur, atq; pedes erant q̄ frigidissi
mi. Horum si aliqui nō illico mor
tui sūt, ñ tamē erigere sese haud
quaq̄ potuerunt. Verum omnes
quotquot equidem nouerim, mor
tem obierunt. Totā huius sermo
nis seriē, in secundo libro eius cō
mentarū, quem in secundum li
brum de morbis populariter vas
gantibus, perscripsimus, ad vers
bū fere enarrauimus. Atq; idcir
co eam totam hic inseruimus, eo
q; Hippocrates, multis ostendit
accidisse anginam nobis raro vis
sam, nullo existēte in gutture p
prio affectu. Quinetiam qđ circa

primas oritur vertebra, a quarū altera pars quædam dentiformis vocata, procedit. vnde nonnulli ipsam totam vocauere dentē. At nunc sub hac quoq; vertebra (inquit) factam quidem anginā, sed non eque acutam, vt ea quę circa secundam fieri solet. siquidē constat, quod spinæ partes, quo fuerint altiores, eo sunt præstantiores. proinde quo inferior primis duabus vertebribus fuerit dispositio, eo minorem inferet noxam. Sane ex arte secandi corpora didicimus, septi transuersi nervos, sub quarta ac quinta vertebra emergere. præterea ex commentarijs de spirationis causis, edocti sumus, liberam spirationem a solo fieri septo transuerso, accedente ad hanc intercostalium quoque musculorum actione, vbi videlicet vehementiori opus est spiratione. Quod si vehementissima spiratione indiguerimus, superiores et eam musculos concur.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

rere oportet. Verū non solum ob
magnam aut maximam spiratio-
nem, horum musculorum actionē
requirimus, sed ob alias quoq; caus-
fas, de quibus latius ī libris de dys-
spnœa (id est spirandi difficultate)
iam dictum est. In præsentia vero
satis fuerit, a præscripto Hippo-
cratis sermone, tantum accipere,
quantum ad affectorum locorū no-
titiā necessariū est. Si prius eius
verbi, quod in libro de articulis a
nobis explicatum est, memineris-
mus, vbi inquit. Vertebrarum au-
tem quæ in spina sunt, quæcunq;
per morbos in gibbum trahuntur.
Vult nimirum non solū ad inter-
na, vertebrarū luxationem, quā
lordosin (id est excauationem) vo-
cant, sed eā quoq;, qua retro ver-
tebræ labuntur, comitari tensio-
nes, quæ ad partes fiunt internas,
trahentibus, qui ibi præter natus-
ram cōsistunt tumoribus, nervos-
sa corpora. Igitur vbi vnica duntaxat
vertebra, aut etiam duæ, aut

tres, sese deinceps consequentes di-
 strahuntur, ea parte spinam cau-
 ri contigit. Vbi vero inter distra-
 ctas vertebrae, vel una, vel plu-
 res illaesa permanserit, sic affectis,
 gibbus accidere solet. At si in al-
 terutram partem, vel dextram,
 vel sinistram distrahatur, ibidem
 in obliquum torquebitur spina. At-
 que in eo quem praemisimus ser-
 mone, viriusque mentionem fecit
 Hippocrates, excuationis quidem,
 cum dixit quibus secundum recti-
 tudinem tumor incedit, obliqua
 vero torsionis, dicens quibus ve-
 ro alterutra pars afficiebatur. Por-
 ro exacte admodum atque utiliter
 nobis (si legerimus) haec conscrip-
 sit. Per excuationem quidem,
 neminem fieri paralyticum, quod
 fit ubi pars aliqua resoluitur. Per
 obliquam vero torsionem, malum
 ad manus usque procedere, signi-
 ficans ipsum ad infernas partes, ut
 costas, lumbos, crura, non posse de-
 scendere. ¶ In primis itaque hoc

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nobis sciendum est. Alia quidem
sequi accidentia, laborante spina
li medulla proprio affectu, siue id ex
sola itemperie fiat, siue simul hu
more quopiam affluente, vt in ery
sipelate, inflammatioe, atque vl
cere putri. Alia vero, vbi vel v
na vel plures vertebrae afflicte lux
antur. Quippe vbi proprio affe
ctu spina ipsa laborat, siue id i dex
tra, siue sinistra parte eueniat, ci
tra tamen vertebrarum luxatio
ne, & quidem si in altera parte du
taxat afficiatur, omnium inferiorum
corporis partium, quae e regione
nocumeti constituuntur, tam sensus
quam motus laeditur. Si vero vtraque
pars affecta est, oes particulae tam
in dextra quam in sinistra parte,
ei quae laeditur subiectae, similiter
resoluuntur. At luxata vel ad gib
bum, vel ad concauum vertebra,
fieri potest, vt nulla omnino par
tium inferiorum, vel in sentiendi
vel mouendi facultate vitium per
cipiat. Atque fieri etiam potest, vt

lædatur eo videlicet modo, qui ab Hippocrate in libro de articularū affectibus definitus iam est. Quū igitur āgulosa (vt ipse nominat) fit spinę luxatio, id est quum non paulatī, sed affatī, perinde ac si frāgeretur, p̄s aliqua curuatur, subiectas partes omnes lēdi necesse est. Paulatī vero facta luxatione, atq; in orbē magis, nihil notatu dignū patiuntur partes, quæ commotæ vertebrę supponūtur. Sed in obliquū laxatio, lædit ōnino eas partes, ad quas nerui ex luxatis vertebris procedētes, perueniūt. idq; magis ī ceruice . ī thorace minus, sed multo minus in lūbis accidere solet. Siquidē in ceruice, vertebrę inter se cōnexę, equaliter vtręq; conferunt foramini vnde neruus p̄cedit. In thorace autē superior magis, inferior minus. Sed in lūbis, totus neruus ex superiori excidit vertebra, vbi si trāsuerfa eueniat vertebrarū luxatio, eadē secū trahēs & spinā & neruū illę

GAL. DE LOCIS AFFECT.

seruat ipsius secundū naturā or-
tū. In ceruice vero, ex loco me-
dio inter duas vertebrae procedē-
tes nerui, per obliquas luxatiōes, ī
ea quidem parte, ad quā spina ip̄a
deflectitur, opprimuntur, in alte-
ra vero tenduntur. Porro tensio-
nes quidem, vbi ingens quoq; in-
flammatiō accesserit, cōuulsio co-
mitatur. Ad compressiones vero
earum partium, ad quas oppres-
sus neruus peruenit, paralytis, id
est resolutio, sequitur. Igitur non
ab re in ea angina cuius ī premis-
so sermōe historia narrata est, ad
manus vsq; superuenit resolutio,
vtpote procedentibus neruis ex
fine ceruicis ad manus. Quippe
sub ceruice thorax ē, a cuius ver-
tebris emergētes nerui, nō ad ma-
nus, sed ad spacia ītercostalia trāf-
mittunt, paucis qui ex primis p̄-
cedūt exceptis. Igit̄ p̄ eas q̄s nup-
diximus vertebrarū luxationes,
reliquę faciei partes oēs, neq; ī sē-
su, neq; in motu noxam subeunt.

Porro genę duntaxat sine mandibula leduntur, vt quę a musculosa latitudine, id est lato musculo, mouentur. Constat itaque qđ musculi quibus mouendi vis aduenit, per neruos, qui a ceruicis vertebris orti, in ipsis disperguntur, noxam non euadunt, si & spinam, & puenientes ab ipsa neruos, affectus quispiam infestauerit. Verum qui & quot sint huiusmodi musculi, ex neruorū qui a spina oriuntur, dissectione didicistis. Veluti alia quorūque cognitu necessaria accidētia, quę sequuntur, vbi spinę ipsius vertebrę, vel in gibbum, vel concuum, vel etiā transuersum luxantur, ex secunda particula cōmentariorum, quos in librum de articulis edidimus, omnia cum proprijs demonstrationibus accurate conscripta habetis. Quorū summas in presentia commemorasse operę precium fuerit. Equidē nōnulla iam percurri. Superest itaque, vt ea quę nondum tacta sunt, tractes

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mus, vt nihil oratiōi nostrę deesse
videat̃. Porro scire debetis, ver-
tebras a suo positu luxari, aut ob-
casum, aut ictū, aut tumorē præ-
ter naturā, neruosa corpora, ver-
tebris ipsīs, atque spinę insita, ex-
tendentem. Horum duo sunt ge-
nera. Alterum eorum quæ innas-
cuntur, Alterum tumorum quos
rundam qui præter naturam acci-
dunt. Quos Hippocrates vno vo-
cabulo cōphendens cruda tube-
ra nominauit. Igitur manifestum
est, quod in præmissa conditione,
quam libro secundo de vulgarī
morbis descripsit, ceruicis verte-
bris adiacentes muscoli, afficiebā-
tur. potuit etiam tuberosus aliquis
tumor accedere, ob quem cōcocta
nonnullos scire dicit, facta vir-
delicet tuberum concoctione. Cur
igitur eos anginosos appellauit?
an quia difficulter spirabāt, nullo
existente vel in pectore, vel pul-
mone vitio. quippe hac in re dif-
fert anginę cōcursus, a peripne-

monia, & laterali morbo, atque ex
eo q̄ angustię sensus ī gutture ē.
Præterea in p̄sagiorū libro videt̃
angine nomine appellare oēs affe-
ctus huic loco accidētes, quos spi-
rādi difficultas comitatur. Inquit
enī. Angina periculosissima est,
celeriterque enecat, si neq; in fau-
cibus, neque in ceruice quicquam
apparet, si dolor vehemens est, si
vix spiritus trahitur. etenī eodem
die iugulat, licet interdū vsq; ad
alterū, aut tertū aut etiā quartū
p̄trahatur. Quę vero in reliquis,
nō minore quidem dolore afficit,
in faucibus vero tumorē, ruborē
que excitat, superiori non minus
periculosa est. sed longius spaciū
habebit, præcipue si vehemēs fue-
rit rubor. Sed tum præcipue ma-
lum prolongatur, quum non so-
lum fauces, sed ceruicem quoque
rubor occupat. Maxime vero
potest ab ea secunda valetudo cō-
tingere, si rubor simul & ceruicē
& pectus comprehendat, neque

vñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ad interna reuertatur erysipelas.
Igit̃ ex h̃s verbis haud dubia cōie-
ctura est, omnes affectus qui haic
loco accidūt, si spirationē quoquo
modo reddant deteriore, ab ip̃o
cynanchas (id est anginas) nomi-
nari. Nondum solitis medicis cy-
nāchen per k, synanchē vero per
s, nominare, tantum abest, vt vel
paracynanchen vel parasynāchē
dicerent. Quippe tum primū ho-
mines res ipsas neglexerunt, quū
nimio studio nomina querere inci-
perent. Itaq; quatuor inuentis no-
minibus, quatuor affectus signifi-
cari dicebāt. Ac notas ipsorū scri-
bētes, genus illud quod supra tra-
ctauimus, quum sermonem ex li-
bro vulgariorum morborū secun-
do explicaremus, omnino dereli-
querunt. Atque hęc sunt quatuor
eorum genera. Primū vbi fauces
inflammañt. fauces voco internū
oris locum, vbi simul cōueniunt,
& gulę, & gutturis partes extre-
mæ. Alterum cum neque fauces,

neque reliquæ oris partes, neque
etiam externarū partium vlla in-
flammata videtur, laborans tamē
suffocatiōis periculum in gutture
sentit. Tertium vbi extrinsecus
circa fauces inflammatio apparet.
Quartum vbi gutturis partes, tū
externę, tum interiores similiter
affectę sunt. At superest adhuc alius
cervicis affectus, quem ipsi silētio
p̄terierūt, vbi ad anteriores par-
tes vertebrę luxantur, & quidem
solis interdū musculis, qui cū ip-
sis communicant, tumore præter
naturā affectis, vel nato ibi tubercu-
culo, interdū etiam gula pariter
vitiata. Nonnunquam musculis
quoq; , qui gulam gutturi iungūt.
Quinetiam proprijs aliqui guttu-
ris musculis, qui ipsum aperiant
oblæsis. Per omnes id genus affe-
ctus, spirandi quidem difficultas
oboritur. sed citra suffocationis pe-
riculum, laborātes difficulter des-
glutiant atque dolore afficiuntur,
idque præcipue, cum potus eis per

V iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nares resilit. Accidit etiā interdū
vt excedēte inflāmate, & lin-
gua, & fauces, in tumorē attollā-
tur, quēadmodū & Hippocrates
ipse tradidit. Verū huiuscemodi
cognitionum enarratio, propo-
sito nostro nihil conferre videtur.
Nam lingua affecta aliā quoque
actiones deperduntur.

¶ At vbi vnica duntaxat actio
læsa est, & sedes affectę plures, tū
nostri instituti est, vt ex reliquo-
rum accidentium varietate eas di-
scernendo inueniamus. Quippe
nullo spiritalium instrumentorū
quoquo modo, neque primario,
neque per cōsensum affectio, fieri
minime potest, vt spiratio læda-
tur. Quum itaque multa sint spi-
randi instrumenta, ac numerosa
quoque partium multitudo, qui-
bus ipsa consentire consueuerūt,
non ab re multa discretionē indi-
get is, qui & primario affectas, &
consentientes sedes, inuenire co-
natur. Igitur ex sola spirandi

specie, ilico nonnihil, & de affecta sede, & de ipsa dispositione, conſicere licet. Quippe ſi videatur laborans, inter ſpirandum, totum mouere thoracē, vt in parte quidem anteriore, ad iugulum, in vtroq; latere ad ceruicē, in parte poſteriore ad ſcapulas vſque, motus ipſius aſcendat, tres ex huiusmodi ſpiratione diſpoſitiones ſignificant. Vna eſt flāmea in pulmone, atq; corde caliditas. Altera in aliquo ſpiritualiū instrumentorum anguſtia. Tertia eſt facultatis muſculos thoracis mouētis debilitas. Quūq; huiusmodi ſpirationē cōſpexeris, in primis arteriē pulſationē perpendere oportet, hec enī quantus ſit calor indicat. Atq; de iſis in libro de praeſagiiſ a pulſu, iam ſcriptum eſt. Deinde ſpirationem ipſam conſidera, an multa, an frequens, an exufflando fiat. Poſtremo thoracem in pectore tange, quem ſi ardentem inueneris, iam omnes copioſi caloris notas te ha-

V iij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

bere non dubita. Quibus ex abundantia accedit, faciei, oculorūque rubor, capitis ardor, sitis vehemens, lingua arida, & salebrosa, dicente infirmo ardere sese. Vbi vero incendiū signis modum servantibus, thorax vehementer dilatatur, angustiam in spiritalibus instrumentis esse portendit. Itaq; consideres oportet, an guttur sit affectum, an pulmo, an thorax ipse humoribus impleatur, an tubercula in ipsis nata sint, quo in genere etiā abscessus numerātur. Atqui gutturis affectus, tum primarios, tum eos quibus per cōsensum infestatur, iā percurrimus. Pulmonis autem, thoracisq; vitia, paulopost accuratius persequemur. Nam in presentia spinæ duntaxat affectus tractare proposuimus, tum alios, tum illos qui ei per imbecillitatē vocatā accidere solent. Porro solet imbecillitas accidere, interdū cerebri vitio, vtpote a quo, & sentiendi, & mouendi facultatē recis

pit. Interdum ipsa dūtaxat spina
primario affectu laborāte, idq; ob
peculiarē intemperie, vel toti spi
næ, vel diuersis ipsius partibus ad
ueniētē, quā vulgariū medicorū
mētes nequaquā cōphendere vas
lēt, quū tamē creberrime videāt
laborantes quosdā adeo pstratos,
vt vix digitos possint mouere,
quāuis omnibus thoracis partibus
spiritus trahatur, nullo ardēte ca
lore ad magnā spirationem ipsos
cogente. Id vero ob huiusmodi
causas eis accidit. Nam dū quies
scit animans, liberam spirationē,
solum septum trāsuersum, modo
valeant vires, efficere solet. Vbi
vero ob infirmitatem, spirādi mu
nus perficere non valet, tū inter
costalium musculorum concurrīt
auxiliū. Quod si prēterea maiori
animal spiratione egeat, tunc sus
perni muscoli omnes, quorū ma
ximi, scapulas secū manifeste mo
uent, ad spirādi actionē requirun
tur. Quum itaque hominem spira

GAL. DE LOCIS AFFECT.

randi opus omnibus thoracis partibus perficere videris, non fuerit tamen frequēs spiratio, quantum thorax dilatetur perpende. Insuper & nariū pinnas, etenim ipsę quoque & dilatantur & cōtrahūtur. Dilatatur autem thorax quidem, verum non similiter vt in ardentibus febribus, quum adhuc valēt vires. Nam in ijs magna ex parte totus thorax dilatarī consuevit. Neque etiam vt in illis, quibus id euenit ob aliquam spiritalium instrumentorum angustiam, vt in angina, atque in dyspnœa, quam fluxio affatim descēdens induxit. Neque, quibus ab vtraque causa prouenit, vt in peripneumonia. Quippe hoc morbo affecti, & maxima & frequentissima spiratione vtuntur. Cēterum quemadmodū ob viriū infirmitatē, ita ob vnius quoque particulę particularem imbecillitatem, omnes thoracis partes dilatarī cogūtur. ¶ Igitur Atleta Secundus nomine, qui satis qd

pateretur intellegebat, sentire se manifeste in septo transuerso dixit imbecillitatē. Atque idcirco cogebatur intercostales musculos sine intermissiōe mouere, atq; nōnūq; superiores quoque, interdū autē zonam circūdans præcordiorum partibus, sola transuersi septi motione, sufficiēter spirabat, quo tempore quiescebat. Verum an ad septi transuersi musculū, an ad nervos qui ad ipsum perueniūt, an ad aggregatū ex vtrīsq; pertineat huiusmodi imbecillitas, mihi quidē explicatu perdifficile videt̃. ¶ Idem spiratiōis genus etiam in alio quodam notaui, quem quum aliquando equus in præcordiorum regione calcitrasset, adeo atrociter, vt oborta in septo transuerso inflammatiōe, mortis periculum immineret. Is licet euaserit a periculo tutus, ab imbecillitate tamen liberari nequiuit. ¶ In alio etiam, qui a vehementi peripneumonia infestabatur, brachij tam

GAL. DE LOCIS AFFECT.

externe, quā interne partes, a cubito ad summos usque digitos, sensus difficultate laborauerunt, atque motus quoque nonnihil læsus est. Huic præterea nervi, qui in primo atque secundo intercostali loco inveniuntur, noxam subierunt. quarum primus non continendæ magnitudinis, per intimas partes abditus deferatur, sed ei qui ipsum præcedit admixtus, atque multifariā diuisus, ut in arte secundi corpora videre est, cuius etiam partes alique per interiorē cubiti regionē, usque ad digitorū extrema perveniunt. Alter vero nervus tenuis quidem, nullique admixtus, per axillam sub cute ad brachium deferatur, dispersus per cutis tam exteriores, quam internas partes. Huic homini celeriter sanitas reddita est, adhibito medicamento ei loco ubi nervi prodeunt, iuxta primum, ac secundū intercostale spaciū. Quia sanati sunt quoque nonnulli, quibus utrumque crus paululum reso-

lutum erat, adaptato lumbis medicamento, in eo spinalis medullæ loco, vnde cruribus nervi adveniunt, nullam resolutis cruribus medicamen adhibendo. Neque enim ipsorum sed medullæ proprius erat affectus. ¶ Vidimus alium, cui magna oborta suppuratione in altera nate, iuxta cruris initium, nervi eiusdem cruris per incisionem nudati sunt, sed ea parte sanata, toti membro mouendi difficultas accidit. Itaque cōſciens durum quidpiam, a priori inflammatione in nervo derelictum, quod huiusmodi dispositionem induceret, affecto loco idoneum medicamen adhibendo, hominem perfecte sanavi.

¶ Quod autem de partibus faciei dictum est, id de reliquis quoque omnibus est intelligendū. Quippe vna duntaxat pereunte actione, solum musculus, qui ipsam efficere solet, aut nervum ipsius, affectum esse putandum est. At vbi plures actiones viciatæ sunt, non

GAL. DE LOCIS AFFECT.

eodem in loco accidit interdum,
omnes eius musculos, a communi
aliqua caussa ledi. fieri etiam pos-
test, vt neruus aliquis, qui muscu-
lis illis communis est, afficiatur.

¶ Præterea piscator quidā, quū in
fluuio pisces venaretur, adeo cir-
ca sedē, & vesicā ifrigidatus est,
vt ipso inuito effluerēt & alui ex-
cremēta, & vrina. Atq; hic quos-
que p calida remedia affectis mus-
culis adhibita, celeriter sanus euas-
sit. ¶ Item alius eisdem molestas-
tus accidentibus, sine tamen mani-
festa caussa, læsis circa os sacrum
neruis, multo tempore per multa
præsidia, vix sanatus est. Igit̃ qđ
ptinus ab initio dicebā. illius nūc
quoque mentionē faciēdo, ad alia
me diuertam. Etenim si ex arte
quæ corpora secare docet, ad quā
particulā descendant singuli ner-
ui, a spina prodeuntes, cognoue-
ris, affectas sedes quā facillime in-
uenies. Ex artis itaq; actiōibus ho-
rum omniū examen re ipsa depre-

hendite . Nanque sepe numero vidistis ex huiusmodi notitia , manifeste iuuari laborantes . Quippe non solum crura , & manus temere ac frustra vulgares medici , tota die noctuque , calidis medicamentis illinunt , prætereuntes locum , vbi vel spina , vel neruus aliquis ex ipsa emergens , læditur . Verum etiam caput cuiusdam , non ita pridem , impositis medicamentis vehementer calidis , vlcerauerunt , putantes sensum ipsius grauiter læsum , hoc pacto posse reuocari . Atque hunc ipsum sanauimus , inuenta sede affecta , tum ex reliquis accidentibus , tum ex euidentibus causis . Nam super singulis interrogauimus . Quarum vna huiusmodi erat . Quum sub multa pluuia ac vento impetuoso ambulasset , palliū circa cætera icē madefactū aiebat , adeo vt vehementi se frigore in ea pte affectum sentiret . Ita quod si sciueris ex primis spinæ vertebriis , quatuor neruos ad caput ascendere , a quibus

GAL. DE LOCIS AFFECT.

pellis ipsū ambiēs, sensū accipit,
facile sedem affectam iuenies. Hac
igitur sanata, capitis quoque pel-
lis pariter sanata est. vtpote quæ
nulla primaria affectione labora-
bat. Medici vero neque huiusmo-
di nervos, neque eos qui per singu-
las cutis partes dispersi sunt, co-
gnoscentes, quamuis presentaneū
sit eis remediū, quod minime dū-
ticle iuxta nerui initium adhibe-
ri deberet, ipsi partes illæ sas mul-
to negotio molestant. Ego vero
sepenumero vos monui, alios qui-
dem in ipsa spina veluti radicem
habere, alios vero vt ex magnis
ramis, atque ipsis quoque e spina
exortis, procedētes, qui rursus di-
uisi, distribuuntur. Atque alij per
valde multas cutis partes, alij per
pauciores. Quo magis miror dis-
sectores ipsos, illos non cognosce-
re, quum in neruorum resolutiōe
quærent, quam ob causam resolu-
tarum partiū non semper & mo-
tus, & sensus pereat? videntes alia

quando sensum duntaxat, aliquādo & sensum & motum simul deperdi. Arbitratur namque nervorum, qui per musculos dispersi sunt, reliquias, ad cutem tendere, quūque diuisus per musculum nervus affectus est, siquidē vehemens fuerit vitium, & sensum & motum simul lēdi, sin leuius fuerit malū, seruari quidem sensum, vtpote quod non tantū roboris desideret, motum vero, eo quod robustis egeat viribus, perire. Interdum enim vnus musculus, vel totū crus, vel manum mouet, ac proinde viribus indiget, qui si ita afficiatur, vt manus suum perficere nequeat, mēbrum ipsum immobile relinquit. sentiendī vero facultas partiū affectiones discernens, illeſa tūc permanet. vt quæ non ita validis egeat viribus. quippe nihil minus, imo magis etiā, pati possunt, partes quum debiles fuerint. efficit enim imbecillitas, vt facilius affectio a sensu dimoscat. Igitur ratio.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ipsorum in huiusmodi quidē ner-
uorum resolutione probabilis esse
potest. Vbi vero de perdita sen-
tiendi facultate, motus non perit.
nonnulli quidem adeo vanas ad-
duxere rationes, vt satius fuisset
eos conficere. nōnulli vero co-
gnita huius quēstionis difficultate,
non grauati sunt dicere huiusce-
modi paralytis speciem, qua ser-
uato motu sensus perderetur, nec
minem vnquam vidisse. Sane qui
arroganter sibi seclē alicuius pri-
cipatum vsurpant, artis vero ope-
ra nūquam in exercitationis vsū
duxerunt, nōs nihil tam difficile vi-
detur, quod non intrepide profi-
teantur. Verum magna ex parte
mentiuntur. atq; vt scribunt nōs
nulla, perinde ac si ipsa frequēter
conspexerint, quorum tamen ne
somnia quidem vnq̃ viderūt, ita
plurima nunquam videri aiunt,
quāuis creberrime conspexerint.

¶ De sanguinis spūto.

Caput sextum.

A Tq̃ conuenit quidem
inter medicos, sanguis
nē e gula vētriculoq̃
vomitiōe, ex spiritalis
bus partibus tussi, ex faucibus &
gurgulione sreatu, ex ore s̃plici
expuitiōe expelli. Nos vero sāgui
nem, qui a cerebro, ad gurguliōis
partes internas, vt ad fauces affatī
descēdebat, tussiendo educi sepe a
numero conspeximus, quippe su
bito gutturi irruēs, tussim moue
re potest. quare diligēter aduers
tere animum oportet, ne aliquā
do huiusmodi sanguinem, ex spi
ritalibus instrumentis ascendisse
putemus, exemplo illorum me
dicorum, quos equidem noui non
recte erroris accusare pręstantis
simos medicos, quum ipsimet er
rarent, credentes huiusmodi san
guinis eruptionem esse quam pe
riculosissimā, vtpote pulmone ve
hementer affecto. Neq̃ enim par
est, exigua vena dirupta, tantum
x.ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

effluere sanguinem. Ceterum cō-
tingit plerūq; vt vel erosa, vel
exesa, vel vtcūq; nominare vo-
lueris, vena sanguis affatim tussis-
endo eñciatur. Quū enim retros-
actis temporibus, quis ex non ita
multis interuallis, quotidie sāgui-
nem tussiendo expuere cōsueue-
rit, superueniatq; ei postea multi
sanguinis inter tussendum eru-
ptio, & quidē neq; ab alto cadēti,
neq; in certamine, neq; palestra
grauiter vulnerato, neq; etiā sub
villo graui pondere oppresso tho-
race, reliquum fuerit, vt cōñcis-
amus, ob auctam erosionem, plus-
rimum sanguinem inter tussien-
dum fuisse reiectum. Atq; nō pau-
ci sic affecti, pulmōis quasdā par-
ticulas simul cum sāguine eiece-
rūt. Quocirca diligēter conside-
rare oportet, an spumofum quid-
piam simul educatur. Id enim effi-
cacissimum fuerit indicium quod
ex pulmōe facta sit excretio. haud
secus si bronchi pars quēdam aut

arteriæ, aut venę tunica, aut etiã
pulmonis ipsius caruncula eñciť.
Quippe nihil horum accidit ñs,
qui ex thorace sanguinem tussieñs
do producant. Ac ne dolor quidẽ
infestat eos, quibus a pulmone sãs
guis erũpit, vtpote qui duos neru
uos perq̃ tenues, a sexta neruorũ
a cerebro ortorum coniugatione
recipit, extrinsecus per membras
nam ipsum continentem disper
sos, qui intrinsecus haudquaq̃ per
visceris profunditatem extendũ
tur. Verũ thoraci (vt scitis) mul
ti ab internis, multi etiam ab ex
ternis partibus, adueniunt nervi,
quibus facile dolores percipi pos
sunt. Præterea thorax musculis,
ossibusq̃ abundat, pulmo vero la
xus est, atque ab afflictione tutus.
Proinde thoracis dolores intensi
ores sunt, pulmonis remissiores.
Quũ igitur dolẽte thoracis par
te quapiam, sanguinem quis spu
endo reiecerit, neq̃ multũ, neque
rubrum, sed nigricantem, grus
x.ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mosumq; , huic thorax primaria affectione infestatur. Sanguis aut ex pulmōe educitur, eo modo quo pus, ī supputatis affectibus, vbi videlicet inter thoracem & pulmōnem, sensus iudicio cōtineri percipitur, haud secus quam in pleuriticis quoq; sputum quomodolibet coloratū apparere solet, quē admodum in quinto huius commentationis libro vtcunq; dicemus. ¶ Consequens est vt de vlceribus quæ sanguinis reiectioni, superuenire cōsueuerunt, deinceps dicere aggrediamur. Ea ī pulmōne creberrime fieri possunt, ac curationem (vt quibusdā videtur) nequaquā admittunt, aut (vt alij putant) difficulter admodum sanantur. At in thorace dirupta vasa, a quibus sanguis expuitur, magna ex parte conglutinantur. Nunquā enī huiuscemodi vlcera, vel diuturna, curationi omnino resistūt. Quæ vero in pulmōne longo iā tempore permanserunt, quamuis

aliquando curentur, relinquitur
tamen in ipso res quædam callosa,
fistulosaq, quæ tractu temporis,
a leui occasione expelli solet.
Atque cum hæc quæ inde expuuntur,
miscentur ramenta a medicis
vocata, ac cruoris exigua quædã
guttula, qua in re, cum vlceribus
in alijs sedibus genitis, commu-
nicant. Verum ex gula ventricu-
loq, vomitu, ex renibus & vesica,
cum vrina, ex intestinis vero
deiectione excernuntur. Sed ex
spiritalibus instrumētis, nihil sine
tussi expui potest. Quod si pluri-
bus deinceps diebus aliquis cruo-
rem & screauerit, & emunxerit,
idq, citra capitis vel dolorē, vel
grauitatē, siue præsentē, siue præ-
teritam, neq, is ex iclu procedat,
Huius & totum per nares meatū
atq, eam oris partem, qua ad nas-
res foramen tendit, accurate cō-
siderare oportet. Nā fieri potest
huiusmodi accidēs, hirudine huic
loco adhærente, quæ quidem
x.iiij.

GAL. DE LOCIS. AFFECT

in dies augeri solet, quamuis enī
primis diebus, vtpote exigua, sen-
sum effugiat, tertio tamen, quarto/
ve die, hand obscure videri pos-
test. Eadem ratione ex ventricu-
lo quoq; cruor epota sanguisuga
euomit. sed est huiusmodi cruor
tenuis sanieiq; speciem refert, si-
ue is ex ventriculo, siue naribus,
siue ex ore feratur. Igitur cum ta-
lem videris, ac hominis confides-
rato habitu, super præteritis eum
interrogaueris, ex omnibus, rei i-
psius veritatem facile conñcies.
Equidem quū viderem hominē,
ītegra valetudinē, huiusmodi cruo-
rem euomētem, interrogavi qua
victus ratione antea fuisset vsus,
ille vero inter alia quæ narrauit,
hoc quoq; addidit, quod quum no-
cte quadam sitiret, misso puero q-
aquam afferret, ex immundo fōte
bibisset. Quibus auditis, sciscita-
tus sum, apparuissent ne aliquan-
do sanguisugæ in ipso fonte, qui
quū id quoq; fateret, epoto sub-

23/ *Lonia.*

inde idoneo pharmaco, hirudinē vomitione reiecit. ¶ Porro quum alius quispiam huiusmodi cruorē emungeret, & expueret, ipso narrante audiui, cum rure, æstatis tēpore, in stagno quodam, cum ceteris iuuenibus iuuenili ludo, quas lem adulescentes in aqua ludere solēt, exercitatum, tum ego sciēs in eo stagno sanguisugas esse, duxi laborantem ad splendorem, cōuersoq; directē ad solis radios nariū foramine, in eo meatu vbi nasus ad oris regionem perforatur, hirudinis in meatu latentis caudā cōspexi. Has igitur historias, utpote perquam cōducibiles, vobis narrare operæ precium duxi.

¶ Quibus notis vitiata voce, affecta sedesprehendatur.

Caput septimum.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

QUod in proposito sermone, lesionem putare oporteat, etiam si non penitus tota partis actio secundum naturam deperditur, sepe numero iam diximus. Nec abrefuerit id in praesentia monuisse. Praeterea (quamvis non ignoretis) monitos vos velim, non easdem esse rem, vocem & sermonem siquidem vox vocalium instrumentorum munus est, Loquela vero, eorum quae sermoni deputata sunt, Inter quae lingua principatum obtinet. cui non parum conferunt, & nares, & labra, & dentes. Sic etiam vocis instrumenta sunt, guttur, & muscoli ipsi moventes, atque nervi, qui a cerebro ipsis vim deferunt. Igitur si vel claudentes, vel aperiētes guttur muscoli immobiles reddantur, quae sic afficitur obmutescet. ubi vero vel difficulter moventur, vel palpitant, aut tremunt, pro affectionis ipsius modo, vox ipsa laedetur.

Similiter, si vel conuellendo, vel
 quatiendo, mouetur, aut vbi im-
 becille sunt ipsis veres, siue ob suā
 ipsorū, siue ob neruorū ipsos mo-
 uentiū affectionē, obscurā efficiēt
 vocem. Quod si alius quispiā ex
 mouētibus guttur musculis, quos
 quo modo afficitur, lædetur quidē
 vox, sed paruum erit vitium, atq;
 sic affectus, neque obmutescet os
 minino, neq; ita exiguam habebit
 vocē. Igitur vt ex musculis gut-
 tur, mouētibus, præcipui habent,
 n̄ q; ipsū & aperiunt, & claudūt,
 ita ex vocalibus neruis, n̄ quos re-
 currentes vocant, qui & ipsi sex-
 tæ coniugationis psunt, neruo/
 rū, qui a cerebro oriuntur, quem/
 admodū & alī, qui quidem per i/
 psū dispersi differunt ab illis, eo
 quod a neruis sextæ coniugatio/
 nis non in ceruice, sed cum ad tho-
 racis regionem peruenerint sepa-
 rantur. Nullus itaq; tam ineptus
 dissector est, qui sextam coniu-
 gationem totam secet inuitus,

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quamuis recurrētes nervi ob im-
peritiam nōnunquam duellātur.
accidit vero interdum in magnis
asperę arterię vulneribus, vt vna
cum ipsa arteria, vel alter, vel v-
terque incidatur. Porro per chis-
rurgiam quoque infrigidati, tan-
tis per vocē impediē, donec cas-
lefacti, naturalem temperiem re-
cuperauerint. Quinetiam vitari
vocē haud obscure contigit, quū
vel acutior, vel maior redditur,
ob id qđ fauces a suis musculis ne-
queant intendi. Item grauissime
læditur vox, vbi membrana, quę
faucibus & gutturi cōmunis est,
multa humiditate rigatur. Quod
etiam fluctiōes eadem ratione vo-
cem raucam efficere possint, ne-
mo non intelligit. Vehemēs quo-
que exclamatio, similiter vocem
afficit, vtpote quę similem inflā-
mationi circa iam dictā membra-
nam, atque gutturis musculos, pa-
rit affectum. Cæterum quum gut-
turis interni musculi inflammantur

tur, eum affectum, anginam esse
 constat, quæ simul & vocē, & spira-
 tionem lædit. Ac idem quoque
 in vniuersum facere solēt omnes
 præter naturam tumores, siue in
 spiritalibus vñs exoriātur siue, ex
 trinsecus ipsas comprimēt. Sic es-
 nim gula quoque vbi inflamma-
 tione affecta est, vt comprimat as-
 peræ arteriæ tunicam, qua car-
 tilaginum ipsius partes extremæ
 sigmoides vocatæ (id est quæ si-
 gma literæ figuram referunt) cō-
 iunguntur, & spirationi, & voci
 noxā afferre consuevit. Haud ab-
 simile quoq; vitium inducit, ver-
 tebrarum cervicis in anteriorem
 partem luxatio, sed de his iam an-
 tea dictum est. Igitur omnes huius-
 iusmodi affectus voci adueniunt,
 proprijs ipsius instrumentis fami-
 liar aliquo vitio, siue primogenia
 affectione, siue per consensum la-
 borantibus. Nam id ad propositū
 sermonem nihil conducit. ¶ Sunt
 præterea alij affectus, cum pe- ulis

GAL. DE LOCIS AFFECT.

si sua materia priuatur. Atque in
commentarijs de voce iam dictum
est, quod propria huius actionis ma-
teria, generatim quidem loquendo,
est exspiratio. secundum speciem vero,
atque propriam differentiam, exufflatio.
que quidem est, quando affatim spiri-
tus foras effertur, intercostalibus
musculis ad hanc actionem concurrē-
tibus. Unde fit, ut per vehemens-
tia thoracis vulnera, atque omnino
ipsius in altera parte resolutionem,
in primis quidem semispirans, ac
mox animal semiuocale euadat,
idque per accidens. In apoplexia ve-
ro, sopore, morbo comitiali, vigi-
lanti sopore, communi ratione earum
actionum que ab impetu & voluntas-
tis imperio procedunt, vocem ledi con-
tingit siue spinæ partes primæ,
siue simul cum nervis cerebrum quod
que afficiatur. His itaque quinque
inter se consequentia quadam con-
uenientibus, expiratione, exuffla-
tione citra strepitum, si repentini ex-
ufflatione, voce, loquela. si earum

prima lædatur, reliquas omnes læ
 di necesse est. Ultima vero læsa,
 reliquæ haud quaquam læduntur.
 At cum secunda, tres reliquæ læs
 duntur, cum tertia, duæ ultimæ,
 cum quarta vero, sola postrema
 læditur. Etenim si nihil omnino spi
 ret animal, vel ex utrisque tho
 racis partibus, vel ex altera parte
 duntaxat, & quidē si ex utrisque,
 celerrime suffocabitur, si ex alte
 ra tantum, semispirans, atque se
 miuocale reddetur, perdetque si
 mul reliquarum deinceps duarum
 actionum partem dimidiā. Quæ
 rum alteram exufflationem citra
 strepitū, alterā vero, strepitē no
 minare cōsueuimus. Quod si ex
 piratiōe seruata, corrūpat exuffla
 tio, reliquæ tres actiōes, strepēs ex
 ufflatio, vox, et loquela, simul cor
 rumpētur. Sicut voce pereunte,
 loquelā quoque perire necesse est.
 Cum itaque dictarū actionū opifi
 ces musculos cognoueritis, super
 est cōsiderare, qui ex ipsis p̄prio

GAL. DE LOCIS AFFECT.

affectu laborent, & quorum actio
lædatur per accidens. Quid si quid
piam corum, quæ ex corporum dissec-
tione vidistis, obliuioni tradideritis,
admonebunt vos, non quos de respi-
rationis causis, atque de voce per-
scripsimus, commentari non. Atque
de his ipsis, in secundo libro de vi-
uorum dissectione, etiam dictum
est. Sane expirationem faciunt, vni-
uersi thoracem contrahentes mu-
sculi, Exufflationem, quæ vehemens
expirationis est, intercostales maxime.
Strepentem exufflationem, non qui
in faucibus sunt, Vocem vero ipsam,
gutturis muscoli efficiunt. Sed lin-
gua articulatim vocem distinguens,
loquendi usum præstat. atque non
nihil ad hanc rem conferre videtur
dentes, labra, narium foramina,
palatum, gurgulio, præterea
mediocre lingue ipsius vincu-
lum. Itaque balbis blebisque atque
aliis qui impedita sunt loquela,
loquutionis instrumentorum aliquid
quod, aut cum natura ipsum

formaret, aut postea, lædi certum est. Veluti quum vel polypus, vel aliud quidpiam narium foramina obstruit, aut ex primis dētibus aliquis deperditus est, aut vbi labia fuerint mutilata. Verū quo pacto quidam tenuē obtineant vocē, ac præterea quomodo alię vocis, tum differentię, tū affectiones, fieri possint, vt rauca, resonans, tenuis, aspera, obscura, in commentarijs de voce sufficienter diximus.

¶ Quibus notis sedes affectæ in dyspnœa deprehendatur.

Cap. VIII.

A Tq; de dyspnœa (id est difficili respiratione) iā antea, vbi spinę passionēs percurrimus, multa dicta sunt, quorum in præsentia meminisse opere precium esse ducens, ea quę ad huiusmodi cōtemplationē desiderari possant, subiungere decreui. Itaq; in vniuersum expedite vos meminisse vel m, musculorum thoracem mouētū,

Y

GAL. DE LOCIS AFFECT.

neruorumque, qui ad ipsos perueniunt, quos in corporū dissectione vidistis. Igitur introeuntes ad hominem difficulter spirantē; in primis considerate, an omnes thoracis muscoli moueantur, an soli intercostales sine superioribus, atque an simul cum intercostalibus præcordia quoque moueantur. Quum itaque conspexeritis omnes moveri, vnam ex tribus, quas dicemus, causis, huiusmodi motionem efficere putandum est. ac deinde quæ sit illa, quæ nunc infestat, perpendere oportet. Quod si non omnes mouentur, aliter definire. Subiungimus igitur aliquem omnes simul mouere musculos, vt pectus, vna cum scapulis manifeste subleuetur. In hoc ex tribus vnū aliquod cōtinere necesse est. Aut virium imbecillitatem, aut viarum spiritus angustiam, aut vehementem in corde & pulmone calorē. Quāuis interdum duæ, ac nonnunquam (licet raro) tres quoque ex iam dictis

caussis concurrere possint. Atqui
tribus quidē simul conueniētibus,
proximam mortē timere oportet.
Vbi vero duæ fuerint, difficile est
ægrum seruare. Sed vna dūtaxat
infestante, peculiaris opus est finis
tione, vt sciatur, vtrum ad sanita
tem perueniet æger, an sub malo
succumbat. Igitur vbi vires dūta
xat fuerint infirmę, ad tria mouē
tium musculorū genera venire,
eosque omnes ad motionem exci
tare solent, vno genere mouere
pectus nequeunte, Quippe si ses
ptum transversum solum, veluti
quum secundum naturā se habet,
suffICIENTER mouere posset, neque
intercostalibus, neq; superioribus
musculis indigeret, quoniā vero
imbecillam est, omnes sensim mo
uet, sed neque frequentem, neque
raram omnino facit actionē. His
igitur adhibenda est mens, nā cę
tera haud difficulter per ea discer
nūtur. Sane plurimū aucto in spis
ritalibus instrumētis calore, oībus.

y ſ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quidē thoracis musculis agitania
mal, sed velox, frequens, & vehe
mens, est eorum actio, quando vis
delicet citra virium imbecillita
tem, calor infestat. At viriū imbe
cillitatē, vbi flammeus calor non
accefferit, neque velox, neque fre
quens omnino comitatur motus,
proinde nō ita multū, omnes tho
racis partes dilatare potest. Quip
pe hoc dyspnœe genus, cū ea quæ
ob nimiam incessionem facta est,
vnum commune habet, quod oēs
thoracis muscoli per ipsam agere
coguntur. Quinetiam vbi ob plu
rimum calorem spiratio difficilis
est, præter magnitudinem, frequē
tiam, & celeritatem, hoc quoque
accedit, q̄ calidus, feruensque sp̄s
ritus, exufflando producitur. vbi
per virium imbecillitatem, nulla
ab ore facta exufflatiōe, ex solis na
ribus emitti solet. Qd si per inspi
rationem cuiuspiam narium pinnæ
manifeste contrahi videantur, id
vero efficax p̄strati roboris indis

cium est. Ob spiritalium vero instrumentorum angustiam, totus quidē thorax magna ex parte, & celeriter, & frequenter dilatatur: sed qui sic laborant exufflare omnino non consueuerūt. Si vero simul conueniunt in spiritalibus instrumentis, & calor, & angustia, vt in peripneumonia, tum neque maxima, neque frequētissima, neque etiam celerrima spiratio sufficere potest. sed surgere tentāt sic laborantes, etenī sentiunt hoc pacto thoracē facilius dilatari. quippe qui decūbentibus in sese concidit, eo q̄ pectoris partes ad spinā declināt, qua erecta thorax etiam simul fertur, nō amplius seipsum grauans. Ac similiter quoq̄ respirare solent, n̄ quibus asperæ pulmonis arteriæ plurima defluētione opplētur, aut vbi ex proximis locis in ipsas aliquid deriuatū est, a superioribus vero vnica duntaxat se differunt, quod neque exufflant, neque calidum spiritū emit

y in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tunt. ¶ Sic etiam ñs, quibus inter
thoracem pulmonemque magna
puris quantitas collecta est, quos
suppuratos vocant, totus thorax
attollitur. sed neque calidus est ip
sorum spiritus, neque etiam exuff
flando emitti solet, nisi adurens
fortasse febris accesserit. Verum ñ
celerrime suffocantur, tum ob affe
ctum ipsum, tñ q̄ vires omnibus
suppuratis ex necessitate imbecil
iores redduntur. Sed non necessa
rio in fluctionibus quæ ad pulmos
nem irruunt, aut peripneumonia,
aut asthmate (id est anhelatione)
robur p̄sternitur. Nā contra per
anhelantes affectus, crassis & viz
scosis humoribus pulmoni impas
ctis, vires robustæ, constantesque
permanere possunt. Atque si tu
berculum, coctu difficile, aliquādo
in ipso natum fuerit, thorax ma
xime quidem dilatabitur, sed non
ita multum inspirabit aerem. Ac
licet cōtinenter spirare cogatur,
non tamen exufflare solet, id enim

aucti caloris proprium est.

¶ In eādem dyspnœe speciem, sed alia ratione, labuntur, n̄ quoque quos angina molestat, ob angustiam quæ non sit in concauitatibus, quæ inspirationē suscipiunt, sed in n̄s quæ ipsam transmittunt. Quibus vero, & abscessus, & inflammatio, atque humorum plenitudo, in thoracis aut pulmonis cauernis consistit, nulla obstructione accidente in gutturis atque asperæ arteriæ concauitatibus, illis videlicet quæ inspiratum aerē suscipere solent, si tum angustia cōstringat, ex necessitate sequetur magna thoracis dilatatio, sed non ita multus trahetur spiritus. Proinde laborantem & celeriter, & frequenter spirare necesse est.

¶ Præ omnibus autem vos meminisse velim, magnæ respirationis geminas esse differentias. sit enim interdum ob dilatatiōis a thorace procedentis magnitudinē, intere

y^huñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

dum vero ob inspirati aeris multam essentiam. Scitis nimirum quod saepenumero vos admonere soleo earum rerum, quae a prioribus omissae sunt. Nam quas ipsi persequuti sunt, earum propter scriptorum multitudinem, facilis atque in promptu est memoria. Sunt nonnulla quae neque ab Hippocrate (quamvis accurate de dyspnoea scripserit) definita sunt, neque ab ullo posteriorum ea quae ipse reliquit, elaborata discussaque sunt. Atque idcirco necessarium esse putavi, creberrime illorum vos admonere. ¶ Igitur quisunque sine inflammatione, vel omnino sine aliquo praeter naturam tumore, aut angustia spiritalium instrumentorum, per febres ardentes, difficulter spirant, non inspirati aeris quantitas, magnitudini dilatationis thoracis, proportionem respondet. Quibus vero vel tumor, vel angustia sine flammeo calore in spiritalibus est, in his thoracis quidem dilatatio maxima est, id ves

ro quod inspiratur, non solū dilas-
tationem pportione non assequi-
tur, verū etiam minus q̄ secundū
naturam inspirari solet, attrahit.
At sine distinctione, vnā disposi-
tionē ostendit magna thoracis di-
latatio, si raritatē simul acceperit.
Verū animaduertere oportet ne
aliquando in hac decipiamini, pu-
tantes eā spirationē, quę ob viriū
imbecillitatem omnibus agētibus
musculis efficitur, eandem esse cū
magna. Quam equidem, quo cla-
rior esset interptatio, sublimē vos
care volui, nam tum in animum
venit, vt perpenderem Hippo-
cratem sublimē vocare spiritum,
eum qui altioribus thoracis partis
bus inspiratur. Quemadmodum
quum inquit. Magnus spiritus &
ex longis interuallis, deliriū decla-
rat. Constat eum, magnum p mul-
to dixisse. Is vero bifariam fieri
potest, vel sine superiorū muscu-
lorum actione, vel ipsa quoq; con-
currente. Nam plerunque inters

GAL. DE LOCIS AFFECT.

costales musculi, vna cum septo transuerso, ad multā thoracis eleuationem qua multus spiritus allciatur, superiorum musculorum auxilio non indigēt. Quod vero huiusmodi eleuationis species, delirium portendat, in commētarīis de dyspnœa iā ostēdimus, vbi etiā cuiuslibet difficultatis anhelitus dispositio, declarata est. Nūc vero, vt compendio quodam, hic explicamus eos affectus, quos ī alijs antea cōmentarīis iā percurrimus. Ita & de dyspnœæ differētīs, partim quidem dictū est, partim vtro in sequentibus dicemus, Nam magnarū respirationū, alia quidem crebra est, atq; huic sunt differentię complures, quarum alię alias dispositiones indicant, Alia vero rara, vnicam indicans dispositionem. Sic etiam de exigua dicendum est. q̄ rara quidem spiritalium instrumentorum frigiditatem, frequens vero non solum spiritalium, sed eorum quoque quæ

cum ipsis mouentur, vt hepatis, lienis, Ventriculi, gulæ, laborem portendit. Quum igitur plures sint dispositiones, quas per vehemētes motus dolor comitatur, ex alijs notis, & cōsiderandū & definiendū est, siue inflammatio quædam, siue erysipelas, siue vlcus, siue abscessus dolorem efficiat.

Quinetiam didicistis q̄ in æqualibus intemperantiæ, dolores excitare sæpenumero solent. Similiter spiritus crudi flatuosiq̄ copia, qui arctatus aliquando, partes ipsum ambientes distendit, aliquādo vero violenter egreditur. Præterea calidi & acris, aut frigidi & lenti humoris abundantia. si aliquando retentus succus, ambientia corpora distendat, aut inde violenter exeat, dolores efficere potest. qđ si grauius affecta fuerint instrumenta, in quibus huiusmodi res continentur, dolent, vel non mota. si vero leuior fuerit affectus, quando mouentur. Verum in libris de

GAL. DE LOCIS AFFECT.

dyspnœa, causam explicauimus, cur exiguæ spirationis, frequens quidem spiritus, motorum per respirationem instrumentorum, laborē significat. Rarus vero, vehementem refrigerationem, & quidam spiritalium duntaxat, præcipue pulmōis, & cordis. Est etiam alia dyspnœæ species, quā veluti breui quadā quiete, intercipiūt opus thoracis, idq; nōnuq; aspirando nōnuq; vero respirando, siue hoc accidat ob musculorū thoracis cōuulsionem, siue ob caloris copiam, cogentis laborantem continenter vel aspirare, vel respirare. ¶ Est insuper alius spirationis affectus, quem apnœā (quasi non spirationem dixeris) nominant, nulla, ut aspicientibus videtur, facta spiratione. Verum ut rei ipsius natura declarat, eam non fieri incredibile est. Nā impossibile videtur ut animal omni spiratiōe exacte priuatū, in vita seruari possit, quamevis ea animalia quæ in cavernis lac

tere consueuerunt, thoracem mouere videantur minime. Proinde duorum alterum concedere oportet, aut adeo exigua fieri spiratione, ut sensum effugiat, aut huiusmodi animalia tunc spiratione omnino non indigere, sed eam transpiratione, quæ per vniuersum corpus fit, sufficere. quippe hanc, corpus ipsum per arterias efficit. Respirationem vero, per thoracem cerebrum efficere constat. At vero dispositio, quæ apnoeam facere potest omnibus animalis partibus communis esse videtur, veluti in apoplexia, sopore, morbo comitiali, catalepsi. Nam in his omnibus, nullus proprius affectus, spiritalia instrumenta præ ceteris infestat, non magis quam vocis, aut locutionis, aut progressionis instrumenta. sed affecto principio omnia quibus vires suæ per quas reguntur ab ipso suppeditare consueuerunt, ei consentire necesse est. verum de apnoea iam & particulatim, et per se

GAL. DE LOCIS AFFECT.
diximus. quamobrem tempus est,
vt nunc ad alia transeamus.

¶ De pulmonis affe-
fectibus.
Caput nonum.

Igitur quum exercitatio-
nis via, qua ad affecto-
rum locorum notitiam
peruenitur, duplex fit,
altera quidem ab apparētibz acci-
dētibus, altera vero a corpis parte
tibus, si quis per vtrasque volue-
rit exercitari, eadē bis dicet, quā
uis alio. & alio modo, vt de pul-
monis confestim affectibus dictum
est, vbi de dolorum ratione, de sā-
guinis reiectiōe, ac de dyspnœa di-
ximus, atque in præsētia quoque
dicemus.

¶ Etenim vehementi dolore nun-
quam cruciatur, verum & gra-
uitatis sensum, & aliquando extē-
sionem quandam, vel ad pectus,
vel ad spinam percipere potest.

re auditur. Accedit ad iam propositas notas, hoc quoque indicium, si vehementi prægressa pleuritide, nihil pene laboras expuerit. Si vero citra febrim, serosus, aut pituitosus humor, in thoracis spacium subito defluens, spirandi difficultatem excitauerit, laborans, tenue spiritum, idque ab initio quidem exiguum, sed cum vehementi tussi, ubi vero concoctum est, plus, atque crassius, & cum mitiore tussi, expuere solet. Quippe bifariam accidere potest, ut vehementer tussiendo, pauca quis expuat, alij enim ob lentum crassumve humorem, alij ob tenuem, id facere videntur. si quidem tenuis humor, quum subleuatus est, inter tussendam a spiritu diuisus refluit. Lætus vero, aut omnino crassus, difficulter effertur, utpote qui non tam facile a corporibus quibus impactus est, abstergi, neque etiam a quauis occurrētis spiritus violentia, impelli potest. nisi enim spiritus qui tussendo effera-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tur, & multus, & vehemens fuerit, nihil secū educet. Igitur spiritum, quod nec liquidum, aut aquosum admodum fuerit, nec crassum etiā aut lentum, id facile efferri solet, maxime ubi validæ fuerint vires. Etenim sine vehementi thoracis contractione, vehementer tussire nemo potest. At sine valida tussi, crassos, lentosque humores, efferri impossibile est. ¶ Igitur quando cum spirandi difficultate, cui & angustia, & gravitas coniuncta est, acuta quoque febris inciderit, is affectus inflammatio pulmonis est. At si intolerabile fuerit incendiū, angustiae vero, gravitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare censendum est. Extremis autē ita definitis, quid sit erysipelas phlegmonodes, aut inflammatio erysipelatodes, haud difficulter deprehendetur. Sunt alij pulmonis affectus ubi citra humorū affluentiam intemperies ipsum infestat, siue equalis ea fuerit, siue inequa-

lis. Igitur inæqualis, tussim excitat, æqualis vero, si moderata est, spirationis concinnitatem variat. ac si vehemens, idque vincente calore, frigidi aeris, atque potionis, cupiditatem inducit, ac tractu temporis finitur in febrim, per frigidam autem intemperiem, contraria evenire solent. quippe si modum servauerit, calidi aeris, ac calidæ potionis desiderium excitat, si vero modum excedit, replet viscus ipsum fluctationibus. ¶ Ceterum de ea tussis specie, qua sanguis ex ipso reijcitur, vel exoso, vel rupto vase aliquo, vel ore alicuius venæ patefacto, antea ubi de sanguinis spatio mentionem fecimus, iam dictum est. atque nunc quoque pauca quedam dicemus. Porro ruptiones in ipso deprehendes, tum ex multæ sanguinis fluctatione, tum ex magna, notabilique aliqua causa quæ præcessit, si subito advenierit. Voco autem præcedentes causas, ut quum aliquis ex alto, vel

z. ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

in ludo, vel certamine ceciderit, aut quum alter super alterum cadit, aut vbi ex inanimatis corporibus aliquod graue, vt vel lapis, vel lignum, thoracem læsit. Nonnullis ira cum exclamatione præcessit. Quinetiam citharædis tragædisq; certantibus, aut acuta vehementiq; voce clamantibus, vasa interdum dirumpuntur. maxime vbi non præmissa pulmonis præcedentes exclamationes lenitione, violenter clamare conantur. Vt enim luctatoribus, si certamen aggrediatur, musculis prius, neque calefactis, neq; per frictiones, aut moderatas motiones, explanatis, partes quædam rumpuntur, atque conuelluntur, ita etiam pulmone accidere solet. Hunc, quia frictionibus ad vehementes motiones præparare non licet, per exclamationes, quæ frictionibus præportione respondēt, id efficere studemus. Insup nulla manifesta extrinsecus adueniente causa, vt in

cæteris corporis particulis, ita in pulmone quoque vas aliquod ob sanguinis abundantiam dirumpi potest, quum videlicet extensioni resistit, aut ob frigora a vicinis partibus contractum, aut ob innatam intemperiem. Ita Hippocrates venas (inquit) frangit aqua frigida. atqui ipsa per se eruptiones non facit, sed quia venarum tunicas frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddens, ut rumpantur paratiores efficit. Rruptionis vero causa est, aut vehemens motus, aut humorum abundantia, qui vel per se vel una cum crudo & frigido & flatuoso spiritu, venas extendunt. Venarum fractionis ab huiusmodi haud obscurum indicium præbet, subita plurimi cruoris vacuatio. ¶ Quum vero venarum ora aperiuntur, non frigide, sed e contrario, calidae dispositiones præcedunt. veluti ubi multis, eisdemque calidis balneis, homo utitur, atque terram inhabitat calidam, fueritque anni tempus eius

z. iiij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

modi, similiter alimēta quoq; , &
 potiones. ¶ At quę eroso vase alia
 quo affitum accidunt sanguinis ex-
 uacuationes, eas p̄cedere solent
 exigua sputa, atq; acres ī pulmō-
 nem a capite fluctiones. Nonnun-
 quā vero & pulmōis aliqua pars,
 aut ramentum simul efferri vide-
 tur, vt neminem latere possit, ad
 pulmonem hunc effectum perti-
 nere. ¶ Orto in aspera arteria vlc-
 cere, prāter hoc quod sputū pur-
 rulentum apparet, dolorem quoq;
 que in loco affecto laborans senti-
 re consuevit, ipsum vero per ea q̄
 sc̄reātur, quia exigua sunt, ab vlc-
 cere quod in pulmone natum est,
 discerni potest. quippe ab vlcere
 bus pulmonis, plurimū sputi reñ-
 citur. Atq; vt ex pulmōe educ̄ta
 particula, visceris ipsius vlcera-
 tionem significat, ita ex gutture
 videmus interdum corpusculum
 aliqd̄ a ligula (Græci glottida vo-
 cant) per vlcerationē excreari. Id
 vero non solū hoc indicio depres-

henditur, verum etiam ex eo, quod
 in ulcerato loco, doloris sensu, la-
 borans infestatur. veluti de aspe-
 ra arteria dictum iam est. Etenim
 pulmonis ulcera, dolor non comi-
 tatur. ea vero quae in his sedibus
 oriuntur, dolorem quidem indu-
 cunt, sed non vehementem, ut si
 alicui suapte natura hebes fuerit
 sensus, ipsum plane non percipiat.
 ¶ Igitur per saepe vidimus eos quos
 iam supra proposuimus affectus,
 & qui pulmōi, & spacio thoracis,
 & asperae arteriae, & gutturi ac-
 cidere possunt. quippe omnium ho-
 rum, sermonis communitate in-
 ducti, mentionem fecimus. Qui
 vero deinceps dicentur, non ita cre-
 cro nobis apparuerunt. ¶ Quod idem
 humorem repente expuit, liquide-
 bili in colore perquam similem,
 medium videlicet inter flauum ac
 pallidum, ac nulla acredine infe-
 ctum, atque ita quotidie ma-
 gnā eius quantitatem expuit.
 deinde leui suborta febricula,
 z. iiij.

GAL. DE LOCIS. AFFECT

tabescere incepit, adeo vt purus
lenta screaret. Postea tractu tem
poris, quatuor videlicet mēsum,
exiguū cum pure cruorem res
iecit, atque sic aucta febre, magis
consume batur, ac iterū, atq; ite
rum plus expuebat, adeo vt mas
gnam sputi quantitatē redderet,
quocirca magis increfcēte febre,
ac resolutis viribus, eorum qui ta
be marcescunt exemplo mortem
obñt. ¶ Deinde alium vidi eodem
fere modo sex mensibus, ac alium
quoq; diutius laborantem. ¶ Igit
qui primus nobis occurrit, initio
quidem nihil mali habere, sed tā
dem pessime affici visus est. Altes
rum vero quū conspiceremus, ei
statim ab initio cognito malo, p
sentimedicamento succurrere tē
tauimus. Ac multo etiam magis
tertio. At quāuis multo negotio
vtrunq; liberare conaremur, nis
hilominus neq; horum vllus, ne
que alius post eos, seruari potuit.
quū enim morti iam proximi es

sent, pulmōis ipsius putres quas-
dam partes expuebāt. Proinde fa-
cile cognoui, haud abſimili eos aſ-
fectu laborare, qualē in externis
partibus videre ſolemus, quum a
putrefaciente quoqiā humore in-
ficiuntur. verū has & abſcindere
& vrere poſſumus. pulmōni ve-
ro horum auxiliorum neutrū ad-
hibere licet. Quapropter omnes
perire neceſſe eſt. At vero poſ-
tremum quum viderem, ad vi-
ſceris fortem exiccationem, ſoli-
cito me animo conuerti, & quidē
odoribus atq; potionibus ad id ef-
ficacibus. Proinde medicamentū
quod hedychroum vocāt, inter-
diu naribus ipſius iugiter adhibe-
re iuſſi. ad ſomnum vero ſeſe cō-
uertenti praeſcripſi, vt nariū for-
amina ex aliquo precioſorū vna-
guentorū illinerentur qualia vi-
delicet Romæ praeſeparari ſolent,
vocāt vero ea & foliata & ſpica-
ta. Atq; dedi in potu medicamē-
ta, mithridaticam vocatā cōpo-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sitionem, ambrosiam, athanasiam,
theriacam. Itaque perpetuo anno sic
educatus, tandem similiter ut res-
liqui tabidi, vitam finiuit. quam
fortasse, ob iam dictam educatio-
nem, longiori tempore protraxerat.
¶ Præterea alium huiusmodi affe-
ctum in pulmone notauit. Quidam
diuturna tussi vexatus, & exigua
um lentumque pus expuens, frustum
quoddam paruo grandinis grano
haud ab simile excreauit, ac defe-
rens illud mihi ostendit, atque rur-
sus non ita multo post, aliud quo-
que attulit. vnde conieci, lentum
illum humorem, quem antea ex-
puere solebat, ad huiusmodi sub-
stantiam peruenisse, quam obrem
medicamentum ei in potu dedi, quod
asthmaticis auxiliatur. atque ita fa-
ctum est, ut minorem expueret
grandinem, atque longiori quam antea
intervallo. neque pluribus deinceps
annis adeo mitigari potuit af-
fectus, quin tandem more retur. Cæ-
terum grandines ipsæ, magna ex

parte crui magnitudinem æquas
bant, quāuis interdū maiores, in
terdum minores esse viderentur.
¶ Atq; alios quoq; similiter quidē
spuere, sed nihilominus in multos
annos vitam extendere vidimus.
Quorum alij aliam ob causā, alij
vero ob spiritalium instrumēto
rum affectum, mortui sunt, quā
uis nihil cruoris excrearent. ¶ Ea
vero quæ Antipatro medico ac
ciderunt, nemo est qui nesciat. vt
pote qui medicam artem publice
apud Romāos professus est. Age
bat hic ætatem sexaginta quidē
annis minorem, sed quinquaginta
iam annos excefferat. Is corre
ptus aliquando febre quadā ephes
mera, idq; ab euidenti causā, de
clinantē iam febre, vt quid sibi
facto opus esset intellegeret, pal
sum ipse suum tangere aggressus
est. Quum igitur omne in æquas
litatis genus, in arteriarum mos
tione inueniret, in primis qui
dem territus est. deinde ve

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ro quū sese non febrire, plane sen-
tiret, illico balneum subñt. quippe
laboribus, ac vigilñs corpus fati-
gauerat. Atque tenui quoque vi-
ctu, donec diem tertium præteris-
set, usus est. quo quum nulla ap-
pareret febris, q̄tidie ad solita ne-
gotia p̄tractāda prodñt, atque ar-
teriam vsque in extrema sui bras-
chñ p̄te tāgēs, admiratus est, per-
seuerantem in pulsibus inæqualis-
tatē. Occurrens itaque mihi, extē-
dit manum ridens, iussitque pulsū
tangere. At ego subridens, quid
inquam portendit, hoc quod pro-
ponis ænigma? Ille iterum ridēs,
obnixē orauit, vt tangerem. Igi-
tur inter tangendum, omnige-
nam in pulsu inueni inæqualitatē,
non solum in multarum pulsatio-
num cumulo, quam systematicen
(id est congregatricem) vocant,
verum etiam in vna arteriæ distri-
ctiōe. proinde miratus quomodo
viueret, quum talem haberet pul-
sum. interrogauī, num difficilis es

fet ei respiratio. illo vero nullā se
 sentire respondente, obseruauies
 quidem an aliquando mutaretur,
 quippe sex mētium spatio assidue
 arteriam tangebam. Quunq̃ue ab
 initio interrogaret, quānam cor-
 poris dispositio mihi videret̃ pos-
 se huiusmodi pulsum efficere, atq̃
 per quem modum, idque citra fe-
 brim? ad eam quæstionem respon-
 di, in commentarijs de pulsibus iā
 declarasse me huiusmodi inæqua-
 litatem. Nanque ob magnarū in
 pulmōe arteriarū āgustia, id eue-
 nire putaui. angustię vero causā
 esse dixi, visceris inflammationem.
 At tibi hanc ob causā id nunc ac-
 cidisse impossibile est, quippe fe-
 bre fuisses affectus. Reliquitur igitur
 vel obstructionem, ex liqui-
 dis, & crassis, & viscosis humoris
 ribus, vel crudi cuiuspiam tubercu-
 culi ortum, in huiusmodi te dispo-
 sitionem induxisse. Tū ille respon-
 dens, oportuisset (inquit) me suspi-
 riosa orthopnœa laborare. At ego

GAL. DE LOCIS AFFECT.

probabilia (inquam) ipsum dicere, sed a veritate aberrare. quippe fieri nonnūquam huiusmodi orthopneam, ob eam quā diximus causam, id vero quum in asperis, non in leuibus arteriis, crassus & lentus humor cumulat. Proinde omnem ei victus rationem, atque medicamenta quoque, haud aliter quam asthmaticis adhibere iussimus. deinde sex (vt dixi) mēsis elapsis, leui quadam spirandi difficultate affectus est, accedente simul cordis palpitatione, imprimis quidem semel, deinde bis, atque ter, postea, quater, ac sæpius quousque aucta semel spirandi difficultate, ad quindecimum vsque diē, post quem difficillima de repente oborta spiratiōe, resolutus statim obijt, aliorū quorūdā exēplo, qui cordis affectibus laborāt, de quibus posthac sermonem faciemus.

¶ GALENI, DE LOCIS AFFECT.
CTIS LIBRI QVARTI
FINIS.

GALENI, DE AFFECTO-
RUM LOCORUM NO-
TITIA.

Liber Quintus.



N praecedenti libro,
quū pulmonis affe-
ctus perstringeres
mus, sermonis com-
munitate, & thora-
cis, & cordis quā-
modo meminimus, pleniorē ve-
ro, absolutioremque de ipsis ser-
monem, in quintum hunc librum
distulimus. Quoniam vero quara-
tus liber, ab accidentibus quę An-
tipatro medico euenerunt, finem
fortitus est, læso imprimis ipsius
pulmonē, deinde ad cor etiā trāse-
cunte affectu, operæpretium me-
facturum arbitror si omnes eius af-
fectus percurram.

De cordis affectibus.
Caput Primum.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Igitur quemadmodū de
cæteris corporis parti/
bus, ita de corde quoq;
definiendum est. quæ/
dam enī ipsi proprie, vel primas/
rio affectio, vel vtcūq; nominare
volueris, superueniunt accidētia,
quædam vero ipso cæteris parti/
bus consentiente. Est vero sermo
in alijs demonstratus libris, vbi iā
declaratum est, innati caloris cor
velut fontē esse, neq; animal mor/
ri omnino posse, ni cor afficiatur.
Quum itaque tres sint principes
partes, quibus gubernatur ani/
mal(Quippe præter cordis prin/
cipatum, ostensum est sensum &
motum, vniuersis corporis par/
tibus, a cerebro suppeditari. Je/
cur vero nutricis facultatis esse
principium) semper mors, ad im/
modicas sequitur cordis intempe/
rantias. simul enim cum ipso o/
mnes vitiātur partes. quū enī(vt
ostēdimus) ipsæ peculiari cordis
temperie, actiones suas persis

ciant, hac pereunte, actiones quoque
 ipsarum perire, necesse est. ac proinde
 inde cerebri quoque, & iecoris.
 Horum vero temperie deperdita,
 non oportet, cordis simul actionem
 perire. Si enim neque sentiendi,
 neque mouendi ab electione facultatem,
 animal habuerit, neque nutritur,
 veluti in latetibus euenit animalibus,
 nihilominus viuere ipsum posse,
 quoad cor manserit illaesum,
 haudquaquam negandum est. Quippe
 videmus sepe numero multis diebus,
 alios neque intelligere, neque sentire,
 nec etiam moueri, at nihilominus viuere.
 quemadmodum ubi quis ob virium
 hebetis imbecillitatem, sine alimento
 permanens, diutius etiam sufficere potest.
 At vero si cor respiratione priuetur,
 hominem illico perire necesse est. ¶ Igitur qui ad
 spirandi functionem nihil conferre
 thoracem putat, non causam reddere
 nequeunt, cur per vehementem apoplexiam,
 superno duntaxat principio
 &

GAL. DE LOCIS AFFECT.

vitiato, laborātes subito moriāf.
At vobis eā inuenire haud difficilis
le est, vtpote quibus efficaciter p
suasum est, musculos qui motiōis
prīcipiū, a neruis in īpos a spinas
li medulla, quę in ceruice est, dela
tis, suscipiūt, thoracem attollere,
priuatis tunc musculis mouēdi fa
cultate, quę ex cerebro ipsis influe
re solebat. Etenim nisi ad spirandi
functionem ambo principia simul
iuncta concurrere oporteret, pos
tuisset aliquis viuere, priuatus in
terdū superno principio. Igit̃ vt
ex his abunde nobis caussa suppe
tit, cur affecto cerebro in vehemē
ti apoplexia, cor quoque lēdat. ita
ex n̄sdem, atque eodē modo, facile
nobis fuerit, caussā inuenire, quā
obrem in apoplexia minore, cata
lepsi, sopore, morbo comitiali, le
thargo animal ita affectum non
pereat. Nāque si diligenter confi
deraueris, inuenies per huiusmodi
affectus, quomodo spirēt laboran
tes. quippe videbis & violentā &

difficilem spirationē, perinde ac si
vinculo quodā cōstrictus, thorax
attolli phibere. Atque huius rei
sufficientē fecimus mentionem, in
libris de musculorum motione.
Nāque similis est hęc quæstio, ei
qua de somno quidam hæsitant,
quippe quum per somnum omnes
musculorū actiones exoluantur,
sola actio quæ ad thoracis muscu-
los pertinet, seruatur. Nunc vero
ea dūtaxat dixisse satis fuerit, quæ
in præsentia pposito nostro cōdu-
cere videbant. Porro qua ratione
homines per somnū spirant, reli-
quis musculis oībus quiescētibus,
eadē quoque ratiōe per minorem
apoplexiam, atque alios ei vicinos
affectus spirare possunt. Vbi vero
vel apoplexia, vel alius quispiam
affectus, adeo vehemēter increue-
rit, vt musculorum thoracis actio
omnino deperdatur, perire simul
respirationem necesse est. Vnde
cordis quoque temperamētū sola-
uitur, quo fit tandem vt etiā ania-
& n.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

malis ipsius necessario sequat̃ in-
teritus. Atque hac ratione, p̃ ve-
hementes superni principij lesio-
nes, animalia perire videmus.
Porro aliter euenit, vbi iecur affe-
ctum est, quod tum ob inediã mo-
riantur. verum per longa tempo-
rum spacia, in huiusmodi affecti-
bus vitã protelare possunt. Atq̃
mori cõtingit nonnullos per aliũ
quoque modũ, vt in syncopa, sto-
machi vitio eueniente, & vehes-
menti dolore, & timore graui, &
voluptate maxima. Etenim quis
bus vitale robur infirmũ est, anis-
mi vero affectiões ob imperitiã
fortes, is animę essentia facile dis-
soluti potest. Atque horum aliqui
ob mœstitiã interierunt, sed nō
illico, vt de superioribus diximus.
At vir magnanimus, neque ob
mœstitiã, neque ob aliam aliquã
animi egritudinem mœstitia for-
torem, vnquam succubuit. vt
pote cuius animæ robur validum
est, affectus vero non adeo vehes-

mentes. ¶ Ceterum proprio quoque affectu cor laborare solet, vel ob simplicem intemperiem, siue inæqualis, siue æqualis ea fuerit, vel inflammationem, vel erysipelas, idque dum fieri incipit. Illico enim antea quam augeatur huiusmodi affectus animal corrumpitur. Atque hos affectus rursus cardiaca syncope sequitur. Quemadmodum quæ stomachi vitio fiunt syncopæ, ad eos affectus, quibus os ventriculi infestatur, sequi solent. Nam id quoque nonnulli stomachum vocauerunt. verum hæ consentiente corde eueniunt. Porro utriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis dispositiones, aut a forti duntaxat intemperie, aut venenoso humore, nonnunquam ab erysipelate, aut inflammatione, aut alio quopiam præter naturam tumore, fieri solent. Igitur exigue quidem cordis intemperantiæ, pulsus arteriarum pro sua quæque natura variant. de quibus in libro de pulsibus iam
& in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

dictum est. Maiores vero per proprias quidem simularium partium intemperies subitam mortem non inducunt. Per eas vero quæ ad instrumentales partes pertinent. subito enecare possunt, sed præcedentibus prius signis quibusdā, quorum unum ab Hippocrate dictum est. Qui sæpe & multum exoluuntur, sine causā manifesta, non repente moriuntur. ¶ Est & alius affectus, palpitatio videlicet cordis, aut per se eueniens, aut cum suspitione quædam, quod in humore cor ipsum moueatur. Neque enim mirum videri debet tantā humoris multitudinem cumulari aliquando in ambiēte cor tunica, ut ipsum, ne attollatur, impedire possit. Quippe in animalibus dissectis vidimus plærūque plurimum humoris, vrinę speciem referentis, in eo, qui ipsum inuoluit, pāniculo cōtineri. Etenim simia quædam, quum emaciari in dies videretur, eam tamen necessarius nostris negotiis impediti

secare in tempore non potuimus,
 post mortem vero, reliquis corpo-
 ris partibus omnibus illæsis, inuē-
 tus est in ambiente cor tunica, tu-
 mor præter naturam, humorem
 in se continens, qualem pustulæ
 (Græci hydatidas vocant) emit-
 tere solent. ¶ Atque in Gallo quos-
 que vidimus cordis tunicam, hu-
 iusmodi tumore, & quidem duro
 affectā, perinde ac si plures crassæ
 membranæ inuolutæ altera alteri
 fuissent. verum in eo nihil humo-
 ris cōtinebatur. vnde verisimilis
 cōiectura elicitur, homines etiam
 similibus posse affectibus infestari.
 ¶ Inflammato autem manifeste
 corde, gladiatores vidimus, haud
 aliter quam qui cardiaca syncopa
 pereunt, obhisse. ¶ Igitur si ad vēs-
 trem cordis vulnus aliquando pe-
 netrauerit, protinus magno cum
 sanguinis fluore, hominem mori
 necesse est. idque præcipue, si sinis-
 tre partis venter fuerit vulnera-
 tus. Si vero nō ad vētrē vsq; ptin-
 & iñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

gat, sed in cordis substantia cōsistat vulnus, ex ita affectis aliqui, non solū ea die qua vulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte, viuere potuerunt, qui oborta deinde inflammatioe extincti sunt.

Atque etiam n̄ quādiu vixerunt, mentis compotes inuēti sunt. vñ euidens sibi testimonium sumere potest, ea secta quę negat, rationale animę vim in corde cōsistere.

¶ Palpitatio autē visceris huius, pluribus integra valetudine degētibz, tum adolescentibus, tū adultis, subito sine alio manifesto accidente euenire visus est. atque oēs eos sanguinis detractio iuuat. Nāque hoc pacto pleriq; perfecte ab hoc accidente liberati sunt. præsertim qui vtebātur, & victu, & medicamētis, quibus esset extenuandi facultas. Horū vero nōnulli, quos rursus huiusmodi accidēs infestabat, simili curatione sospites euaserunt. Ceterū noui quēdā quot ānis, verno tempore huius

modi palpitacionis accidente vexatum, qui quum per tres annos a sanguinis detractiōe se adiutum intellexeret, anno quarto, antea quam accidens ipsum invaderet, sanguinem misit, idque pluribus deinceps annis faciendo, idonea etiam post sanguinis detractiōē medicamenta adhibuit. At nihilo minus hic quoque, ante senectutē morte pręuentus est. Sicut & reliqui omnes, quorum alij quidē per acutas febres, alij vero cū sani dēgerēt, affatim syncopa intercepti, interierunt. Quamuis vnus, vel duo, citra syncopam, alia quadam mortis specie perierint. At vero sic affectorum magna pars, ætatē agebat, quinquaginta quidē ānis inferiorem, sed quę quadraginta annos excederet. Porro panniculus cor ambiens, quomodocunque affectus sit, nisi inflammatione infestetur, inter ignobiles partes reputatur. Quocirca ipsius dispositio, per consensum ad cor trans-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

currit. Cum enim ipse solus affici-
tur, exemplo reliquarum omnium
partium, quæ ad custodiam, & tes-
tamentum ceterarum nobiliorum
factæ sunt, nullum affert periculū.
Ceterū nulla a corde spirandi diffi-
cultas oritur, præter eas quas in
priori libro diximus, cum de dys-
spnoea sermonē haberemus. Etenim
supercalfactum spirationē efficit
magnam, & densam, atque cele-
rem, ac calidum insuper spiritum
reflat. Contra, refrigeratum, exis-
guam reddit spirationē, & rarā.

¶ De thoracis
affectibus.

Caput Secundū.

ATque huic quoque parti,
vel primario affectæ,
vel alijs consentienti,
quemadmodū reliquis
omnibus, affectus quidam superue-
niunt, quos respirationem lædere
necesse est. quippe propriū respi-

rationis organum eam esse, iā demonstratum est. Igitur vbi dolorificis affectibus molestat, exiguam, dēsamque reddit spirationem, veluti in commētationibus de difficultate spirationis ostendimus. Id vero, & vicinis quoque partibus, & hīs quæ simul mouent affectis, euenire solet. Nā diximus añ de spinę affectibus, respirationē interdum lædi, thorace proprio affectu nequaquam laborante, sed vel neruo quopiam a spina procedente, vel spina ipsa affecta.

¶ Eorum vero, qui proprie ad thoracem pertinent, affectuum quidā in ipsius musculis, quidam vero in membrana costas cingente consistunt. Sed neque de cutis, neque de costarum alioquin affectibus, hic pluribus verbis tractare nos quodē proposuimus. Nam in hīs sedes affectuæ, sensibus subiiciuntur. Igitur quū ex musculis, alī spacia intercostalia vocata repleāt, alii vero extrinsecus extēdantur, dolorifici

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cæ externorum musculorum dispositiones, vt vlcera, contusiones, abscessus, erysipelas, inflammatio, haud difficulter a medicis manum adhibentibus discernuntur. At intercostalium musculorum inflammations, eorū maxie, qui in ima parte consistunt (duo enī, vt scitis, sunt huiusmodi musculorū genera) tactu consequi nō possumus. atque n̄ grauiori, quam externi, dolore cruciantur. ac fluctionem, quæ inflammationē induxit, ad interna, per eam quæ costas cingit membranam transmittunt, quā tunc pariter cū ipsis inflāmari necesse est. Veluti rursus, vbi ipsa aliquando primario affectu infestatur, intercostaliū musculorum partes internæ, similiter ei cōsētūt. ¶ Verū exquisita pleuritis fit, vbi cīgēs costas mēbrana, primario affectu laborat proinde dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia puenire potest. ad iugulum quidē, superioribus eius par-

tibus affectis, ad præcordia vero, ubi inferiores afficiuntur. Atque vehemens quoque febris huiusmodi inflammationem sequitur, quia sedes affecta, & parum distat a corde, & cum panniculo inuolvente, ac septo transverso cognationem habet. Cæterum afficiatur ne magis cingens membrana, an musculi ipsam contingentes, a pulsibus inditium petere oportet. Nanque musculi minus, cingens vero membrana magis, & tendit, & indurat arteriam. ¶ Contra in peripneumonia, nulla penitus apparet huiusmodi durties. At effusa in spatium thoracis sanies, in asperas pulmonis arterias recipitur, deinde tossiendo excreatur, qualis sit, qui inflammationem fecit, humor, declarans, an videlicet biliosus, aut melancholicus, aut pituitosus, aut cruentus. Etenim si bilis abundat, pallidum, aut flauum, Si atra bilis, nigrum, Si pituita, spumosum, & candidans, Si sanguis, rubrum sputum

GAL. DE LOCIS AFFECT.

reñcitur. ¶ Quod vero tussiendo
ex thoracis spatio aliquid interdū
expuatur, facile intelliget, is qui
eas dispositiones considerauerit,
quibus ab exterioribus, ad intima
pectoris vlcus penetrare contin-
git, siue id ob vulnus nō conglus-
tinatum eueniat, siue ob magnum
abscessum, vtrinque eruptum, vel
per ide dissectū ac si externas dū-
taxat partes afficeret, facta deinde
seccione, inueniatur cingēs costas
mēbrana, erosa, aut costa ob spha-
celum (id est cariem) excisa, aut
quod excisam a sphacelo (id est ta-
bitudine) costam, aut eo quod me-
dici cingentem membranam, vtz
pote erosam, putrescentēque, ser-
uare illē sā non potuerunt. In om-
nibus iam positis dispositionibus,
si aqua mulla in thoracis spatium
infundatur, atque mox tussiendo
expuatur, laborans ipse aquā mul-
sam esse, ex sapore deprehendet.
Quo pacto autem hoc fieri possit,
atque per quos meatus ipsa in aspe-

ram arteriam ingrediatur, perpēdere debet, is qui errorem illum, quo multi in asperæ arteriæ inuētionē imbuti sunt, effugere voluerit. n̄ nanque ex thoracis spatio, in pulmonem quippiam recipi, impossibile esse, iam sibi persuaferūt, fortasse ita se sentire simulantes, ne videātur de re quapiam dubitare. Cēterum credere oportet huiusmodi fieri transsumptionē, q̄p̄pe quæ per vulnera haud obscure apparet. Deinde quo pacto ea fieri possit, inuestigare, vt quum inueniremus, animo simus quietis ori. Sed inter querendum, quamdiu nihil nos inuenisse putauerimus, ruditatem potius nostram accusare, quam veritatem ipsam negare debemus. Atque videmus etiam cōglutinatiis cruentis vulneribus, in sputo, notas quasdam, fluentis ex vulnere cruoris, ad spaciū quod inter pulmonē est & thoracē. Præterea suppurati, in hoc ipso spacio pus continere, & ipm

GAL. DE LOCIS AFFECT.

expuere haud obscure videntur. Atqui rationi consentaneum est, ut eodem modo tum cruor, tum pus, ex thorace expuatur. Quorū viā inquirens Erasistratus incredibilia quædā scripsit, in eo libro, cui titulus de sanguinis educatione est, sub hac verborum serie. Via autem per quam incedunt, ea quæ ab hīs sedibus reñciuntur, huiusmodi est. Ab ea arteria quæ spinæ adiacet, vasa quædam ad utrūque latus, tam dextrum, quam sinistrū, similiter procedūt. deinde in loca vicina, multiplici diuisione dispersa, tandem adeo euadunt exigua, ut sensum lateant. Quum itaq; sanguis in huiusmodi arterias incidit, nonnunquā per concauā arteriam, ad loca quæ circa pulmonē sunt, atque ad eos nexus per quos pulmo apud spinam arteriæ cōiūgitur, ascendit. quippe ea quæ huc inciderint, hac viā ad pulmonem ascendere solent. Verū quomodo ex pulmone deinde reñciantur,

antea dictū est. In his verbis manifeste declarauit Erasistratus eas arterias quæ a magna arteria ad singula intercostalia loca pcedūt, per ora quæ ad inflammata partē perueniūt, sanguinem suscipere, ipsumq; ad magnam arteriā, quæ a corde orta, per spinam extenditur, referre, atq; ab ipsa rursus, ad ea loca quæ circa pulmonem sunt transitum fieri. Sed neq; modum quo huiusmodi transitus fiat, neque viam explicauit. Verum deinceps scribens, atque per eos nexos, per quos pulmo arteriæ circa spinā adhæret. fit enim (inquit) hac quoque via, eorum quæ inciderunt in pulmonem, ascēsus. At quomodo, & per quæ conceptula id fieri possit, nō ostendit. Proinde manet adhuc eadem quæstio, nihil plane ad ipsam dissoluendam, afferente Erasistrato. quamuis ut in ceteris libris omnibus, ita in hoc ipso, de sanguinis educatione, perspicuū pollicitus fuerit interpreta-

A

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tationē. Quocirca multo magis vitiosum, quispia huiusmodi sermonem reputauerit, vtpote qui ipsi quoque Erasistrato fuerit suspectus. apparet itaque ex industria eū voluisse obscuris vti sermonibus, vt aliquid dixisse videretur, quum nihil diceret. Atque hoc in loco, questionis enarrationem dereliquit. Nā quomodo sanguis ex lateribus quidem ad magnam arteriam perueniat, manifeste declarat. At quomodo rursus ab hac, ad eas sedes, quæ circa pulmonem sunt, vt ipse dicebat, ascendat, haudquā exposuit. Cōstat etiam ex eo quod dixit, loca quæ circa pulmonem sunt, quum dicere pulmonē potuisset, eū haud inuitum sermonis obscuritatē affectasse, id quod postea declarauit dicens, ex pulmone autē quomodo ad educationem ascendat, iam antea dictum est. Perinde enim, ac si in pulmonem, ex magna arteria sanguis, iam delatus sit, quos

modo inde reñciatur, velle nos admonere, videtur. Quod vero de expuitione quę ex pulmōe fit, iam antea dictum est, nō ignoramus, ac perspicuam fuisse narrationem testificamur, optaremusque vt de ea, quę ex magna vena in pulmonem fit, transsumptiōe, similiter dixisset. Quemadmodū cum inquit, per eos quoq; nexus, per quos pulmo, arterię apud spīnam coniungitur fieri circa pulmonem sanguinis reiectionē. Ne hic quidem, quos nexus dicat, declarauit. Etenim si vel ex mēbris, vel fibris consistent, nihilo plus, vt sanguis in magna arteria contentus, in pulmonem deferatur, conferre possūt, quippe necesse est ex arteria oriri vasa quędam, per quę sanguis in pulmonem transferatur. quemadmodū Erasistrati secta hoc ipsum per arteriam pulmoni substratam fieri autumat. Huius enim arterię, extremę partes, & quidem exigue,

A.ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.
ad asperam arteriam transire via
dentur. Atqui ipsa quoque ex ma
gna arteria, antea quā ad spinam
pueniat, initiū sumit. Itaq; duplis
ci quadam ratione, Erasistrato ab
hac arteria auxilium suppeditare
conantur, sectę ipsius professores.
In præsentia quidem, quātum ad
sanguinis ex thorace educationem
pertinet alibi vero ad inflammas
tionis in pulmone generationem.
Nam & hanc obijciunt, eis qui ae
liter sentiūt, vtpote quā ita, vt
Erasistratus docuit, fieri sit impos
sibile. Namq; quū docet quomo
do fiat inflammatio, putat incidē
tem in arterias sanguinem, spiris
tui, qui a corde defertur, obuiū fi
eri, atq; sic ad extremas arteriarū
partes repelli. Nisi vbi vulnera
tæ aliquando quædā arteriæ, va
cuato ex ipsis per vulnus spiritu,
ex ea quæ ad vacuatum spiritum
fit sequela, sanguinem suscipiūt.
Hoc enim pacto nō fieret, inquit,
inflammatio, ne in pulmonis quis

dem arteriis, quippe si aliquando sanguis in eas inciderit, nulli ipsi spiritui obuiare, etenim in solas pulmonis arterias, nullum a corde ferri spiritum contendit, quamvis reliquas arterias omnes, a corde spiritum suscipere fateatur. Verum e contrario, ipsas cordi spiritum suppeditare quem per inspirationem ab asperis leues arteriae suscipiant. Hanc igitur arteriam, quae a maiori arteria spinæ incubenti, in pulmonem fertur, inflammationem in extremis partibus sustinere, atque ut sanguis ex thorace reñciatur, efficere dicit. Sed inflammationis rationem hoc in loco tractare non proposuimus. Ceterum quod ex magna arteria, in pulmonem sanguinis transumptionem fieri dixit, a veritate deuiare videtur. In primis enim sanguinem ex intercostalibus locis, in magnam arteriam transferri impossibile est. quippe a spiritu, qui a corde per magnam arteriam ad haec loca trans-

A. iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mittitur, repulsus, illico reuertetur. Si concesserimus autem hoc ita fieri, ac demus in magnā ipsū arteriam deferri, multo absurdior ex Erasistraticæ sectæ fundamētis sermo euadet. Etenim spiritū, saluantem incursionis impetum a corde in hanc arteriam expressum, in totum deferri corpus, per ortas ab ipso arterias autumat, p̄inde ac si ex vna arteriæ cōstrictione spiritus ad extremas pedū partes peruenire possit, veluti a vehementissimo vento, delatiōis celeritatem fieri putans. Qd̄ vero tanta vehementia, sanguinem in magna arteria contentum, ad quālibet corporis partem nō impellat, impossibile est. Quanq̄ illi ad vnam duntaxat arteriā ipsum compellant. quæ scilicet ratione prædita, ad pulmonem ipsum deferat, tanq̄ mentem haberet, ac intellegeret, qua via quā facillime vacuari possit. Id ipsum vero rursus pugnare videtur cum præ-

senti sermōe, qui sanguinem quā
 celerrime vacuari per asperam
 arteriam concedit. Nam si tam fa-
 cilis est per extremas harum ar-
 teriarum partes transitus, vt in-
 cidens in eas sanguis, tam celeris-
 ter vacuetur, fieri non potest vt
 impactus, inflammationem exci-
 tet, eo quod impingi, & excidere
 inter se sint cōtraria. Id vero mul-
 to maiori admiratione dignū est,
 quod quum Erasistratus quam di-
 ligentissime deinceps de puris va-
 cuatione cōscribat, siue id in pleu-
 riticis, siue in suppuratis cōtineat-
 tur, ipse pugnam hanc, qua vide-
 licet sermones eius, tum nobis, tū
 reliquis hominibus omnibus, in-
 ter se certare videntur, non in-
 tellexerit. Ea facile deprehende-
 tur, si sermonem eius, qui ad ver-
 bum sic se habet, hic subscripseris-
 mus. Atque in his ipsis affectis
 bus, plurimi interdum puris exa-
 cretio fit, caussa, venarum na-
 tura est, quam sic perpendere
 A. iij.

GAL. DE LOCIS. AFFECT.

oportet, magna pars venę ex corde natę, adiacet spinę, ac in eo loco, vbi a vertebri septum transversum nascitur, finē accipit. Ab hac vero, venę quę ad latera extensę sunt, atq; arteriis adiacēt, oriri videntur. Igitur quum vel vlcus, vel abscessus, in his locis evenit, multum puris congregās, id quidem haud facile, ad spaciū quod inter latera & pulmonē est, effundi potest. quod, succingēs latera, mēbrana nervosa est, & fortis ac diuidi cōtumax. proinde coercetur ad vasa, membranę intrinsecus subiecta. Quum itaque tenuis magis, ac imbecillior vena sit quā arteria, hęc vasa prius diuiduntur, quam ea quę circa arterias sunt, atq; per has diuisiones, pus effunditur in venas. Etenim per inferiores sedes pus deñci nō potest, quia ad eas venarum natura non peruenit, sed finē sortiuntur, vt dictū est, circa septi transversum ortum. Quum semper autē

continuæ sedes repleantur, ut per superiores meatus exitum capiat necesse est. Perpendenda igitur est actio, quam pulmo inter respirandum efficit, ac quomodo, tum spiritum tum humores, & attrahit, & expellit. quippe eodem modo pus a lateribus ad pulmonem ascendere solet. Sed quomodo demum a pulmone reijciatur antea dictum est. ¶ In hoc sermone, Quod pus in venas transumptum, non possit ad loca septo transuerso inferiora puenire, recte ab Erasistrato dictum est, utpote vena, quæ octo inferioribus thoracis costis alimentum præbet (non enim omnes alere potest) ad septum transuersum perueniente, neque enim in præsentia contendere velim, an exigua aliqua eius particula inde exiliat. At quomodo huiusmodi pus expuatur, ne principium quidem dicere aggressus est. Similiter nec sectatorum eius quisquam. Neque enim dicere potuerunt alii

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quid a vena ad pulmonem deferri, ea ratione, qua arteriam quādam a magna arteria separatam, ad pulmonem deduci affirmant. etenim arteria, tametsi non manifeste per ipsum diuiditur, ei tamen substerni, atque ad asperam vsque arteriam ramusculos emitte videtur. Verū a magna vena, quæ spinæ incumbit, venam aliquam in pulmonem transire, neq; nos vnquam vidimus, neq; dissectorum quisquam scripsit, ac ne Erasistratus quidē id affirmare ausus est. Quippe iter omnes cōuenit, quod a dextro cordis ventriculo, per vnum duntaxat vas, pulmo sanguinem recipit. Oporteret igitur pus quod a costis, in eam venam, quæ spinæ adiacet, imprimis quidem peruenire ad cor, deinde ad venam quæ ab hoc orta, in pulmonem transit. Postea ex hac in asperas arterias, quæ per ipsum dispersæ sunt, transsumi. Postremo tussi indigere, quæ scia

licet ipsū v̄sq; ad os efferre posset;
Igitur quo pacto puris sāguini
permixti, ab ipso fiat secretio,
tanquam exiguum quidpiam, ac
vulgare, & quod ad vniuersam
ipsius rationē firmandam parum
conducat, præteriens, dicere ne-
glexit. Neque defendi etiam po-
test, quod sanguis in vena, quæ
circa spinam est, cōtentus, ad cor
ipsum referatur. Nam e contra-
rio, vena hæc a dextra cordis aus-
ricula exorta, sanguinem secum
defert, qui omnibus thoracis par-
tibus, quæ circa octo costas cōsi-
stunt, alimentum præbeat. Etenim
superiores quatuor, non ab his, sed
a vena ad iugulum ascendente,
quæ a medio loco, inter cor & iu-
gulum exoritur, nutrimentū suū
recipiunt. Præterea & hoc quoque,
non minus absurdum quam indi-
gnum ad Erasistrati verba sequi-
tur. Nam pus quod a supernis
quatuor thoracis costis, in concas-
uam venam refertur, maxime

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quidem ad eas venas ducetur, quæ
ad ceruicē, & scapulas, & caput,
& manus, imo potius ad vniuersas
animalis partes, perueniunt.
Hæc sunt fere absurda, quæ ad Era-
sistrati scripta sequi videtur. Acces-
cedit ad hæc, quod causam in hac
perpensione penitus non attigit.
dicens enim, non facile pus effun-
ditur in spatium, quod iter costas
est & pulmonem, quia succingēs
costas membrana, neruosa sit, &
fortis atque diuidi contumax, pus
aliquādo in hoc spatium effūdi pos-
se, non negauit. quippe qui vers
bis suis, non facile, addiderit. Des-
buit ergo dicere, id quanquam nō
facile, tamen aliquando fieri. des-
inde viam ostendere, qua suppu-
rati, pus expuere possūt. Vt enim
ex nīs non paucos perire, ita & alios
complures seruari vidimus.
Quorū si quis per singulos dies,
reiectionis puris quantitatem college-
rit, interdum sex, aut octo hemis-
nas, interdum quindecim, atque

interdum plures, totam summam
equare inueniet. Ceterum id quod
quam creberrime dicere consue-
ui, nunc quoque dicam, quod mul-
ti medici, rerum quæ manifeste
videntur, causâ reddere neque-
ntes, eas esse omnino negant.
Quāquam (vt dixi) omnes quot
quot in thorace vulnerati sunt,
iniectam per vulnus aquam muls-
sam, illico expuere solent. Nonnul-
li etiam curato, conglutinatoque
vulnere imprimis quidem diebus
purulenta quædam expuunt, nisi
recte, ac exquisite, vniuersus san-
guis per vulnus (quatiendo vide-
licet hominē, qui sic vulneratus
est) fuerit effusus. At vero mem-
brana costas succingens, & valis-
da est, & nervosa, ac diuidi contu-
max, huic sermoni adde, si velis,
quam obrem humores in spatium
thoracis effusos, hæc quidem non
transmittit, ille vero non recipit.
Atque dic etiam cutem membra-
nis esse multo fortiorē, atque cras-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

florem, vt per fractionū oblesiones, cruentum humorem, quo minus per ipsum penetrando egrediatur, prohibere possit, hunc tamen in nonnullis videmus adeo copiose effundi, vt totas etiam fascias possit irrigare. Quod quum ita fieri videamus, idem haud absurde per reliquas quoque membranas fieri fatendum est. Atque satius fuisset Erasistratum de hac re non dubitare, sed id potius abundanter intellegere, quomodo humor inter thoracem & pulmonē contentus, in asperas pulmonis arterias recipiatur, ad leues vero arterias, atque ad venas, peruenire non possit. Nam & ipso Erasistrato autore, tria hęc vasa simul extenduntur, atque simul diuisa, terminantur suo extremo quodlibet ore, in adiacentem pulmoni membranam. Cum ergo tria hęc ora inter se proxima sint, cur in vnū duntaxat fiat transumptio, quærere debuit Erasistratus. Nam lon

ge prestantius erat, ea quæ fiunt, quomodo fiant querere, quã quod fiant negare. Quamquam neque dubia, neque inuētū difficilis mihi videtur, eorum quæ in thorace continentur, in pulmonem receptio, quæ quidem in asperæ arteriæ partibus extremis fieri potest, quippe quæ non adeo angustæ sunt, vt leuarum arteriarum atque venarum partes extremæ. Atque quod magna ex parte, asperarum arteriarum essentia, cartilago est, quæ cōcidere, atque cōcludi omnifariam nō potest, quod etiam earum, quam duorum vasorum reliquorum, ora, multo sūt ampliora. Cum igitur ipsorum circa pulmonem diuisiones numero sint æquales, rationi consentaneum est, asperæ arteriæ veluti ramos, reliquorū duorū generū partes, proportionē superare. Id vero manifeste apparet p̄ visceris ipsius dissectionē, nā vicina quęq; vasa eandem inter se seruant in mas

GAL. DE LOCIS AFFECT.

gnitudinis excessu proportionē,
quā ab initio maxime eorum par-
tes habere conspiciūtur. Hęc sūt
quę dicere debuit Erasistratus. ac
deinceps, vtrum aspirationis, an
quietis tempore, pus ex thoracis
spacio in pulmonē recipiatur, ex-
plicare, ac deinde quum id, neque
per aspirationem, neq; per quietē
fieri docuisset, ostendere, ipsū re-
spirationis tempore recipi. id qđ
facillimū erat demonstrare, ei cui
prius persuasum esset, respiratio-
nis actionem ad thoracem perti-
nere, pulmone nullam propriam
habente motionem. quippe qui p-
consequentiam dilatato thorace,
pariter attollitur. eo vero cōstric-
to, ipse, spongiarum exemplo,
quas manibus exprimimus, in se-
se residere solet. Etēnim hoc pa-
cto per magna vulnera, fibra
ipsius per vulnus procidere vi-
detur. verum citra vulnus, tho-
rax vehementer constrictus, hu-
morem qui in eo spacio, quod

inter ipsum & pulmonem est, cō-
 tinetur, in asperas ipsius arterias
 comprimendo cogit. Nec credas
 velim, huic orationi, vehemēter,
 frustra fuisse insertum. Nisi enim
 vehementer admodū, thorax pul-
 monem ex omni parte cōprimat,
 humor in asperarum arteriarum
 ora recipi nō poterit. Quāobrem
 natura, quo robustior fieret expul-
 sio, tussi vocata, donauit anima-
 lia. Quę cū naturale sit accidens,
 & sternutamentum, & singultū,
 & nauseam, similitudine quadam
 imitat, de quibus in libro de causis
 accidētū satis dictū est. Verū
 quia viribus opus est, quibus hu-
 iusmodi accidēs naturale excite-
 t, cōtingit creberrime p suppuratos
 affectus, mori laborantes, prostras-
 tis antea viribus. quod a validissis-
 ma thoracis constrictione, eadēq;
 celerrima, tussis excitatur. Atqui
 vires imbecillę, neque valide ne-
 que celeriter agere possunt. Ergo
 de expuitione quę ex spacio thora-

B

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cis procedit, satis fuerit hæc dixisse. redeamus igitur rursus ad eū quē ab initio p̄posuimus sermonem. Sane quē in succingente costas membrana, ac musculis illi cōtinuis, fiunt inflammatiōes, morbum quem lateralē vocāt efficere solent. Huius accidentia inseparabilia sunt, febris acuta, dolor, perinde ac si locus vel intendať, vel pungatur, spiratio frequēs & exigua. pulsus paruus, arteriā & duram, & quodam modo tensam indicās, tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nonnunquā vero sine his. Has incoctas pleuritides nominant, quę vel celeriter hominem rapiunt, vel longo temporis spacio finiuntur. Ac dolor modo ad iugulum, modo ad præcordia peruenire videtur. Sunt præterea alij laterum cū febre dolores, per quos spirationem exiguam reddi necesse est, sed nullum reddit sputum, vt in ea re nihil a pleuritide sine sputo constante, differre vis

deatur. Verum hi facile ab illis discerni possunt. In his enim nulla omnino tussis est, illi vero qui sine sputo pleuritide laborant, sicca tussi molestantur. deinde quod neque tensionem, neque duriciem ullam, refert pulsus. postremo quod non æque acuta febris laborant, neque adeo difficulter spirant. Sunt etiam nonnulli, qui presso inflammato loco extrinsecus dolere sese, fatentur. Etenim non per sputum non purgantur quia ab initio nihil eius succi, qui inflammationem excitauit, ad thoracis spacium peruenire solet. At concocta inflammatione, nisi prius discutatur, ad cutem usque attollitur, atque inciditur.

¶ De septi transversa
affectibus.

Caput tertium.

T Erminum quo thoracis pars inferior finitur, antiqui phrenas (id est mentem) appellauerunt. siue simpliciter id ipsis in animum venerit,

B. n.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

siue(vt aliqui putant) quia eo in/flammatione affecto, mens quoq;
lædatur. Verum qui Platōis seculō
successerunt, septum ipsum no/
minauerunt, quāuis Plato ipse si/
militer vt reliqui veteres, phre/
nas vocitaret, putās ipsum in ani/
malibus vtilitatis gratia fuisse cre/
atum, vtpote quod animi irascen/
tiam, in corde contentā, a cupidis/
tate, cuius sedes in iecinore eē cre/
ditur, distinguit. proinde medici
neglecto prisco nomīe, septū ipm
appellare consueuerunt. Id quod
in dorsi quoq; spina eos fecisse cō/
stat. quippe huic quoque ob ppriā
essentiam medullę nomē est, quē
admodū instrumentū cuius nunc
mentionē fecimus, phrenes nūcu/
pantur. Verum quo clarior esset
dinotio, illi dorsalis, quemadmo/
dum & cervicalis, & spinalis, atq;
lumbaris, cognomēta addiderūt.
Postea fere oēs simpliciter dorsa/
lem appellare consueuerūt. Sic in
prēsentī quoque proposito, phre-

num nomie reiecto, diaphragma
(id est septū transuersum) noīare
gis placuit. Aristoteles autē hanc
animalis particulam succincturā
appellat, nescius ipsam magnę ac
perquā necessarię actioni, in ani-
malibus esse deputatā, quippe quę
spirationis instrumētum est. nec
mirum est si spirationem, quū affi-
citur, lēdat, vt quia vel spinę vel
neruis ab ea exortis, cōsentit, vte-
luti supra de spirandi difficultate
dictum est. Vbi etiam proprios ip-
sius affectus percurrimus. At vte-
ro nunc eos affectus, qui superno
consentiente principio, ei adue-
niunt, perstringamus.

¶ Igitur antea quadam aliquis de-
liraret, frequentem ac exiguū, infe-
stante vero iam delirio, multa va-
rietate inæqualem spiritum reda-
dit. veluti de spirandi difficultate
iam dictum est. Atque delirare
etiam solent nonnulli, ob vitium
quod in ore ventriculi cōsistit, &
febris ardētibus, & pleuritide,

B in

GAL. DE LOCIS AFFECT.
& peripneumonia. q̄ vero ob septi
transuersi affectum accidunt delir
ia, non multum distant a phreni
tide. quippe per cæterarum par
tium affectus, atque per febres ar
dētes deliriū mitigari solet, quo
ties morbus declinare videtur. At
phrenitidis propria, præcipuaque
nota est, ne in declinatiōe quidem
febrium, deliriū quiescere. Neque
enim per consensum dūtaxat, sub
huiusmodi morbo cerebrum affi
citur, sed propria primariaque af
fectione laborat, atq; proinde pau
latim cōquiescit hic affectus. Vez
luti etiam neque subito, neq; affa
tim, vt in ijs partibus, quarū nup
mentionem feci, accidere consue
uit. Quippe anteaquā inualescat,
præcedunt ipsum accidentia non
pauca. Ea q; omnia phrenitica in
dicia vocantur, quæ ab ijs quos
q; qui me præcesserunt, conscri
pta sunt. Nam interdum vigilias
præcedere, siue etiam somnū, ma
nifestis imaginibus turbatum, ita

vt & clament nōnulli, & exiliāt,
videre est. Interdum vero adeo
agrestis accedit obliuio, vt labo-
rantes aliqui, quum matellam pes-
tiuissent, meire tamen neglexe-
rint. Aut quum lotiū emisissent,
matellam ipsam p̄dere, haud quas-
quam meminerint. Interdum ma-
iori cum tumultu, aut temeritate
respondēt, præsertim vbi aliquis
antea fuerit mansuetus. Atque n̄
omnes exiguo vtuntur potu. Spi-
ratio ipsis rara est, & magna.
Nonnunquam occiput dolor infe-
stat. Quum vero iam p̄xime ad
phrenitidem accedunt, oculi eis
vehementer euadūt squalidi, aut
ex altero ipsorum acris lachryma
effunditur, ac deīde lippitudo in-
natat, & venæ ipsorum sanguine
• plenæ videntur, & sanguis stil-
lat e naribus. Quo tempore nihil
quod exacte ad prudentiam perti-
neat, respondent. & floccos auel-
lunt, & festucas carpunt, atq; aris
B ūñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

diores febrī, cui non ita magnæ in alterutram partē mutationes accedunt, torquentur. quemadmodum in alijs quibusdā febribus videre est, quæ per vigorem quidē grauissime infestant, inclinationes vero habent mitiores. Ad hæc lingua quoque salebrosa est, nonnulli interdum audiendo falli videtur, ac interdū mœsti iacent, vix quicquam respondentes, atque dispositione dolorifica affecti, vel acrius p̄mente aliquo, eam haudquaquā sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectum, paulatim phrenitis euenire solet. Ab aliarum vero partium nulla perpetuum deliriū procedit, dempto solo septo transuerso, cuius vitio excitatum delirium, parum a continuo distat, adeo vt veteres putauerint, hac parte inflammatione affecta, homines phreniticos euadere, atque ob eandem suspicionem, phrenas (id est mentem) eam appellauerunt, tanquam sapienti parti conferat

quippiam . Verum , deliriū quod
huiusmodi vitio accidit, a phreni
tide distinguitur, & ex oculorum
accidentibus, & sanguinis a naris
bus stillis, atque spiratiōis specie.
quippe phreniticorū spiratio ma
gna est, & ex lōgis semper inter
uallis. Contra, vbi a septo deliriū
oritur, inēqualis, vt modo exigua
sit, atque frequens, modo magna,
& angustiosa . Nam incipiēte se
pti transuersi in flāmatione, prius
quam delirent laborātes, exiguū,
ac frequentem, reddūt spiritum,
cōtra, ſi qui ob affectum cerebrū
delirant , magna prodit, raraque
spiratio. Atque, vt summam di
cam , veluti eorum accidentium,
quæ phrenitidem antecedere dis
ximus, aut nullum apparet, aut si
• apparuerit aliquod, id per exiguū
est, in his quibus septum trāsuere
sum inflammatione laborare inci
pit , ita rursus intendi præcordia,
septi transuersi, illico ab initio afe
fecti, propriū indicium est, id quod

GAL. DE LOCIS AFFECT.

affecto cerebro posterius accidit,
nō incipiēte videlicet affectu, sed
quum paratus iam fuerit. Atque
calor quoque circa caput & faciē
vehemētior est q̄s, qui cō cerebri
vitū delirant. Reliqui septi trās-
uersi affectus, siue primarij sint,
siue per consensum illi eueniant,
partim quidē ab hoc nostro ppos-
ito sunt alieni. nempe qui mani-
feste apparent, vtsunt, tum alia
accidentia, tum abscessus in ipso
exorti, partim vero iam antea dis-
cti sunt.

De gulę affectibus.

Caput quartum.

EAm partem quę inter
fauces & os ventriculi
media est, quā veteres
œsophagon nomīabāt,
qui post Aristotelis seculum scri-
pserūt, stomachon, nos gulam di-
cimus, appellare consueuerunt.
Quamuis Aristoteles prisco sem-

per vocabulo hanc animalis partis
culam nominauerit. ¶ Eius duplex
est usus. Vnus quod veluti via ē,
eorum quæ deuorantur. Alter quod
circa & trāque viam, actionē quā-
dam efficere videtur, tum deuorā-
do ea quæ ab ore ad ventriculum
deferuntur, tum reſciendo ea quæ
ab hoc ad os eleuantur. Sane gemi-
næ sunt ei partes quas dissectores
tunicas appellāt. altera ad cibi po-
tusque deglutitionem vtitur. al-
tera ad eam, quæ vomēdo fit, ex-
pulsionem. Proinde rationi cōsen-
taneum est, duo esse affectuum ip-
sius genera. vnum quod veluti viæ,
tum ingestorum, tum vomitione
reiectionum, ei accidit. alterū ve-
ro, quod ei veluti vtriusque actio-
nis instrumento, euenire potest.

- Constat vero, duorum iam memo-
ratorum vsuum, alterum quidem
semp esse necessariū, alterū vero
propter occasiones quasdam. Igitur
eorum accidentiū quæ ipm, tanq̃
viā infestāt, genus vnū est, quū

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ob tumorem aliquem præter naturam angustior fit ipsius meatus, Alterum quum proprias actiones perficere nequit. Porro iam antea, ubi de angina quæ ad vertebrarum in ceruice luxationem sequitur, sermo habebatur, diximus, quod acquisita ei angustia accidit, ubi sub vertebris ipsis comprimitur, cuius rei nunc quoque admonitum te esse velim. Nec obliuioni tradas tumores eorum musculorum qui gulam ipsam inuoluunt, sed quos modo nascantur non, in vniuersum in libro de tumoribus præter naturam dictum iam est. Cæterum in his omnibus commune est. quod tanta sæpenumero inter deuorandum infestat angustia, vt potus ad nares remittatur. Quum vero inflammatione affecta gula, familiari propriaque angustia, non a vicinis partibus acquisita, torqueatur, tum grauissimus inter deglutendum dolor infestat, accedente quoque perquam difficili transitu.

præsertim si supinus, qui laborat, iacens transglutire quippiam conetur. quocirca sic affecti habitum transformare, atque erigere sese student, ex accidente ipso edocti, faciliorem ita fieri deglutionem, adeo ut haud parum habitus hic, ad ciborum in declives partes delationem, conferre videatur. utpote quæ possit sæpenumero vel sola fieri, si prius ex ore usque ad gulæ initiū facta fuerit expressio. A supino decubitu nullum speratur auxilium, quo facilius ad infernas partes ferantur alimēta, quippe quod tum a sola gulæ actione deuorandi munus perfici potest. Neque vero latet vos, quod partium inflammatione affectarum nulla, non dolet, quum suo munere fungitur.

- Contra ubi quieuerit, dolor mitigari solet. Ergo quum gula sentiendi facultate sit prædita, ipsam quoque veluti auctarium inditiū, in usum euocare oportet, quo plenius huius particulæ affectus dinoscatur.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cantur. Id quod a laborante, inter
respondendum deprehendere li-
cet, nisi adeo fuerit faxeus, vt qd
ipsum lædat narrare non possit.
Contra, si id quiverit, gulæ sensus
maximum præstabit corollari-
um, ad affectuum ipsius dinotio-
nem. Etenim imbecillitatem nō
nunquam percipere se dicunt la-
borantes, vt longo vix temporis
spatio per gulā transeant, ea quæ
ingesta sunt. quæ aliquādo ad pris-
mum impetum facile descendūt,
deinde rursus arcentur, vt vides-
antur impacta, demum per residu-
um spacium facile labuntur. Hos
rum primum actionis infirmitas
tem, alterum particulæ cuiuspiam
angustiam indicat. Verum vtris-
usque differentias, ex reliquis ac-
cidentibus intellegere licet. ¶ Nā
ob imbecillitatem id euenire con-
ſciendum est, quum a sola intem-
perie, citra tumorem præter na-
turam, ingestorum in trā situ tæ-
ditas, & æqualis est, & sine dolo-

re, & apud supinum decubitum, augetur. erecta vero ceruice mitigatur, neque ullus accedit angustiae sensus. ¶ Vbi vero tumor aliquis accesserit, is vnam quampiam particulam angustiores ceteris efficiet, atque per eam tardior erit transitus.

¶ Quod si tumor inflammationis fuerit particeps, accedet ei pariter & dolor, & sitis, & multus calor sensus, & febris non admodum ardens, quæ etiam siti proportionem haudquaquam respondet. Si vero tumor aliquis ex non ita calidis fuerit, tamen circa febrim, & calorem, & sitim, deglutitionis inæqualitas eueniet, retentis in parte quapiam alimentis, præsertim si maiusculum, atque solidum fuerit, id quod deuorat. acceditque dolor aliquis sed exiguus. Ergo quum aliquando huiusmodi accidētia longo tēporis tractu nobis apparuissēt accedēte nōnūq̃ ephemera febre, nonnunq̃ etiā horro-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Re, cōiecturam faceremus abscessum incoctum esse in gula. Accie-
dit procedente tempore, vt labo-
rans eruptionis sensum pciperet,
ac subinde pus euomeret, idq; nō
solum eodem, sed postero quoque
die, atque itidē tertio, deinde suc-
cedebant ei deinceps, omnia vlce-
ratę gulę indicia. q̄ppe siue acria,
siue acida, siue salsa, siue acerba de-
uoraret, aut vellicationē, aut con-
strictionem sentiebat, dolebatque
hac in parte, vel nihil deglutien-
do, sed moderatius. Vchementios-
rem vero dolorem excitabant ea,
quibus mordendi, aut cōstringen-
di vis erat. Hic ergo longo tēpo-
ris spacio vix seruatus est, fretus
scilicet etatis beneficio. etenī natu-
maiores, fere omnes perierunt.
Sane quotquot dolorificū quēpiā
in gula habēt affectum, omnes ex
dorsū quoque dolore ipsum signifi-
cantly declarant. cuius rei caussa
haud obscura est, q̄s qui gulā spia-
næ incūbentē viderūt. Quinetiā

constat, quod ex gulę vasis, haud
 secus q̃ ex reliquis omnibus, san-
 guis vomendo reñci potest. Id si
 ob ruptũ vas acciderit, dolor ibi
 percipitur, ac locum, vbi aliquid
 ruptum est, indicat. Haud secus
 vbi vena fuerit erosa, siue dia-
 brosin, siue anabrosin, siue aliter
 quomodolibet nominare volue-
 ris, locus affectus deprehendi pos-
 test. Aperto autem vasis alicuius
 ore, nullus omnino dolor sētitur.
 atque hac re a reliquis distingui-
 tur, ac præterea quod neq̃ ictus,
 neque casus hanc profusionem præ-
 cessit, id quod rupto vase videre
 est. Quanq̃ ob solā sanguinis ple-
 nitudinem, nulla adueniente ex-
 trinsecus causa, vasa interdũ dia-
 rumpi possunt. At venę erosio-
 nē, vlcus præcedere solet. Fit autē
 vlcus, vel rupto vase, vel vitio-
 rum humorum influētia, id qđ
 in cute quoque sæpenumero ac-
 cidere videmus.

¶ De oris vētriculi affectibus. C. 5.

C

GAL. DE LOCIS AFFECT.

VEteres os vetriculi cor
nominabāt, ab accidē
tibus quæ inducere viz
detur, hanc (vt aiunt)
deducentes appellationem. Neq;
enim syncopam duntaxat, veluti
cor, sed etiam cōuulsiones, sopor
es, morbum comitialē, melāchos
liam, inferre solet. quinetiā acci
dentia, qualia per suffusiones infes
sant, vt iam antea, quū de oculis
loqueremur, dictū est. Atq; om
nes q̄ affectus, consentiētibus ei cē
teris partibus, in ipso fieri dicun
tur. Nam ad propriā eius rationē
pertinet, & appetentiam prohibe
re, & natātes cibos corrumpere,
quēadmodū id haudquāq; fieri
solet, quum cibi in vetriculi fū
do firmantur, præcipue si suapte
natura non ita facile corrumpant
tur. Igitur exacte animum aduer
tere oportet, vt discernantur af
fectus, qui ipsius occasione p̄ cons
sensū eueniūt ab iis qui huiusmodi
particulis, quarū actionibus no

cere consuevit os vetriculi (quod
vt veteres oēs cor appellabāt, ita
nra tēpestate stomachus vocat)
primario accidere censentur. Sed
hac iter se discernere facile pote-
rit is, q̄ assidua exercitatiōe circa
notiōes versatus, ea q̄ p̄cesserūt,
diligēter cōsiderauerit. Sūt enī p̄-
prietates q̄dā ineffabiles, vna cū
accidētibz q̄ enarrari possunt, e-
ueniētes, q̄bus certiores stabili-
resq̄ euadūt affectarū p̄tiū notæ.
sed has vnusq̄sq̄ p̄ se inuenire po-
terit. Quæ vero tāq̄ fundamēta
vniuersæ dinotionis existūt, atq̄
ex q̄bus studiosissimi quiq̄, ineffa-
biles accidēti ūp̄prietates edis-
cūt deiceps explicare aggredior
Igit̄ grāmaticus q̄dā iuuenis, q̄ties
vel nimis vehemēter doceret, aut
cogitaret aut inediā sustineret, aut
irāsceret, cōitiali morbo corripis-
ebat. p̄p̄edi eq̄ dē i hoc os vetricu-
li, vtpote q̄d facile sc̄tiret affectū
esse. ac deinde p̄ consensū & to ū
cerebrū, & corpus vniuersū, cōs-
C. n.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

uulsione concuti. cui probam cō-
coctionem accurate procurare, ac
tertia, vel quarta hora panem op-
time præparatum exhibere iuss-
i. atque hunc quidem solū, si nō
sitiret. si vero siti cruciaretur, ex
vino madidum, & quidem albo,
atq; modice stringente. Nam hu-
iusmodi vinum, vt ventriculum
robustum efficit, ita haudquaquā
tētat caput, id quod facere solēt,
ea quæ vehemētes vires obtinēt.
Itaq; quum hac victus ratione vs-
tens, non vt ante afficeretur, ex-
actam iam notitiam me habere ar-
bitratus sum, eorum quæ prius so-
la coniectura consequebar. Itaque
quolibet anno bis, aut etiam ter,
medicamentum amarum ex aloē
ei exhibui. Purgatis deinde ex vs-
niuerso ventre excrementis, res-
umptisq; ad proprias functiones
viribus, vir ille viginti annis, quis
bus postea superstes permanfit, in-
tegra, inculpataq; valetudine, vi-
tam exegit. Quod si aliquādo ob-

ingruentia negocia diutius a cibo
 abstinere cogeretur, exigua qua/
 dam conuulsione vexabatur. ¶ Iam
 alios quoque vidimus, conuulsione
 per morbum comitalem, ob oris
 stomachi vitium correptos, quum
 aut non probe concoxissent, aut vis
 ni, & quidem meracioris, plurimum
 potassent, aut ubi venerimmo
 dice operam dedissent. ¶ Quin
 etiam per febres, quosdam conspe
 ximus derepente conuulsione pre
 hendi, nullo (quod eam praesagis
 ret) precedente indicio, qui bilio
 so superueniente vomitu, protinus
 ab omni noxa liberati fuerunt. at/
 que hoc modo affectorum nonnulli,
 res quasdam fuscas vomendo re/
 iecerunt, alij humorem, porri suc
 co similem, quidam etiam vitios
 sis grauati cibis, soporosi permā/
 serunt, donec ea quae os ventriculi
 opprimebant, omnia euomissent.
 Atqui horum accidentium, vix vl
 lum crederes, a ventriculi ore pe
 cedere, quemadmodum ne syncos
 C.ij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

pas q̄q, nisi tā crebro ita euenire
videretur. Quāq̄ enim nō pauci
ad ipsū ex cerebro nerui pueniūt
non tamē tanti esse videntur, vt
eorū occasione, principium, adeo
ipsis cōsentiat, vt conuulsionē in-
ducere possit. tantū abest, vt quis
credat, cor ipsum tā vehementer
ori vētriculi consentire, vt acuta
protinus sequatur syncopa. Por-
ro multos nō solū infōnia & som-
ni tumultuosi molestant, sed amē-
tia quoq̄, propter vitiosū humo-
rē in ore vētriculi exauctū. ¶ De
flatuoso vero vocato præcordio-
rum morbo, nemo nō dixit, quos
modo trīstitiā, despirationē, mæ-
stitiā inducat, atq̄ vt summam
dicā, ad melancholiæ accidentia,
nihil reliqui facit. Quippe labo-
rātes huiusmodi morbo, post cru-
ditates, dictis accidentibus multo
vehementius infestantur, ac quis
dā ex ipsis splenici quoq̄ sūt, q̄s
circa cōficiendum est, ex hoc es-
tiam viscere, vitiosam sanem, in

ventriculū irruere. Ergo ea acci-
 dentia quæ vel cerebrū, vel os-
 culos efficiunt, vitiosorum humo-
 rū vaporationem sequuntur. At
 syncopa, quæ stomachi vitio solet
 euenire, ob dolorū ipsius propria
 etatem, exolutionem inducit, eius
 quoque intemperie ad cor fortasse
 perueniente. Quæadmodum vbi
 cor vehementer intemperatum
 est, vires agminatim cadere nec-
 cesse est. Atque constat prætera
 quod κίττω (id est pice) vacatæ,
 mulieribus accidūt, vbi hæc par-
 ticula affecta est. Quæ enī aut cas-
 nū more, aut nihil oīno, aut ma-
 los cibos cupiūt, hīs appetentiæ in-
 strumentū lesū esse certum est. id
 vero os vētriculi esse demonstra-
 tū iam est. Sic etiā nausea, cordis
 dolores, singultus, iter huiusce pa-
 tis affectus numerari debēt, verū
 omnīū harū affectionum causas ī
 libro de accidentiū causis iam di-
 ximus, vt nihil nūc opus sit, ī eas-
 rū explicationi tēporis iacturam
 C. iij.

GAL. DE LOCIS. AFFECT.

facere. Etenim quæ per intemperantiam, ei veluti simili corpori, morborum differentiæ adveniunt, iam ibi enarratæ sunt. Instrumentales vero morbi qui ei accidere solent, adeo manifestas habent notas, ut latere possit neminem, qui communes significationes, quæ & in his antea commentariis, & in aliis quibusdam præscriptæ sunt, memoria tenuerit. Neque enim abscessus, neque inflammatio, neque erysipelas, neque ulcera huius loci, in obscuro sunt. utpote quorum communes sunt notæ cum his quæ supra de gulæ affectibus dictæ sunt, atque illis eo manifestiores, quo facilius huic parti sensus est, ac claram quoque, promptamque notionem habet. Similiter ubi ex hac parte sanguis reijcitur, indiciorum proprietas, communis est cum illis, quæ de gula iam diximus. verum cognitio longe manifestior euadit. ¶ Atque par esse videtur, totum ventriculi spacium, simili dispositione

affici, quales sūt illæ quas in ipsius ore fieri diximus, atq; similia q̄q; ei aduenire accidētia. Quod vero lōge maiorē inferūt violentiam, ea quæ in ipsius ore cōtingūt, idcirco medici ea quę in parte ventriculi īferiore eueniūt, perīde ac si omnino non fierēt. & despiciere & cōtemnere solent. At quia cōctionis opus, in ptibus ab ore inferioribus fieri, nemo negat, necesse est hāc ipsā partē, quū male disposita fuerit, cruditatū esse causā quū videlicet vel ob inordinatā alimentorū ingestionē, aut multitudinē, aut qualitātē, homo cōcoquere nequit. Morbi vero cæteris partibus omnibus cōmunes, siue instrumentales sint, siue per solam intēperiē infestēt. quorū sedes affectū manifeste sunt, ad hanc præsentem cōmentationem propriē nō pertinent. quippe eas dūtaxat partes, quæ sensus iudicium effugiunt, cōsiderare propositum est. Sed de sanguine qui ex ipso

HAL. DE LOCIS AFFECT.

vomendo reñcitur, non cōueniēter medicos. Etenī sunt qui putent nequaquā fieri posse, vt sāguis vel ab hepate, vel a liene, effluēs, per ipsum euacuetur. similiter de pure quoq; ab ipsis erumpēte existimāt. verum enimvero p artis exercitationē, vtranc; opinionē examinanti mihi, visa est p ipsū fieri euacuatio ex dictis visceribus. Cæterū differre volumus huius rei doctrinam, in eum locum vbi idē ipsis sermonem faciemus. quippe deiceps & iecinoris, & lienis affectus percurrere propositum est.

¶ De iecinoris affectibus.

Caput sextum.

Hic parti, quēadmodū & ceteris omnibus, duplex morborum genus accidit. Vnū a sola intemperie, citra tumorem præternaturam. Alterum vbi vna cum intemperie, tumor quoq; infestat

ut inflammatio erysipelas, scir-
 rus, id est tumor durus, inflatio, a
 crassis & viscosis humoribus ob-
 turatio, idque in extremis vasorum
 partibus quæ ex venæ ipsius por-
 tis exoriuntur. Verum in his labo-
 rans, & gravitatem, & præcor-
 dia veluti suspensa, sentit. quod si
 fumosus quoque spiritus, cui non
 pateat exitus, ibi concludatur, non
 solum gravitas, sed tensionis etiã
 sensus sequatur. ¶ Inflammatio-
 nes vero quæ in hoc viscere citra
 ipsius imbecillitatem nascuntur,
 siquidem in gibba parte consi-
 stant, præcipue si grandes fuerint,
 per facile vel solo tactu disnosci
 possunt. At fimarum partium infla-
 mationes, per alia potius acciden-
 tia, quam per tactum investigare
 oportet. ¶ Incipiam igitur ab
 his quæ in parte gibba oriuntur,
 si prius vos admonuero, eorum
 scilicet quos in corporum dissectione
 nec conspexistis musculorum, qui
 sub cute tenduntur. Sunt ves-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ro octo numero, quatuor contenti
coniugationibus. Quarum prima
ex musculis constat rectis, per to-
tum carneis, a pectore ad pubis of-
sa, ita enim vocat dissectores, des-
cendentibus. At reliquarum tris
um coniugationum musculi, usque
ad rectorum contactum, carnea
quidem parte constant, ubi vero
primum illos attigerunt, in ner-
uosas membranas degenerare vi-
dentur. Horum itaque musculos-
rum vna coniugatio, quæ quidem
reliquis exterior est, a thorace obs-
liquo deducitur, in anteriores par-
tes descendens. Altera huic con-
traria, ab infernis exorta partibus,
obliqua ad anteriores ascendit. Hu-
ic tertia musculorum coniugatio
subijcitur, qui transversum habet
positum, atque peritoneo, id est
membranæ quæ intestina continet,
innituntur. ¶ Rectorum autem
musculorum, tumores præter na-
turam, oblongi, atque per totum
ventrem extensi, videntur, vna

bilicū, veluti ipsi quoque muscoli,
 comprehendētes. quapropter haud
 obscura est eorum dinotio, utpote
 quos & positus, & figura declar-
 rat. accedente ad hæc, quod ipsi a
 nullo exteriori musculo contegū-
 tur. Hæc autem obliquis quoque
 musculis, quia a thorace descēdūt,
 sunt communia. At multo difficilis-
 lior est notitia musculorum qui nō
 subiecti sūt, difficillima vero trāse-
 uersorum. ¶ Constat autem iecur
 intra hos sub peritoneo esse posi-
 tum, quod quum tribus contegat
 musculis, fieri nō potest, ut tactus
 aliquam ipsius notitiam præstet,
 nisi vel magna in ipso oriatur in-
 flammatio, vel incubentes ei mus-
 sculi extenuentur. Sed iecur affici
 declarant in dextra præcordiorū
 parte grauitas, dolor tota præcor-
 dia retrahens, atque ipsius vsque
 ad iugulam extensio (nam & hoc
 nōnūquam euenire solet) exigua
 tussis, ligue color, in primis quiz-
 dem ruber, deinde vero niger,

GAL. DE LOCIS AFFECT:

ingens fastidium, sitis inexhausta, vomitus tum sinceræ bilis, tum eius quæ ouorum vitellis similatur, quæ postea eruginis alis quando colorem referre conspiscitur. Alius quoque astringit, nisi si vna cū visceris huius ibecillitate, inflammationē excitari cōtigat. ¶ Erysipelatis autem accidentia, his fere similia sunt. Sed insuper febris quoque cum vehementissima siti laborantes cruciat. eas enim febres quas ardentes antiqui vocabant, magna ex parte aduenire videmus, iecoris, aut ventriculi, flammeis dispositionibus, atque in pulmonis inflammatione erysipelatis participē (Græci φλεγμονήν ἐρυβιπελατώδην appellant) ardentes febres excitantur, quemadmodum ubi in vniuerso quoque corpore, biliosus humores ad immoderatum feruorem perueniunt. Verum hæ quæ aut iecoris, aut ventriculi occasione eue-

niant, omnium sunt vehementis-
 simæ. Quibus particulis ita labor-
 rātibus, febres magna ex parte in
 tabem transmutantur. Sed de hac
 alibi seorsum scriptum est. ¶ Quæ
 in simis iecinis partibus eueniūt
 inflammationes, vt magis quam
 illæ quæ in eius gibbo fiunt, fastidi-
 um, nauseam, vomitum biliosum,
 sitim ingentem, inducūt: sic e cōs-
 trario hæ, maiori quam illæ, inter-
 spirandū dolore (vt dictum est) la-
 borantem afficiunt, magisque tus-
 sim excitant, atque dolorem vsq;
 ad dextrę partis iugulum, adeo vt
 detrahi videatur, extendunt. por-
 ro vtrique parti quum dolor ads-
 est, nothæ costæ nonnunquā con-
 sētiūt. Nā i hac re, abq; eius ptes,
 merito cōmunicare vident, quia
 nō, passim omnibus animantibus id
 eueniat, eo qd nō i omnibus, iecur p
 mēbranas costis adaptat. id quod
 nō solū in simīs, sed in alijs quoq;
 animalibus videre est. Etenim in
 alijs quidē attingit, in alijs cōtra.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Igitur quēadmodū interdum in gibbis dūtaxat, ita & in simis huius visceris partibus, inflammatio oritur. quamvis ī neutra partium exquisitē distincta possit consistere. Nam omnium eius partiū carnes inter sese continuantur. Ceterum quibus vel a natura, vel a morbo abdomen extenuatum est, in his facile est videre ingentem iecinoris inflammationem. Quā propria hāc a musculorū tumoribus sortitur differētiam, quod moles sub manibus ad coacervatam circumscriptionem desinit. At musculus quilibet, quum totus sibi cōtinuus sit, inflammationis ipsius moles sensim diminui consuevit. quippe soli iecinori proprium est, ut tumoris cumulū cōprehensim habeat circūscriptum. ¶ Vnde manifestum est, quod durus in ipso tumor (Græci scirron vocāt) multo euidētius dinosci potest, eo quod durior sit scirri ipsius, quā inflammationis moles, quodque in

huiusmodi dispositione, extenuata sint corpora, quæ ei incubunt. At vero tractu temporis, quâuis magis increseat scirri cumulus, non tamen æque facile fuerit, per tactum ipsum cognoscere, intercipiēte scilicet iudicium aqua intercutem, quæ illico scirrum sequi cōsuevit. Quippe nisi hepar afficiatur, haudquaquam fieri potest huiusmodi affectus, non tamen semper ob primariam eius affectionē excitatur, quâuis hoc sit quā frequentissimū. Etenim quia ipsum, eius facultatis, quæ sanguinē gignit, instrumentum est, consequēs est, ut vitiatō hoc viscere, actio quorūque eius vitietur. Accidit autem (ut dixi) quū alias aliam partem frigida intemperies afficit, ut hepar quoque refrigeretur. Igitur si vel lienis causa, vel ventriculi, vel intestinorum vniuersorū, maxime ieiuni, mesentericę venę habituali intemperie afficiantur, facile etiā vna refrigerare possunt,

D

GAL. DE LOCIS AFFECT.

omnes simarum iecoris partium
venas, quo fit vt ad hepatis quoq;
corpus, intēperies ipsa perueniat.
Si vero vel pulmonis, vel septi
transuersi, vel renum occasione,
id accadat, in primis venę, quę in
visceris huius partibus gibbis con
sistunt, per consensum afficiun
tur, deinde tractu tēporis, hepar
quoque, eadem dispositione infe
statur.

¶ Ergo ea quę hucusque diximus,
sic se habere nemo inficiabitur,
nisi forte quis, aut suapte natura
cōtentiosus, aut omnino fuerit in
doctus. ¶ De obstructione vero,
non æque certę habentur conie
cturę. Etenim q̄ simarum partiū
venę, ab ea quę in porta exorīt,
in tenuissimas extremitates finiās
tur, haud obscure apparet. Atque
quod ad eundem locum, alię quod
que venarum extremitates, a con
caua vena, in gibbas visceris par
tes distributarum perueniant, fla
militer cōstat. licet quomodo per

sua ora ipse inter sese coniungantur, videre nequaquam possumus. Neque enim dubitat aliquis, sed oēs fere medici ex vno ore enunciant, q̄d cibus vniuerso corpori distributus, ex omnibus sinuum partium venis exiens, ad gibbas partes p̄ dictas extremitates trāsumitur. Quod si fateamur, sanguinis transitum, ob tumoris cuiuspiam molem, constringi, rationi consentaneum eē videtur, vt nonnullis placuit, vt pars quæ in sanguine magis tenuis, atque æquosa est, trāsumatur, atque vehatur, per vniuersum corpus. syncærus autem sanguis, qui propter sui crassitudinem, in visceris substantia permanet, ei morborum qui ex plenitudine fieri solent, causa esse censeatur. Perscrutatibus vero nobis huius sectę placita, videntur partim cum hīs, quę iam supra dicta sunt, consentire, partim vero nonnihil ab hīs, quę appas-

D. ñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

rere solent, differre. Quod enim aquosa sanguinis pars transfūpta in venam concavam, vsquequaq; per corpus dispergatur, consequi videtur ad ea, quæ iam in cōfesso esse diximus. Quod vero contra, crassior sanguis in visceris venis conclusus, ad intestinum ieiunū, & colon, & cecum, atque rectum deferatur, & (vt quispiā dixerit) in ventrem fortasse, nemo vnquā vidit, neque in hepatis præter naturam tumoribus, neque etiā obturationibus. Verū in omnibus corporis partibus, tum supernis, tum inferioribus, pituitosus sanguis, contineri conspicitur, in nō morbis, quos Græci & anasarcas, & leucophlegmatias nominare consueverunt. Per alium autem, nihil cruentum, neque in nō, neque in ascite, neque in tympania, secerni solet. Sed spacium quod inter peritoneū, & partes ei subiacētes est, æquoso humore impletur. Proinde rationi magis consentaneū est

vt ob visceris refrigerationem,
cibus iam redditus, in sanguinem
trāsmutari non possit. quinetiam
refrigerantur cum ipso vniuersi
corporis venæ, idq; maxime, vbi
nullo plærūque tumore in iecino
re apparente, laborans aqua inter
cutē molestari videtur, vitio exi
stente vel in liene, vel ieiuno aut
tenui intestino, aut mesenterio,
vel pulmōe, vel renibus, aut etiā
vbi plurimus per hemorrhoidas
sanguis excernitur, aut ob mulie
bre profluiū, aut quum retinens
tur menstrua, aut ob aliam ingen
tem vteri dispositionem. Nā per
omnes huiuscemodi affectus, aqua
inter cutem hominem vexari cō
tingit, vel nullo existente in hea
pate præter naturam tumore. Id
• vere præcipue intelligitur ab ijs,
qui didicerūt quomodo ex intern
pestiua aquæ frigida potatione,
iecur affatim refrigeratū, statim
aquam inter cutem inducit, antea
quam scilicet in durum tumorem

D iñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.
attollatur. Verum sic affecti vehementi ciborum desiderio tenentur, nec mirum, quippe ob refrigeratum os ventriculi, huiusmodi cupiditates inualescere, iam ante didicimus. Sed de aqua inter cutem, quantum ad præsens attinet propositum, hæc dixisse satis est.

¶ De morbo regio.
Cap. VII.

Porro vtrum semper i morbo regio locus affectus sit hepar, an alia pterea dispositio hunc affectum efficere possit, deinceps percurrêdo scrutemur. siquidem videmus nonnunquam iecinore nequaquam affecto per morbi iudicationem, effundi ad cutem bilem pallidam, quo modo abscessus quosque aliqui interdum euenire consueuerunt. Videmus etiã aliquãdo citra morbi iudicationem, sanguis

nem ab extranea aliqua occasione corruptum, biliosum effici, qualis etiam a feris mordentibus fieri solet. Etenim imperialium serutorum quidam, qui viperarum venationi deputatus erat, quum a vipera morsus esset, aliquāto tēpe, medicamenta quibus vti cōsueverat, potabat, cūq; vniuersi corporis color mutaret, adeo vt porri colorē referret, accedēs singula nobis enarrauit, cui epota theriaca, quā celerrime color secundum naturā restitutus est. Solēt autem medici inuestigare, an assumpti veneni propria extent signa, eo quod sepe penumero videant, citra letalis veneni potionem humores similiter, vt epoto veneno corrumpi. Verum nō mirum est, si sic aliqui mutentur humores, vt vniuersum corpus auriginosum euadat. Quanquam fieri etiam potest, vt iecinoris secundum naturam temperies mutata, humores huiusce modi vitio afficiantur, & quidem

D iū

GAL. DE LOCIS AFFECT.

citra obstructionē, aut inflammationem, aut scirrum. Quinetiam manifeste quādoq; videmus, vniuersum corpus, herbis cādēti pallore infectis, similari, interdū plūbeum, aut etiam magis fuscum referre colorem, interdum etiā alias quasdam ineffabiles colorum proprietates, quę iecinore suo munere nō recte fungente, accidere solent. Sic ob splenis quoque vitia, huiusmodi colores eueniunt, sed multo nigriores quam ab hepate. Quos vt clara interpretatiōe enarrare difficillimū, ita cognoscere facillimū nō præsertim qui illos sæpenumero conspexerint. Etenim Stesianus quum medicorum iudiciū subisset, nescio quo pacto eorum nō pauci, abscessum in ipsius hepate cōsistere crediderint. Sed postea quam longo temporis spacio, nihil se in melius p̄ficere sentiret, me quoque vocauit. Igitur simul atque domum, vbi iacebat, fuisset ingressus, aspiciens eum,

hoc inquam scias velim, nullū tibi
esse in viscere vitium, sed quid
aliud te molestat, nudatis pręcora
dñs declarare conabor. Inueni ergo
in profundis musculis abscessū,
contracto iam pure, in medio spacio
eorum musculorum, qui per
transuersum incedunt, atque illos
rū qui obliqui ab infernis sursum
tendunt, qui (vt nouistis) mediū
sunt inter eos qui transuersi peris
toneo incumbunt, & eos qui sub
externa cute obliqui deorsum fec
rantur. Sic etiam alios complures
scitis me notasse, per colorē decla
rando modo iecur, modo splenem
esse affectum, nulla audita præte
riorum accidentium narratione,
neque etiam per tactū inuestiga
to viscerum affectu. Proinde sæ
p̄numero audiuitis me male im
p̄cantem h̄s, qui medicæ quidem
professionis (quod ad spectatiuam
pertinet) pr̄cipes se esse iactabāt,
nullius vero ægri volebāt aggre
di curationem. De quorum nume

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ro plurimi fuerunt tum empirici,
tū methodici, quibus si quis dixerit,
fieri posse, vt solo p̄specto colore,
affecta sedes interdum cognoscatur,
illi aperto ore, atque rabidi
canis exemplo, exerta lingua, impudenter
ei resistunt. Verū præsens sermo
haudquaquam ad illos dirigitur.
Itaque ad aliud accidentium genus
quod sola iecinoris imbecillitate,
quæ per se ac sine inflammatione
euenire solet, cōtinetur, nunc trāseamus.
quemadmodum & de ipsius inflammatione,
quæ citra propriæ facultatis suæ imbecillitatem
accidit, seorsum iam diximus. Ceterum
postquam sanguinis generationem,
hepatis munus esse intelligimus,
si causa aliqua fuerit, quæ hunc
generare possit, eam hepatis
propriam facultatem esse dicemus.
Propriam autem diximus, propter eas
quæ omnibus corporis nostri partibus
communes esse dignoscuntur, quas in libro
de naturalibus facultatibus iam

percurrimus, attractricem dico,
& retentricem, & expultricem.

Nanque quarta generatim quidē
alteratrix, speciatim vero sangui
fica vocatur. Porro omnium fas
cultatum essentiam, in peculiaris
bus partium temperantīs consis
tere didicistis. proinde quū iecur
ad aliquam octo intemperantiarū
labitur, accidet viribus ipsius nos
xa, quæ illi intemperantiæ pecus
liariter debetur. Sed de hīs gene
ralem scripsimus sermonē, in ter
tio libro de accidentium causis,
proprius autem cuiusque secundū
speciem partis, communi ad por
tionem respondet. Igitur calidæ
iecoris intemperantiæ, cum cons
tentos in ipso humores, tum eos
qui per mesenterij venas deferū
tur, & assant & adurant frigidæ
autem, contentos iam in ipso hu
mores, crassos, atque ad fluxum
& motum contumaces reddunt.
id vero quod ad ipsum fertur, &
pituitosum, & crudum, atque

GAL. DE LOCIS AFFECT.

femicoctū efficiūt . Sic de reliquis quoque duabus dicendum est . Arida quidem intemperantia, sicciores, crassioresque, humida vero, magis tenues, aquosioresque reddit humores . ¶ Igitur quum alui sedimina, aquæ, in qua nuper macerata caro abluta est, similia esse videritis, efficacissimum inde affecti iecinoris signum elicere nequaquam dubitatis . Ac nominantur hepatica, ea præcipue quæ ob imbecillitatē ipsius deſciuntur, quippe ad iecoris essentiam pertinent huiusmodi affectus . Atque didicistis cuiusque primorum corporū essentiam ex quatuor qualitatibus constare temperamento . Sic etiā quum feci sanguinis similia per aluum excrementa deſciuntur, iecur affectum esse cōſciēdum est . Ut enim tenue & saniosum excrementum, infirmi iecinoris, sanguinem creare non potentis, ita id quod fæci similatur, superassans sanguinem hepatis inditium

est. Neque enim a memoria vestra decidit, quum sæpe videretis quosdam, in primis quidem sanis em, & cruenta quædam, dein tractu temporis crassum, ac melancholicum sanguinem, postremo atram quoque bilem, & quidem synceram, deſcere. Accidit autem interdum, vt hic affectus, ob frigidā intemperiem citra febrim incipiat, quando tenuis sanies sanguinis excernitur. deinde tractu temporis, corrupto in viscere sanguine, febris superuenire solet. quæ tamen ab imperitis vsque adeo negligitur, vt laborantem interdum nequaquam febricitare putent. quippe hunc affectum ob inediam accedisse existimant, quū tamen potius, quia nulla sit ipsis cibi cupiditas, quā ob medicorum institutum, laborantes a cibo abstinerere consueuerint. Itaque quū interim nihil excernatur, videaturque laborans omnino liber a febre, balneis eum exponunt, ac deſ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

bitam victus rationem præscribere neglegunt. Quo circa rursus corruptos cibos alius deſcit, quos deinde hepaticorum excrementorum non nihil ſequitur. At nonnulli qui ob frigidam intemperiem laborare inceperunt, non ſolum non perdunt cibi cupiditatem, verum etiam interdum multo maiore cupiditate atque deſiderio, quam antea ſe cibum appetere aiunt. Calidas vero intemperies, nunquam comitatur ciborum appetentia, ſed inedia perquam grauis, ſitis vehemens, ac vrgens, febris inſignis, vitioſorum humorum vomitus. Hæc ſunt propria hepaticorum accidentia. ſic enim nominari iã dixi eos. quibus viſceris ipſius vires fuerint imbecilles. Qua in re vulgus medicorum errans, hunc affectum putat eſſe dyſenteriam. Inflammationem autem alia (vt dictũ eſt) ſequitur accidẽtia. Quũ itaq; aboiterdũ affectus cõueniãt, vtriuſq;

accidentia simul apparere solent :
quapropter tenaci memoria ea ser-
uari oportet . Sic enim non solum
laudabunt nos , sed admirabuntur
etiam , n̄ qui opera nostra indiguerint ,
presertim si accidentia quorū
que , que alijs morbis communia
sunt , insuper prospexerimus . Vez
luti quod dolor ad nothas costas
peruenit , quod iugulus detrahi vi-
detur , quod spiratio parua reddi-
tur & frequens . Equidem quum
primum Romam venissem , ma-
gnifice admiratus est me Glauco
philosophus , ob huiuscemodi quā
dā dinotionem . Etenim per viā
mihi occurrens , opportune (in-
quit) aduenisti , iungensque dex-
tram dextræ , proximus sumus (in-
quit) laboranti , quem nuper vi-
di , itaque oro , vt vna mecum ad-
ipsum venias , est autem Siculus
medicus , quem non ita pridē me-
cum ambulantem vidisti . Ego ve-
ro , quid inquam molestat ipsum ?
Tum ille Glaucus & copiose mihi

GAL. DE LOCIS AFFECT.

admodum, & aperte id declarare aggressus est. Neque enim adeo erat vafer, vt aliquid me celare posset. Quoniam heri (inquit) & Gorgias & Apelas mihi nunciarunt, notiones, præsagiaque edidisse te, quæ ad diuinationem potius, quàm ad medicinam pertinere videbantur. cupio equidem periculum facere, nō adeo vt tuā experiar doctrinam, quam vt sciā, num tanta sit in arte medica, tum cognoscendi, tum præsagiendi facultas. Interim quū hæc diceret, venimus ad laborantis hostiū, vt neque verbo, eius prouocationi responderem, neque etiam ea quæ sæpe numero me dicere audiuistis, effari possem. quod scilicet multa interdum nobis feliciter facileque apparent, interdum vero omnia sunt ambigua. atq; idcirco & alteram, & tertiam quoque considerationem expectamus. Itaque in primo statim aditu obuiam nobis venit qdā, peluim a cubiculo esse

rens, continentem tenuē cruris
 saniem, carniū nuper mactatarū
 abluioni haud ablimilē, euidētis-
 simū affecti iecinoris indicatiū. qua
 diligenter inspecta, vna cū Glau-
 cone ad medicum ingressus sum.
 Apprehēdi itaq; manū in carpo,
 id est brachiali, quo intelligerem
 utrū inflāmatio, an sola imbeci-
 litas esset in viscere. Quia vero
 (vt diximus) medicus erat, nuper
 (inquit) a deiectione decubui, itas
 que perpende arterias ob id quod
 surrexerā crebrius pulsare. Hæc
 quum dixisset, inueni equidē in-
 flāmationis indicatiū. Prospiciens
 que ad fenestram hyssopum ex a-
 qua malsa decoctum, in olla cōsi-
 deraui. proinde cogitavi, medicū
 se pleuriticum esse putare, dolore
 videlicet nothas costas infestāte,
 quālis iecinoris quoq; inflamma-
 tionibus aliquando accidere consuevit.
 Hunc itaq; quum sentiret,
 essetq; spiratio, & pua, & crebra,
 atq; exigua tussi ifestaret, pleuris

E-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

ticum se esse existimabat, quam /
obrem hyssopum quoq; ex aqua
mulla præparauerat. Intellegens
itaq; ego, quod fortuna viā mihi
præberet, qua apud Glauconē cla
rum nomen adipisci possem, ma
num meam ad nothas in dextro
laborantis latere costas admoui,
indicatoq; loco, dixi eum ibi do
lere. Quod cum ipse fateretur,
Glauco ex solo arteriarum pulsu,
existimās me sedem affectam in
uenisse, plane admirari me cœpit.
Verum, vt vehementius stupe
ret, hæc quoque addidi. Quem
admodum hoc in loco dolere te
confessus es, ita velim fatearis, ex
tiam tussendi cupiditate vexari
te. etenim ex longis intervallis,
tussis exigua, arida, & qua nihil
expuis, molestare te solet. atque
ita me dicente incepit forte for
tuna, huiusmodi quadā tussis spe
cie (qualem iam diximus) tussire.
qua de re tanta admiratione Glau
co commotus est, vt cōtinere se /

se non valēs, magna voce exclamando, in laudes meas prorūperet. Tum ego nō putetis (inquā) sola hæc ex arte posse præfagiri. Sunt enim alia quoque, quæ nunc dicere aggredior, quibus & laborans ipse testimonium feret. Itaque rursus incipiens, dixi. Quum magnam trahis spirationem, dolor ea parte, quam notaui, vehementius te cruciat, sentisq; in dextra præcordiorū parte gravitatem. His auditis ne infirmus quidē sese potuit cōtinere, quo minus præ vehementi admiratione, vna cū Glaucone exclamaret. Itaque sentiens equidem arridentem mihi fortunam, de iugulo quoq; quod videlicet ad inferiora trahi videretur aliquid efferre volebam.

At quia magnas inflammationes, quemadmodum & scirrū, id comitari solet, dicere non sum ausus, veritus ne laudem quā ante de me excitaueram, sauciaret. Quunque animum induxisse
E.ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sem tuto me aliquid eloqui oportere, aspiciens laborantē, haud ita multo post (inquā) iugulū ad infernas partes detrahi senties, nisi fortasse id iam ātea tibi euenerit. At cum hoc quoq; fateretur, cōuersis equidem oculis ad egrotātem mirifice attonitum, vna (inquā) addenda est prēdictis diuinationio. Etenim dicam, quā de morbo suo laborans ipse habuerit suspitionem. Tū Glaucō, ne de hac quidē diuinatione desperare se aciebat. Laborans autem incredibili hac pollicitatione, in stuporē adductus, & acriter me intuēs, quid essem dicturus, attenta mēte expectabat. Igitur dicente me, quod infestantē morbū pleuritidē esse putasset, ille ingenti cū admiratiōe, huius quoq; rei se testem exhibuit. id quod etiam affirmabat ex astantibus vnus, qui paulo ante latus eius ex oleo fouerat. Atq; ex eo tēpore Glaucō, tū de me, tū de vniuersa arte, quam optimam

concepit opinionē, quū antea nis
 hil magni ab arte expectaret. vte
 pote qui nunq̃ cum consummatis
 in arte viris versari consueuisset.
 Hæc ideo dicere volui, vt intels
 legatis, q̃ accidentia cuilibet mor
 bo propria sint, & quæ alijs quoq̃
 morbis cōmunia, ac p̃terea quæ ab
 vtrolibet genere sint inseparabi
 lia. Itē quæ magna ex parte, & q̃
 raro videri solent, atq̃ ea quæ an
 ticipitē habent euentū, vt si alis
 quando fortuna huiusmodi vobis
 occasionē qualem mihi fuisse obs
 latam iam dixi, præbeat, ea com
 mode vti sciatis. Sæpe enim for
 tuna, non contēnendā adispicēs
 dæ laudis ansam suggerit, ea ta
 men vulgus medicorum ob im
 peritiam vti nescit. Quanq̃ do
 ctissimus quisq̃, quum accidentiū
 aliquod huiusmodi conspexerit,
 haud difficulter reliqua quoq̃ in
 ueniet. quorum alia quidem neces
 sario, alia vero magna ex parte,
 & locū affectum, & morbū ipsū
 E. iñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sequuntur. Verum meminisse debetis eorum præceptorum, quæ & generalia, & vniuersalia appellantur, & quæ multorum specierum communia genera sunt, vt circa omnem rerum particularium materiam exercitati, eas celeriter discernere possitis. Est igitur communis sermo, quem inuenire proposui, de naturalibus facultatibus quas in qualibet parte generatim quatuor esse didicistis, Primam vos co attractricem, quæ peculiare parti succos, alendi ipsam gratia, & appetere, & attrahere potest, Altera deinde est, quæ alteratrix dicitur, qua succus attractus, similis euadit parti quæ alitur. Huic alie duæ ministrant. Retentrix, quæ suo munere fungitur, quando pars attractum succum coquit, donec in suam ipsius naturam eum mutauerit. Et expultrix, quando a coctione. quod inutile est, excernit. idque excrementum vocatur. Has itaque facultates in qualibet

affecta parte, vtrum validæ sint,
 an infirmæ consideretis hortor,
 vt in hepate, quoniam de hoc di-
 cere instituiamus, vis attrahendi
 si quomodolibet afficiatur, cibum
 in ventriculo iam in succum trās-
 mutatum relinquet, vt per aluū
 exacte cōfectus, liq̄dus, & haud-
 quaquam exiccatus excernatur.
 Atque hoc quod ipsa affecta sit si-
 gnum vobis erit. Quicquid enī
 ab aliquo tanquā a causa proce-
 dit, id etiam illius signum esse cō-
 stat. Hunc affectum nonnulli ad
 Mesareum pertinere autumant,
 vocantque sic laborantes mesa-
 ricos, eo quod vident cibum per
 venas mesareo & mesenterio in-
 textas, transmitti, vt solebat,
 non posse. eodem seducti errore,
 quo n̄ qui manus eorum, quos
 syncopa, vel cordis, vel stomas-
 chi vitio, prostravit, affectas esa-
 se arbitrantur. vtpote quæ haud-
 quaquam, vt antea, numere suo
 fungantur. Quippe iecur, mea-
 E. iij.

GAL. DE LOCIS. AFFECT.

sarei venis veluti manibus, quæ
ex ventriculo ei cibum afferant,
vtitur. Similiter etiam falluntur
nonnulli, vbi crura resoluta sunt,
ob affectū aliquē, eam spinę partē
quæ iuxta lumbos est, infestantē.
quippe neglecta spina, cruribus
remedia adhibēt. Igitur si mesē-
terium vel inflāmatione, vel alio
cuiusmodi affectu laboret, hunc
proprie ad ipsum referemus. si ve-
ro iecur ob imbecillitatē per ves-
nas suas cibū allicere nequeat, nō
mesenterio (id est lactibus) sed ie-
cinori, remedia sunt adaptanda.
Quemadmodū ne resolutis qui-
dē vel manibus, vel cruribus, ob
affectū qui in spina consistit. Ves-
rum vbi vel inflāmatio, vel ery-
sipelas mesenterium afficit, haud
ita difficile est discernere, si alij
excrementa diligenter conside-
res. etenim non solum hepaticis
excremētis exquisitē similia (quū
vt dictum est, iecur imbecillū tra-
here ad sese cibū nequit) deñciūz.

tur, sed apparet etiam, veluti ab inflammatione, sanies quædā admixta. Nam ab omni parte inflammata, cui spissū, crassūq; tegmē, non incumbit, in primis quidem tenuis sanies defluit, quæ, concocta deinde in inflammatione, & crassior, & puri similior reddit. Quā ergo nulla existente in iecore inflammatione, huiusmodi quippiā, cum excrementis succi specie consequitis deſcitur, in mesareo affectum esse censendum est. Igitur ut nō potente ob imbecillitatem hepate succum a vētriculo attrahere, attrahēdi facultas afficitur, ita quum retinere nequit, cōprehendens, cōtinensq; facultas, infirma putanda est. Proinde in primis quidem cruorem saniosū excerni videmus, postea vero crassum, & fæculētum. Similiter aliæ quædam eueniunt excretiones, non quidem ob imbecillitatē, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, & quidem sæ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

penumero integra etiandum cō/
stante valetudine. Sic plerūq; p
aliqua, quū affecta est, per hepar
purgatur viribus ipsius iam factis
robustioribus. quippe cōcoctis in
ipsa vitiosis humoribus, sequitur
excretio, sed ita sequitur, vt vtis
les humores retineantur, expel=
lantur vero inutiles. Atque sunt
nonnulli qui huiusmodi vacuati=
ones nominent cruentas dysen=
terias, quæ euenire solent quibus=
dam, vel mutilato aliquo mēbro,
aut vbi quis in exercitatione edu=
catus, ad ocium se cōuerterit. Ac
solet quoq; mulieribus retētis mē=
struis huiusmodi per sedē vacuas=
tio fieri. Atque interdum per vo=
mitum quoq; eandem ob causā.
Verum his syncerus sanguis ex=
cernitur, similis ei, qui ab hostia
interfecta profundi cōsuevit, mo/
do inferne scilicet per aluum, mo/
do per superiores etiam partes.
At per erysipelata, & inflamma=
tiones, accidente concoctione, vi

tiosus, cœnosus, & putris, deñci-
citur. Atque vt in hepaticis affe-
ctibus (quanq̃ raro) medicamen-
torum auxilio, robustiore euadē-
te iecinore, interdum deñciuntur
excrementa, tum colore, tum os-
dore, pessima, purgato ita visce-
re, sic eodem modo vrinę quoque
deteriores redduntur. quibus im-
periti medici nonnunquā decepti
grauis morbi periculum subesse
arbitrantur. Etenim quibus sine
ratiocinatione, rudis dūtaxat ex-
perientia suffragatur, de his quę
raro eueniunt experimenta hā-
bere non possunt, veluti eorum
quę sepe numero accidunt facile
meminerunt. Quod autem pro-
tracto per longum spacium mor-
bo, apparentibusq; notis cōcocti-
onis, huiusmodi fiant euacuatio-
nes, non semel duntaxat, immo
creberrime, ex enarrationibus,
quas in Hippocratis opera edidie-
mus, didicistis. Igitur quemad-
modum retentrix facultas quum

GAL. DE LOCIS AFFECT.

imbecillior est, ac rem quæ ipsam
grauat, retinere nō valet; vis ex-
pultrix id quod molestat euacuat,
ita infirma expultrice, res quæ dā
retineri solent, facultate retentri-
ce non admodum grauata. Nam
in quolibet instrumento, alias alia
facultas, vel fortior fit, vel imbe-
cillior, facta videlicet ad actionem
relatione. si modo vniuscuiusque
facultatis rationē intellexerimus.
Nam reuera tota semper particu-
la, secundum temperamenti quod
ei frequentius inest, agit propri-
etatem. Verum aliquādo rem gra-
uantem sustinet, ac longo tempo-
ris tractu eam vincit, conficit, al-
terat, & concoquit, deinde rursus
alio tēpore, rei infestatis vel qua-
litate, vel multitudinem, ferre
non valēs, ad ipsius excretionem
insurgit. Atque e contrario, vbi
interdum accurata adhibita est cu-
ratio, ipsam rem molestātem de-
ſicere cupiens, viribus grauissimis
prostratis, ob imbecillitatem id ef-

ficere non potest. Igitur hæc omnia in quouis naturali instrumēto perpendere, atque mentem in ipsis dinoscēdis exercere debetis. Sic enim inuenietis partium quarundam affectus, antea haudquamquam indagatos, veluti ne folliculi quidem fel continentis. Si enim (vt ostendimus) biliosum humorem ad se trahit, quemadmodum renes vti sãguinis serũ, aut splen, id quod vini fēcibus, aut amurcæ similatur, accidit interdum, vt ob huius folliculi imbecillitatem, impurus fiat sanguis, atque idcirco alia eueniat regñ morbi species, præter eas tres quas iam supra proposuimus. Ac nonnunquam ita repletur etiam (quemadmodum vesica quæ vrinæ est conceptaculũ) vt euacuari nõ possit, aut quia obstructus est, aut quia secretoria ipsius facultas est imbecillior, Veluti etiam, quũ obstructis, aut infirmis vasis, quæ ab ipso exorta, ora sua in hepar extendunt, bilis

GAL. DE LOCIS AFFECT.

osum humorem interdum attra/
here non potest. Proinde excre/
mentorum proprietatem in morbo
regio cōsiderare, perquam ne-
cessarium est. id enim non medius
cre nobis ad huiusmodi notitias au-
xilium suppeditabit. Hæc equi-
dem considerans inueni quorun-
dam regio morbo affectorum ex-
crementa, flaua bile vehementer
colorata, similiter etiā & vrinas,
item per cutem quoque, vt non
nullis plurimum flauē bilis a bal-
neo profundi, ita alijs plurimum
ipsius retineri, ac perquam exigu-
um effundi comperimus. Hanc rē
si accuratiori experimento intel-
legere volueritis, nullā prius ad-
hibita vñctione, homini sudorem
strigili auferri iubete. Videbitis
pfecto non eodē modo in omni-
bus, strigilis concavitatem im-
pleri. vtpote quod in alijs magis
aquosum, atque in alijs magis bi-
liosum est. Quod si cum prædis-
ctis eorum quoque quæ præcesse

rant accidentium memoriā habuerimus, multo clarior euadet loci affecti notitia.

¶ Sed interim hoc quoque signum subiungere placuit. Quidam acuta biliosaque febre laborās, die septimo multa flaua bile ad cutē transmissa, a morbo liberatus est. mansitque sequentibus deinde diebus auriginosus. Itaque & excrementa, & urinas cōsiderauimus. Vtrisque vero secundum naturam se habentibus, atque ob eam causam nullum visceris affectū declarantibus, venit in mentem, fieri posse, quod translata in cutem bilis crassior esset. qua ipsa ratione promotus, discere volui qualis nam esset sudor, illo autem apparente aquoso, cōieci bilem esse, dissipari contumacem, præcepi itaque laboranti, vt aqua suapte natura calida, & cui discutiēdi vis esset, vretur, ac propterea victū adhiberet humidiorē, qui humorū crassitudinē moderate posset extenuare.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Hic autem bonam valetudinem
consequutus est, vnico auxilio, &
notitia confirmata, & curatione
absoluta. ¶ Quinetiam aliū mul-
tam in strigibile relinquare vi-
dimus, vnde eam plurimā in va-
niuerso corpore procreari perpē-
dentes, ipsum adhibita idonea cu-
ratione sanauimus. Quibus vero
citra febrī morbus regius acci-
dit, vrgēte in dextra p̄cordiorū
parte grauitatis cuiusdam sensu,
n̄s omnibus aperiēs (vt scitis) ob-
structiones, & cibis, & potibus, &
medicamentis extenuātibus, de-
inde medicamentum quod bilem
ducere posset exhibens, corū plu-
rimos vna die sanitati restitui-
mus. Qui vero purgatione libe-
rari non potuerunt, n̄s rursus va-
lentore ad aperiendum data po-
tione, medicamentum quod vē-
hementius purgaret exhibui. Sic
deinde sub fine purgationis, vel
cerulea, vel flaua etiā bilis, cum a-
cri mordacitate secernebatur.

In q̄s cōieci fellis folliculum, similia
 li quopiam affectu laborare, qualis
 in vesica exuberāte vrina inter
 dum fieri solet. etenim adeo mul
 tam nonnunquā recipit, vt nimis
 intenta nequeat eam quæ in ipsa
 continetur expellere. Verum in
 vrinę receptaculo (neque enī ab
 surdum fuerit, vesicam ita nomi
 nare) bifariam id fieri solet. Inter
 dum ob excretorię facultatis imbe
 cillitatem, Interdum vel ob gra
 uem somnū, vel negocia quępiā,
 retēta vltra quam par est vrina,
 quæ deinde vesicam nimis intēn
 dens, hac ipsa ratione virescens
 prostertere potest. At fellis folli
 culus, vtpote cui nullum succu
 rit ab animali facultate præsidiū,
 vnicum habet imbecillitatis prin
 cipium, veluti cętera quoque na
 turalia instrumenta, a partis intē
 perie ortum.

QUINTI LIBRI FINIS.
 F

GALENI, DE AFFECTORVM LOCORVM
NOTITIA,
Liber Sextus.

De affectibus lienis.
Caput Primum.

EX his quæ de iecinore
diximus, facile inueniē
tur notæ, quibus lienis
affectus discernantur.

Hoc addito, quod ipsius inflama
tiones, ob duritiē, facile tangendo
dephendūtur. Quum itaq; splen.
multa habeat accidentia cū hepa
te communia, illa, nulla re differre
videntur, nisi quod quædam ma
gis, quædā vero minus, alterutri
euenire solent. Nam quod ad colo
ris rationem pertinet, vniuersum
corpus, vbi splen imbecillitate af
fectus est, magis nigricare videt.
Nam hoc ei natura officiū dedit,

vt melancholicum sanguinem ex hepate, ad sese attrahat, quo ipm aliam demonstratum est. Igitur attrahendi facultate facta imbecilliore, sanguis ex iecore in vniuersum corpus impurus transmittit, quo circa color nigrior euadit.

Quinetiam hepatis exemplo, sæpe penumero excrementa quædam ex se reñcit. Itaque vomitione, cui nausea quoque accedit, melancholicum sanguinẽ excernit. qui interdum per inferiora quoque descendere videtur. At huiusmodi vacuatione suppressa, nonnulli mœstitia melancholica vexantur, atque cibos auidissime concupiscunt, idque præcipue si valde fuerint acida quæ ad ventriculum transferuntur excrementa. Quamquam nonnunquam euerfa deiectaque penitus cupiditate, cibum fastidiunt, alia quadam urgente ipsius, affectionum differentia.

Quod vero indurato ipso, aqua inter cutem effundi possit, con-

Eñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sentiēte iecinore, iam antea dictū
est. Etenim laborante aliquando
vtrouque viscere, regium morbū
euenire conspeximus, nigriore,
quam p consuetudine, sublequēte
colore, ita vt putaretur flaua bilis
fuligini esse permixta. atq; medis
ci quidam iecur nullo affectu tum
laborare existimantes, dubitant
quomodo a splene morbus regius
nasci possit. Quemadmodū sunt,
qui a solo liene indurato, nullo exi
stēte in iecinore vitio, aquā inter
cutē fieri posse arbitrantur. Haud
secus hallucinari consueuerunt, in
ea quoque aquæ inter cutem spes
cie, quæ ad acutos morbos sequit̃.
quippe ab hīs iecur, calida & sepe
numero, sicca quoque intemperie
tam grauit̃ afficitur, vt cibū in
sanguinē transmutare nequeat.
Atqui ne in hīs quidem iecur affici
existimāt, ab Erasistrato accepta
consuetudine, vt nullam partem
affici arbitrentur, nisi vel tumor
quispiam, vel vlcus in ipso confi-

stat. Sed donemus illis, vt existiment, nullum morbum ab intemperantia consistere. At medici qui sequuntur ea, quę manifeste apparet, qui & refrigerata parte quassiam, accidentia quaedam fieri suspicantur, admiratione digni sunt, quod aqua inter cutem consistere posse putant, ne vnico quidē loco affecto. Quod si ob id, quod nullus est in hepate tumor ipm haudquam affectum eē existimāt, neq; aliarum partium vlla afficietur, in his qui aqua frigida vitiosa epota, mox aqua inter cutem corripitur, quippe noxam infert internis partibus aqua sic ingesta, alias alijs, sed praecipue & in primis, ei quae forte fortuna eo tempore reliquis fuerit imbecillior. verum nisi adiecur frigus transmittatur, aqua inter cutem subsequi potest minime. Sic splenis quoque vitio aqua inter cutem nonnunquam euenire consuevit. aut quā tumor quissiam, vt scirrus, ipsum refrigerat

F in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

rat, aut vbi citra tumorem refri-
geratum est, vt quum quis aquā
frigidam, & vitiosam, affatim &
importune potauerit. Quod ve-
ro melancholica mœstitia, ipso hu-
iusmodi excrementa ad os ventri-
culi transmittente, proueniat, an-
tea, vbi hāc rem tractauimus, iam
dictum est. quamobrem non opus
est nūc ipsam iterum percurrere.
Neque etiam oportet instrumen-
talium in ipso affectuum rationali
discursu notas inuestigare. Affe-
ctus autem quos intēperies fecit,
partim ex his quæ iam diximus,
partim etiam ex ea doctrina quā
supra de iecinore pposuimus in-
telliges. Nam alñ quidem nomi-
natim sunt explicati, Alñ vero q̃
similiter vt illi cōsistunt, similem
quoque habebunt dinotionem.

¶ De ventriculi & intestinos
rum affectibus.

Cap. II.



Quam de ventriculi affectibus, superiore libro loqueremur, in duas maximas ipsius partes secari diximus, quarum altera que superior est gulæ continua est, ex multis nervis sensibilibus contexta. Altera vero huic cōtinua, ad intestinorum usque exortum extēditur. Porro sicut vtraque in animalibus proprio munere fungitur, ac pro utilitatis differentia diversa eis eveniunt accidentia, ita simili modo quicumque affectus cōmuniter tum similaribus, tum instrumentalibus partibus aduenire solent, et etiam inter se, tum etiam cum vniuersis intestinis, communes esse censentur.

- Verum accidentium similitudo, nō solum in his inter se, sed etiam in vicinis quoque partibus, quæ ipsa attingunt, inueniunt. qualis est renū, & colī cōmunicatio, atque horū nonnulla sedem affectam habent

F. uñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

cognitu facilem vt dysenteria &
tineamus. Sane in presentia nomē
dysenterie pprie audire oportet,
vtpote quod ex appellatione ipsa,
intestinatorum vlcus significat.
Neque enī affatim fit huiusmodi
affectus, id quod in eo quē hepatis
vitio accidere diximus, fieri solet,
atque pprias etiam habet notas.
Etenim ptinus ab ipsius initio, bi
lis mordax secernitur, quā deinde
interaneorum abrasiones sequun
tur. postea paulum cruoris simul
excerni videtur, quādo videlicet
affectus ipse iā dysenteria esse cen
setur. Quū itaq; huiusmodi abra
siones solē excernuntur, conside
randū est, num pingue quippiam
simul cum ipsis deñciatur, itā enī
in crassis intestinis vlcus consiste
re credendum est. Vbi vero cru
orem quoque excerni videris in
tueri oportet, vtrum is reliquis
excrementis ita sit admixtus, vt
vniuersus misceatur vniuersis,
an pars eius aliqua reliquis super

naret . etenim si admixtus est ,
 in superioribus , si vero supernas-
 tat , in humilioribus intestinis vlcus
 esse portēdit . Ac idem quoq;
 in abrasis excrementis videre est .
 verū non ita manifeste vt in cru-
 ore . Similis etiam de ramentis ra-
 tio est . nā & ip̄a , quod intestinum
 fuerit oblæsum , declarant , tum ab
 essentia pp̄ria , tum ex modo , quo
 vel commisceri reliquis excremē-
 tis , vel vni eorum parti supernas-
 tare videntur . Cēterum non me-
 diocriter cōducit ad curationem ,
 nosse in qua intestinorū parte cō-
 sistat vlcus . Nam si in superioris
 bus intestinis est , ab epotis medic-
 amentis præsidiū petendū est .
 si vero in humilioribus , clysterē
 subñcere magis conuenit .

¶ At huiusmodi dysenterię , ab his
 quę ab hepate pfluunt , ita discere
 nunt . Nam ab initio tenuis sanies
 sanguinis ab hepate deñcitur , de-
 inde aucto malo , crassus humor ,
 fecibus vini haud absimilis . Præs

GAL. DE LOCIS AFFECT.

• terea quod in hepaticis excretio-
nibus nihil abrasum expellit, atq;
interdum duorum, aut trium die-
rum interuallo, supprimitur eua-
cuatio. deinde rursus redit malū,
atque excernuntur excrementa
prioribus multo peiora. id vero p
intestinatorum vlcera haudquaquā
apparet. quippe i ſs neque affatim
neque ex lōgis temporum inter-
uallis, laborantes deſcere conſue-
uerunt. ¶ Atque vlcera quæ in
recto intestino oriuntur (tineſmū
vocat) vehementi quidem ten-
ſione, & prompta deſciendi cupi-
ditate infeſtant, paucis admodum
ſequentibus excremētis, quæ qui-
dē ab initio pituitosa deſciuntur,
ſed per totum morbi ſpacium, ſs
quæ a ſupernis deſcendunt, haud-
quaquam miſceri videntur.

¶ Scribunt nonnulli q̄ a forti ex-
cernendi conatu, præcedente dolo-
re vehementi, aliqui lapides callo-
ſos deiecerunt, ſs qui in veſica na-
ſcuntur haud abſimiles, id qđ ego

neque vidi, neq̃ alium qui viderit vnquam audiui.

¶ Sed coli vehementem dolorem sæpenumero conspexi, medicis illum nō ad colū, sed ad renes pertinere putantibus. veluti renum quoq̃ cruciatus, ad colum referre videntur. Sūt qui omnino negēt, in sinistris partibus, colicam dispositionem euenire posse. Igitur vt ab initio, horum affectuum distinctio difficilis est, ita hoc tempore, non ita magnam præsidiorū differentiam ipsi requirunt. Proinde exuperantia oportet intueri accidentia. Nam & nausea, & vomitus vrgent, sed multo grauiores, & magis assidui, dolente colo.

Euomuntque ita laborantes, pituitosa quædam, atque corrupta, hac in re nephriticos longe superantes, ac retinent etiā magis excrementa, vt ne flatum quidem, neque etiam ructum, excernere possint. Sæpenumero etiā veluti circuire videtur dolor, atque plura

GAL. DE LOCIS AFFECT.

rima loca occupare, qui modo in hac, modo in illa parte vehemensior fit, nephritici vero dolores, eodem in loco stabiles, iugiter infestant. Quū itaque dolor in loco fuerit renibus altiore, manifestum colicę indicium portēdit. Si vero in vno loco, vbi scilicet renes ponuntur, stabilis constiterit, nihil ad notitiam potest positus ipse cōferre. proinde cum his notis, quas nuper percurrimus, vrinę quoq; considerandę sunt. Nam nephritici ab initio dilutas, purasq; reddunt vrinas, deinde sequentibus diebus, crassum aliqd in ipsis subsidere videtur. Demū omnino arenosę minguntur. At in colica, si quid ab aluo deñciť, id flatuosum quodammodo est, & sepe numero aque supernatare consuevit, similem habens bubulo stercore consistentiam. Quinetiam colicorum cruciatus multo magis quam nephreticorū, lenientibus mitigant clysteribus. Atq; euenit interdū,

vt frigido aliquo humore simul e-
 iecto, illico quiescant, eritque mi-
 tigans præsidium, non mitigans
 tantum, sed etiam curatiuū & p-
 gnosticum. Porro vt hi frigidum
 humorem aluo excernēte, ita ne-
 phritici cū vrina lapide exeunte,
 & a dolore liberātur, & simul lo-
 cum affectum ostendunt. Itaque
 nihil relinquitur, nisi vt parens-
 tur, ne postea tam facile affici pos-
 sint. Nam vt perseverante dolo-
 re, vtraque pars eisdem indiget
 præsidij, ita tēpore subsequente
 oportet diuersa auxilia adhibere.
 Quapropter nullum, quod ad cu-
 rationis rationem pertinet, com-
 mittetis errorem, si in prima pro-
 tinus horum morborum accessio-
 ne, eos difficulter discernatis, eo-
 quod tum neque extrinsecus, ne-
 que intrinsecus, differētibus egēt
 auxilijs, quod satis sit, ea quæ do-
 lorem lenire possint, adhibere.
 ¶ Omnia intestina a vētriculo or-
 dine quodam descendunt, atque

GAL. DE LOCIS AFFECT.

omnium supremum ieiunum est, deinde quod tenue vocatur, postea cæcum, quod vsque ad infernas partes extenditur, deinde colon, quod ad superiores reuertitur partes, donec sæpenumero & lientem, & iecur attingat. Itaque nō satis mirari possum, quomodo nō solum medici fere omnes, sed etiā populares, vehementissimos quosque dolores, in quacunque parte euenerint, ad colon referant. Id quod mihi quoque verisimile visum est. Sed quum causam quaererem, cur tam vehemens, tanq̃ perseuerans esset dolor, non simpliciter huic assertioni credere potui. Neq̃ enim simpliciter, vt in renibus, atque vteris, impactio lapide, ingentes dolores in transitu excitantur, sic & in tenuibus intestinis, rationi consentaneum esse censebis, frigidos spiritus retentos, atque similes hīs humores, dolorem in ipsis efficere. Nam tenuiū intestinorum tunicę rara, tenuiq̃

essentia constāt, vt non ita diu hu
iusmodi causas cōtinere possit. Er
go probabile est, frigidum, eūdēs
que crassum, aut viscosum humo
rem, aut flatuosum spiritū, ī cor
pore crasso densoque genitum,
sed egredi nequeuntem, dolorem
excitare, vehementem quidem,
geminam ob causam, intemperā
tiam, & corporum quibus contine
tur tensionem, lōgum vero, quia
difficulter vacuatur. Nam corpora
ambiētia, tum ob crassitudinē,
tum spissitudinem, ipsam arcere
possūt. ¶ Atque interdū alij quos
que dolores, & quidem vehemen
tissimi in sublimioribus intestinos
rum partibus eueniunt, grauiter
vomitionibus cruciantes, adeo vt
nōnulli sub fine, stercus quoq; euo
mere conspiciantur, a quo affectu
vix vnquam aliquis potuit sanus
euadere. hunc ἰλεόμ (id est vol
uulum) vocant, nonnulli etiam
chordapson, quum scilicet tumor
aliquis eminet, in tenuium intesti

GAL. DE LOCIS AFFECT.

norum parte, vt videatur intesti-
 num ad chordæ similitudinem cō-
 uolutum. Itaque non ab re visum
 est medicis antiquioribus, vel ab
 inflammatione, vel obstructione
 aridi stercoris, huiusmodi tenuiū
 intestinorum affectus oriri. ¶ Sūt
 alia quoque accidentia, quæ quidē
 haud absurde, & intestinis, & vē-
 triculo, simul affectis euenire cres-
 duntur, vt quas λειευτερίῃς
 (id est leuitates intestinorum) καὶ
 λῖα καὶ (id est ventrales) nomi-
 nant, quum videlicet materie ne-
 quaquam sūt mordaces. Nam vt
 mordaces, ob mordendi vim, om-
 nia intestina ad excretionem ex-
 citant. Ita non mordaces intesti-
 norum imbecillitatem sequi con-
 sueverunt, quia retinere contem-
 ta, ne exiguo quidem tēpore poss-
 sunt. Siquidē illico excernunt ea,
 perinde ac si graue aliquod onus
 deponerēt. Haud secus quā in dis-
 stillatione vrinæ cōtingit. Nam

Nam & in hac modo obacrimoni-
am, & vellicationem, vesica iugi-
ter, quicquid ad eam peruenit, ses-
cernit, modo ob id qđ molē ipsius
vel exiguam, sustinere nequit. Ce-
terū a quibus causis intestinorū
leuitas proueniat, alibi particulatī
ostēdimus pręter ea quę in libris
de curandi via & ratione, de natu-
ralibus facultatibus, & de acciden-
tiū causis iā dixeramus. Etenim
hūc librū non incepimus, vt caus-
sas quę morbos efficiunt, sed vt
affectorum locorum, qui & tactus
& visus iudicium effugiunt, notas
perstringeremus. At quia ad ex-
actam horum notitiam, etiam de
ipsis dispositionibus interdum ali-
quid dicere coactus sū, idcirco de
causis quoque, quę ipsas efficiunt,
mentionem facere non sum gras-
natus. Itaque sermoni de intesti-
norum affectibus finem imponamus.
Sūt enim in ipsis affectus quidam
cogniti faciles, qui scilicet cū prę-
dictis cōmunes habent notas. Nā

G.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

abscessuū, inflammationum, scirrhorum, inflationum, erysipelatum inditia, omnibus cognita, quū in ventriculi locis apparent, & affectus ipsius, atque simul affectæ sedis notitiam ostendunt. Sed de his iam antea satis dictum est.

¶ De renū affectibus. Cap. III.

Igitur quum derepente nephritis inciderit, lapide notatu digno, vel in renū aliquo, vel in venteris impacto, dolorem excitat, colico haud absimilem. verum distinguitur ab eo, ex nausæ tum multitudine, tum magnitudine. Sūtque per vomitum reiecta & biliosa, & pituitosa, quibus præassumpti quoque cibi aliquid admixtum videtur. sæpenumero etiam ex loco, quum superiores coli partes afficiuntur. Atque ex eo interdum, quod non vni loco dolor innititur, sed reuoluitur & ad plurimas extenditur partes. præterea quod ne flatus quidem transmittitur. Atque

omnia hæc colicis duntaxat euenire solent, sed alia quidem magis, alia vero minus. Quum vero ex his quæ in vrinis resident, aut lapide cū vrina excreto, plane discerni possunt, nullus relinquitur quæstioni locus. Sunt nō pauci laborātium, qui dolorem modicum in profundo lumborum infestantem sentiunt, quāuis ab initio nō dum sabulosam quippiam manifeste excernatur. Quibus (vt scitis) dato medicamento, quod lapidem in renibus conterere posset, simul & affectum ipsum, & sedem affectam cognouimus, atq; ipsum habuimus curationis principium. Quum enim a medicamēti potione, in vrinis sabulosa quædā subsidere conspicerem, nephriticum affectū esse cognoui. atq; deinceps eadem medicamenta exhibendo, reliquā p̄feci curationē. ¶ Quūque renem quempiam ita affectū cognoueris, si dolores cum horrore interperlato, varioque ifestare

G n

GAL. DE LOCIS AFFECT.

videatur, sequaturque febres quædam inordinatæ, tum primum in ventrem decumbere, atque interdum in alterum latus, ut sublimis sit affectæ partis positus, laborante sese vertere iube, ac deinde in æterroga, num circa renem dolentem veluti suspensi cuiusdam ponderis sensum percipiat. etenim quæ hæc ei acciderint, abscessum iam concretum conñcere oportet. quo concocto, pus mictum, ut laborantem a dolore liberat, ita vlceris in rene periculum affert. proinde exacto studio laborandum est, ut inducatur cicatrice. quod nisi illico contigerit difficiliorem reddet curationem. porro perseverantis vlceris notæ, ex vrina haud obscureprehenduntur. adde quod laboras creberrime in affecto rene dolorem sentit, atque interdum cum vrina exiguum pus, veluti ab vlcere excernitur. Similiter ramentum nonnunquam cum vrina expelli videtur. Ac interim sanguis.

quoque, qui erosi iam vlceris indicium est. Quancquā rupto aliquādo vase, aut ob plenitudinem, aut casum, aut vehementem ictum, nonnulli magnam sanguinis copiam meiundo profuderūt. Id quod aperto interdum venę alicuius ore, fieri videre est. Sed efficacissima vlceratorum renum cōiectura est, si cum vrina exiguæ quædam caruncule excernantur, vtpote quas renum essentia partes, easque vehementem vlceris erosionem auulsas esse, constat. ¶ Ea vero quæ pilis similia sunt, Hippocrates quoque cum vrinis excerni vidit, quemadmodum in asphorismis scripsit. ac ipsi etiā vidimus aliquando, quæ semipedis longitudinem æquarent, interdū etiam ijs longiora. Quæ nonnunquam adeo videbātur exigua, ut mirarer quomodo in renum spacio talia possent cōsistere, proinde probabilis mihi videbatur in venis huiusmodi res pcreari. ¶ Atque
G iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

que hoc modo memoriae proditum
est in quodam Arabie loco (ut aiunt)
dracuncullos vocatos nasci, neruo-
sa natura, colore, crassitudineque
lumbricis similes. Igitur quum mul-
tos audierim qui sese vidisse eos
dicerent, ipse vero nunquam vi-
derim, idcirco neque de ortu, neque
de essetia ipsorum quicquam ex-
acte conncere possum. At ubi pis-
cos meiēdo excretos vidi, tum ex
colore, tum ex mole, credidi dicē-
tibus eos ex crassa, lentaque mate-
ria, quam calor calfecit, exiccavitque,
in venis consistere. quanquam lon-
gitudinis ipsorum causam non in-
tellego. Verum quum primum eos
vidissem, curationem a medica-
mentis que urinam ciere possent,
tentavi. quam postea experientia
comprobavit. Omnes vero quot-
quot huiusmodi affectu laborare
consueverunt, neque ante ipsum,
neque rursus post ipsum nephritis
aliquo accidente fuerunt mos-
lestati. etenim curati fuerunt mea

dicamentis quæ ciere vrinam possunt. Verum etiam si alia quæpiã humorum vitia, a venis per vrinam expurgentur, quemadmodum si puris quoque multa fiat per vrinam excretio, nihil ab hīs vel renes, vel vesicā, vel vreteras molestari cognouimus. Cæterum in hac re non parum cum intestinis conuenire videntur, quæ licet in hepaticis dispositionibus haud vlllo affectu laborent, a bile tamen læduntur, veluti vesica quoque, vbi longo tempore ac res per ipsā vrinam transeunt, vlceribus affici solet. ¶ Est etiā alius renum affectus quo tenuis sanies sanguinis mingitur, similis excrementis quæ in hepaticorum affectuum initio excernuntur, nisi quod magis videtur cruentata. cuius rei causa est dispositio haud absimilis ei qualem in iecore diximus imbecillitatem esse, insuper quum ora, aut meatus (vtcunque quidem nominare volueris) per quos ex concaua

G iij

GAL. DE LOCIS. AFFECT.

vena in renes vrina percolatur,
supra modum dilatantur. ¶ Atq;
ad renes quoque pertinere is vis
dette affectus, quē alij matellæ in-
tercutem, alij vrinæ profluvium,
alij diabetem, alij dyspnocon appel-
lant. qui certe quam rarissime eve-
nire solet. Equidem eum ante hac
bis duntaxat videre potui. supra
modum videlicet sentientibus in-
firmis, atque subinde bibentibus.
quapropter exuberanter quoque
reddunt id quod biberunt, eo a sua
qualitate non mutato. Atque hic
renum, vesicæque affectus, similis
est ventriculi intestinorumq; le-
uitati. Sed de intestinorum leuita-
te alibi separatim iam dictum est,
vbi ostendimus non ventriculum
duntaxat, sed vniuersa quoque in-
testina ad excretionem, tū cibo-
rum, tum potuum assumptorum,
celeriter excitari, adeo quod ne
pauillo quidē tempore, citra mo-
lestiam, ferre possint, ipsorum aut
pōdus aut qualitatem. At quod af-

fatim, celeriterque ad vesicā vris
na defertur, id neque ad ventricu
li, neque intestini ieiuni, neque te
nuis, imbecillitatem tāquam caus
sam referendum est. Si enim ob id
quod potum sustinere nō possūt,
ad excretionem properant, quid
obstat quominus per sedē excer
natur. id quod in leuitatibus inte
stinorum fieri plane videtur, Ne
que enim cibus duntaxat, tam ce
leriter, per tam longam intestino
rum conuolutionem transiens de
scenditur, verum etiam ea quæ epō
ta fuere. Porro transmissionem a
totius ventriculi partibus, ad he
par, non propter hepatis, aut ve
narum in lactibus, aut ventre, aut
earum quæ ab hepate exortæ ad
renes tendunt, imbecillitatem fie
ri didicimus. Quippe in libris de
naturalibus facultatibus iam ostē
sum est, iecur ex ventriculo per
mesenterij venas, veluti arborea
a terra per radices, cibum ad sese
allicere, sic etiā renes id quod aquos

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sum in sanguine est. Verum vesicam nō trahere a renibus, quemadmodum neque intestina a ventriculo, sed renes quidē per vres-
teras excernendo in vesicam mittere, ventriculum autem in ieiunum, per eā partem quam Erophi-
lus dodecadactylon vocat, a duodecim digitorum lōgitudine nomen ei imponens. Itaque renum
potius imbecillitas accusanda est, utpote qui continere diutius vrinam non valent, non vero aliarū
partium, per quas potus transire solet. Sed rursus rephēdēdo dicet quispiam, quomodo infirmi fuerint re-
nes, quomodo fieri potest, ut tam celeriter vrinā ad sese attrahant? an dicere possumus, quemadmo-
dum in ventriculo, quibusdam li-
entericis vehemētissima excita-
tur ciborum cupiditas, ita in reni-
bus quoque cupiditatem simul ori-
ri, atque hanc ob causam eos vrinam per concavam venam ad sese trahere, sed illico ab attractiōis

impetu grauari. Etenim quemadmodum in his qui canina vocata appetentia vexantur, videmus ut affatim impleti, paulo post aut euomant, aut fluore deſciāt, id quod non solum hīs qui præter naturam se habent, accidere solet. verum etiam animalibus quibusdam integra valetudine degentibus, ut in auiculis quas nostrates in Asia se-leucidas vocant, videre est. quippe quæ iugiter locustas edunt, easque celeriter excernunt. Ac in alijs quoque animantibus huiusmodi acciðes naturale videt. Ut igitur canina cupiditas in ore vetriculi cōsistēs, non potēte ipso deuoratorum pondus sustinere, multa impetuose ingerere, atque ea celeriter excernere cogit. Ita in renibus quoque acciðit serosę humiditatis cupiditas, vna cū viriū ibescillitate, vnde & humiditatē affecti attrahere, ac eā deinde in vesicā ipellere coguntur. Sed quæres fortasse, quā ob rem vrinę, fluor subi

GAL. DE LOCIS AFFECT.

toeuenire potest, leuitas intestino-
rum, non potest. veluti neque ca-
nina cupiditas, sed plurium dierū
numero opus est. Nā affectus ini-
tium ab incremento, incrementū
a vigore distinguitur. Quoniam
ventriculi cupiditas, qua cibū po-
tumque appetit, animale offitium
est, quo citra sensum nostrum ne-
quaquam fungitur. Renum vero
desiderium naturale est, neque ab
ipso sensus nostri afficiuntur. Pro-
inde quum ad statum peruenit, ne
sensem quidem mouet, quemad-
modum appetentia canina. Qua-
de re rationi consentaneum vide-
tur, vt quum inceperit paulatim
īcrescat. Imprimis enim trahit sā-
guinis serum ex venis, vel nihil
nobis sentientibus, quem quum to-
tum attraxerit, videaturque san-
guis in venis, huiusmodi humidis-
tate spoliatus, exiccata tum vasa
humorem trahunt ex hepate, de-
inde hoc ex intestinis & ventricu-
lo. Quum itaque exiccata fuerint

venæ quæ in ore ventriculi sunt, potum desiderat homo, utpote dispositionem ipsam tum primum sentiens, deinde exhibitam potionem venæ ex hepate ad ventriculum venientes, utpote aridæ, totam rapiunt, atque ex his aliæ deinceps, donec ad renes perveniat transfusio. quippe in libris de naturalibus facultatibus dictum est, non solum potionem, verum etiam cibum transumptione per attractionem facta, per uniuersum corpus deferri. Igitur hic affectus, quod ad transitus celeritatem pertinet, persimilis est intestinorum leuitati. Etenim si dispositionem, quæ in renibus est, respexerimus, ipsa cum ventriculi dispositio eadem est. si vero partium quæ ante renes sunt naturam perpendamus, omne lationis opus ad naturales actiones pertinebit. Nam successionem agit attractoria facultas. atque hac ratione inter sese non nihil differunt. quamuis in vna re similitudo inue-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

natur, quippe ex concaua vena
ad renes attractio, primæ deglus-
tioni eorum quæ ex ore in ventris-
culum deferuntur, haud absimilis
est. At vero actiones quæ hanc an-
tecedunt, ad vrinæ fluorem pro-
prie pertinent. Constat igitur nō
recte putasse quosdam, diabetem
veluti caninam cupiditatem, ad
ventriculum pertinere. Nam qui
præ nimia siti vētriculum imple-
uerunt, seruare potionem longo
tempore possunt. Sed vehementi
siti laborantes quatuor accidenti-
um periculum a potione subire so-
lent. Vnum & quidē primum vo-
mitio est. Alterum velox per al-
uum excretio, aut fluore, aut inte-
stinorū leuitate. Tertiū quod po-
tus diutius q̄ par est in vetriculo
manet. Quartum id ipsū, de quo
nūc sermo est, siue id diabetē, siue
dyspæcon, siue vrinæ fluorem no-
minare volueris. Neq̄ enī vt ido-
neum ei nomē imponamus, sed vt
curationis viā, tū ex loco affecto,

tum ex ipsa dispositione inuenias
 mus, scrutari, animus est. ¶ Atque
 alius interdum affectus occurrit di
 abeti perquam similis, & quidem
 a multis cibis, qui neque concoquuntur,
 neque per aluum deiciuntur,
 neque plenitudinem efficiunt, neque
 etiam probe alere possunt, sed dis
 sipantur, discutiunturque. Cuius
 ut crebrior est, quam diu placi, eue
 tus, ita faciliorem admittit curati
 onem, quippe si prius quam ad sum
 mum peruenerit, ipsum cognoue
 ris, haud ita difficulter curabitur.
 Nam ubi quis duplum consuetor
 um alimentorum assumpserit, ne
 que corpus ali videatur, idque c
 tra alui fluorem, hunc affectum non
 solum priuati, verum etiam medi
 ci paruipendunt. Quum vero tri
 plum ingerit, idoneis auxilijs li
 berari potest, priusquam scilicet
 ad quadruplum, aut quintuplum
 perueniat. Igitur rationi consen
 taneum est hunc affectum, a celeri dis
 sipatione incipere, omnibus partibus

GAL. DE LOCIS AFFECT.

attractricem, atque ei coniuga/
tam facultatem, quæ proprie ap/
petentia vocatur, servantibus.
Etenim ingētis sitis, quæ citra dia/
betem accidit, causa est ventri/
culus, aut calida, aut sicca, aut v/
traque intemperie, affectus, maxi/
me vero os ipsius. Proxime ven/
triculo hepar, sed maxime ps eius/
fima (simul inflāmatas scilicet gu/
læ, pulmonisque partibus) huius/
accidentis veluti radix est, quum/
a dispositione erysipelatis naturā/
mutāte incēditur. Ac sequitur eti/
am sitis magna ex parte, tabitudi/
nis genus aliquod, alias aliud, ve/
luti quum hanc tractaremus mā/
teriam declaratum est. ¶ Hęc ita/
que propter accidentium commu/
nicationem, simul cum renum af/
fectibus dicta sūt. Porro diabetes,
proprius renū affectus est, qui ca/
ninæ in ore ventriculi cupiditati,
proportione respondet, accedente/
præterea retētrici facultatis imbe/
cillitate. Nā si citra vehemētē sua

piditatem, ipsum fieri diceremus in primis, nihil pene vrinę ad renes peruenire notaretur. si vero citra retētricis facultatis imbecillitatē, non tanta celeritate sequeretur vrinę profluvium.

¶ De vesicę affectibus.
Caput quartum.

Vesicę superueniūt accidentia, partim cæteris communia, veluti oēs ipsius præter naturam tumores, dolores, atque quę hos facere possunt affectiones, partim ipsi soli propria, vt ischuria (id est vrinę retentio) stranguria (id est vrinę stillicidium) ac per alium quoque modū immoderata vrinę excretio. verū huiusmodi vacuationes (vt de renibus supradictum est) vesica tanquam meatu vtuntur, ipsa haudquaquam affecta. At vero stillicidium, si ob vrinę acrimoniam sit, accidens vesicę est, affe

H

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Etus vero minime. Si vero aut ab
ulcere, aut imbecillitate pcedit, a
vesicę affectu factum esse dicetur.
Quemadmodū vbi acrimonia in
caussa est, aliquādo ob renum viz
tium, aliquādo ob alias partes, quę
cum vrinis, humorū suorū vitia,
aut pus, vbi abscessus aliquem infe
stauerit, transmittere possunt.
Euenit etiam interdum vrinę stil
licidium, humoribus qui in venis
sunt, & per renes, & per vesicam
expurgatis. Ceterum quū ab intē
perie vesica fit imbecillior, lædē
propria ipsius actio. quę est vrinę
excretio, ad quā animal excitari
solet, quū, vel a multitudine con
tentæ in ipsa materię vesica gra
uatur, vel a mordacitate conuel
litur, sed ab horum vtrolibet ma
gis imbecilli, quā robusti, dolere
consueuerunt. Quinetiam instru
mentales affectus, imbecillitatem
interdum inducere possunt. Item
intemperantiæ omnes, cum aliæ,
tum maxime illæ, quæ nonnullis

iugiter eueniūt, quū frigore cor-
 ripiuntur, tunc enim plane graua-
 ri videtur, vel pauco admodū cō-
 tento in ipsa humore. ¶ Atque
 vesicę etiam veluti meiēdi instru-
 mento, ischurię accidens superue-
 nire solet. Interdum quidem (vt
 dictum est) quum id quod in ipsa
 continetur, non ita cōphendere
 valet, vt ipsum exprimat. Inter-
 dum etiā obstructio inferiore me-
 atu, aut a crassis humoribus, aut
 impacto lapide. Atq; accidit non
 nonquam, vel ab inflammatione,
 vel alio huiusmodi tumore, vt an-
 gustior reddatur meatus, vel etiā
 omnino obstruatur. Sed neq; nere-
 uorum a spinali medulla exortor-
 rum, neque etiam spinę ipsius af-
 fectus, vesicę tantam imbecillitae
 • tē. afferre possunt, vt vrina pro-
 pterea supprimatur, quemadmo-
 dum nonnulli putauerunt, cre-
 dentes vesicę officium, a consi-
 lio, & electione procedere, quod
 scilicet vrinam retinemus quoad

H. n.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

voluerimus, atque eam pro voluntatis imperio excernimus.

Verū satius fuisset nosse non vesicæ, sed meiendi officium, veluti etiam deſcendi, non intestinorū munus, ab electione cōſilioq; pendere. Quippe vesicę officiū vnicū est, vt videlicet cōphendat. At musculus qui vrinę meatū in circuitu ambit i origine ceruicis vesicæ extensus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur, vtpote qui ambiens vesicę ceruicem, eā ita exacte stringit, vt nihil humoris ex vesica, in meatum ingredi possit. Atque similē quodque, & actionem, & vtilitatē habet, musculus qui recti intestini partem extremā ambit. Proinde ipsis resolutis, neque vrinam vesica, neque stercora alius retinere potest. sed præter voluntatem, paucis omnino intervallis, vtraq; excernuntur. Itaque veluti in reliquis musculis, quod a resolutione sit nobis inuitis, id electio nostra

haud innita efficere solet, ita eadē
 ratione ab horum actione quiesci/
 mus, quum vel stercus, vel urinā
 excernere ppositū est. Atque ut
 nonnulli tum vrinarum, tum cibi
 excrementorū deiectionem, totā
 ab electione pcedere existimātes,
 errauerunt, ita rursus alij his e di/
 uerso, totū hoc opus naturale pus/
 tantes, a veritate deuiauerunt.
 Etenim cibi a vētriculo in ieiunū
 transmissio, tota, naturę opus est.
 Rursus omnino ab electione pen/
 det & vtrorūque membrorum &
 cuiuslibet digiti tum extēsiō tum
 inflexio. delatio enim quę a ven/
 triculo ad ieiunum fit, & quę ab
 hoc in tenue intestinū, a sola natu/
 rali facultate pcedit. At alui deie/
 ctio, & vrinę redditio, vtroq; in a/
 strumento, propr̃is suis facultati/
 bus agente, perficiūtur. Rectum
 intestinum, atque vesica naturali
 vtūtur facultate, muscoli vero ea
 quę & animalis, & voluntaria no/
 minat. Quippe muscoli qui fluos
 Hiñ

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tes cohibere solent, tunc quiescunt
ab opere, abdominis musculis mu-
nere suo fungentibus, maxime ves-
ro medij. Sunt nonnulli qui quum
non ita facile desistere possunt, ma-
nibus huiusmodi musculos compri-
munt, neque non ubi urina ita sup-
pressa est, ut omnino retineatur,
idem facere consueverunt. Quum
itaque nervi, per quos animalis fa-
cultas ad iam dictos musculos perue-
nit, afficiuntur, aut spina ipsa laesa
est, resoluitur musculorum actio,
atque excernitur & urina & ster-
cus, vel inuito laborante. Quum
vero vesicae corpus, ita fuerit affec-
tum, ut quod in ea continetur ex-
primere non possit, supprimitur
urina, nominaturque hoc accidens
ipsius ischuria. Atque accidit in-
terdum propter obtusum ipsius sen-
sum, ut non reddatur urina, citra
tamen expultricis facultatis lesio-
nem, si proprii vesicae nervi affi-
ciantur, nervis musculi cervicem
cuius stringentis, munere suo fun-
guntur.

gētibus, ipsorum scilicet facultate seruata. Nam si resoluantur, proprium indicium, quod masculis hic resolutus sit, est vrine præter voluntatem excretio. At huiusmodi eueniente affectu, quum meatus ipsius fuerit obstructus vtraque dispositio cognitu difficilis erit. Proinde vt exquisitè dinoscantur, non solum huius, sed reliqui quoque omnes vesicæ affectus, per quam necessarium est præscire, euidentes causas extrinsecus aduenientes, quas proprie procatasticas (id est initiatrices) vocant. Sed multo etiam accuratiori investigatione, eos qui præcesserunt in animantis corpore affectus, inquirere oportet.

¶ Igitur cuidam, quum cecidisset, spina sinuata est, quapropter urinam reddere non potuit.

Nam & id aliquando fieri solet, quemadmodum ab Hippocrate dictum est. Verum non illico suppressa

H iiij

GAL. DE LOCIS AFFECT.

sa fuit vrina, sed perendie, ob affli-
ctarum vertebrarū ad interna lux-
ationem, inflāmata vesica. Itaq;
dolebat in ea pte vel nemine tan-
gēte, sed multo magis, si quis ma-
nu eum tangeret. Atque hunc cu-
rauimus inflammationi remedia
adhibentes. ¶ Rursus alter luxas-
tis ad externas partes vertebris,
vrinam inuitus pfudit, nullo ins-
festante vesicā dolore. in hoc cōie-
cimus eius musculi neruū qui ves-
sicā claudit, fuisse affectū, p inde
spinam curare volumus. ¶ Atq;
in alio similiter affecto, suppressa
fuit vrina, torpēte ob affectos ner-
uos vesicę sensu, quū itaque inter
dormiendum, non sentiret homo
vesicam impleri, ipsa extensa, nis
hil excernere potuit, etenim acci-
dit interdum, vt hoc modo vrina
supprimatur. Quemadmodū etiā
sanis quibusdam, aut vrgentibus
negocijs, vel in contionibus, vel
senatu, vel foro, vel cōuiuio. tum
enim retenta lōgo tēpore vrina,

extēditur vesica, atque vrina sup-
 primitur, contractrice facultate
 lēsa, propter immoderatam rēflos-
 ionem. ¶ Quidam etiam quū cecid-
 isset. manente spina illaesa, in pri-
 mis quidem magnā sanguinis cos-
 piam cū vrina emisit, postea ve-
 ro oīno suppressa est vrina. cuius
 rei causam esse coniecimus, q̄ cō-
 creti sanguinis grumus intus se
 opposuit, quocirca demissa per co-
 lem fistula, paulum vrinae reddi-
 dit, extracta deinde fistula, appa-
 ruit in ipsius ore grumi indicium.

- ¶ Præterea quum alios quosdam
 diuturni dolores vna cum abscessu
 suum notis infestassent, finitis abs-
 cessibus, tenue pus cū vrina pro-
 fluere visum est, deinde subsequēs
 vrinae rētentio, coniecturę occas-
 sionem dedit, quod a crasso pure
 meatus obstrueretur. ¶ Atque in
 pueris etiam quos lapis in vesica
 cruciabat, vidimus sæpenumero
 vrinam retineri. Eos itaque resus-
 pino figurato corpore concussis

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mus vt ita a meatu lapidis dimouetur. ¶ Quum vero id, quod iam dicam, sæpe videritis, oro vt ipsum tenaci semper memoria seruetis. Quod ad grumos vocatos, non solū eos qui in vesica, sed multo magis illos quoq; qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnunquam continentur, animi defectio, & color fœdus sequi solet, pulsus vero parvus, obscurus, frequens apparet, & laborans ipse cū anxietate resoluitur, quæ admodū in magnis sæpenumero vulneribus accidit, vt mirari aliquis possit, quænam sit huius euentus causa. quippe quum omnium quæ in corpore sunt, sanguis maxime nobis sit familiaris, quomodo ex vasis suis effusus, tanti mali authorem se præstet, vt & putredo partium, & marcor ipsum sequi possit. Etenim vidimus, vbi vesicæ meatum grumus obstruxerat, eadem sequi accidentia, grumum vero adesse coniecimus hoc

argumento, quod plurimum ante
tea cruorem laborantes cum vris
na reddidissent. Itaque medica-
mētum quod lapidem terere pos-
set ex oxymelle, atq; ipsum quos-
que oxymel per se in potu dedi-
mus. At nihilo minus, alij quidē
perierunt, vno quodam seruato,
solutis grumis, quos paulo post cū
vrina excreuit.

¶ Quoniam vero non satis est ad
affectæ sedis inuentionem, ea dū
taxat accidentia, quæ in præsen-
tia infestant, intueri. nam & ex
his quæ præcesserunt, subinde des-
finimus, facile intellegetis, si eorū
quæ antea vidistis, memineritis.
Igitur quū multi creberrime pus-
cum vrina emitterent, præteri-
torum accidentium memoria, &
sedem affectam nobis ostendit, &
dispositionem in ipso consistentē
declarauit. Quidā enī quū prius
ī regiōe renū scēpēnūero doleret,
accedēte inordiato horrore & exi-
gua cōcussioē, febre correptus ē.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Alius circa vesicę positum, simul
cū horrore, ac febre, dolores præ
sensit. Nonnulli circa sēptū trāse
uersum, & thoracem, Atque alij
in dextra præcordiorum parte.

Cōiecturam itaque fecimus, in ijs
omnibus, quod pus per renes ex
purgaretur, vomica scilicet in lo
co dolente erupta. ¶ Cum indicij
autem supra propositis, non nihil
cōfert puris quantitatem, & quo
modo totum cum vrinis misceat,
vtrū conturbetur, an contra, cōs
siderare. veluti iam antea de inte
stinis dictum est. Nam vt in his, si
a superioribus intestinis quidpiā
defertur, id ciborum excrementis
perinde admixtum videtur, ac si
cum ipsis subactū fuisset. Si vero
ab humilioribus, cum vna ipsorū
parte excernitur. Simili modo
vrina, aut tota a pure cum ipsa ce
misso conturbatur, aut per partes
quasdam dispersum pus in æquas
liter defertur. Plerūque etiam so
lum pus, sine vrina excernit. idq;

hand obscure in vesica suppurationem consistere indicat. Quod vero exacte commixtum est, a supernis alicunde partibus venit.

Sed quod mediam inter hæc conditionem seruauerit, id a renibus descendisse certum est. Similiter si erupta vomica, cum affecti loci indicis, vlceris quoque signū aliquid appareat. Nam & hoc aliqui quidem exacte commixtū videt, aliqui vero mediocriter. interdū vel nullam habet mixtionem, vel quodāmodo superfertur, vel solū excernitur. Atque vocatum quidem ramentum, vlceris, essentia vero proprietas, affectæ partis proprium indicium est. quippe partes a vesica auulsæ, lamis, a renibus vero, carūculis sunt similes. Ita etiā vbi ex sublimioribus pars alia qua affecta est, excremēta, cū vrinis eiecta intueri, & ea suspectarū partium essentia cōparare oportet. Igitur cum vrina expurgantē gibba hepatis partes, atq; omnes

GAL. DE LOCIS AFFECT.

quotquot sunt his superiores. Per aluum vero pars iecinoris refima, intestina, ventriculus, lienis. Præter hæc sunt quoque nonnulla quæ (licet raro) per aluum expurgantur, vt partes thoracis, atque pulmonis, atque per vrinam purgantur interdum partes, quæ extra septum transuersum constitutæ sunt. Quidam vero, siue q̃ quam ob causam id fiat nesciunt, siue qđ id nunquã apud egros fieri cõspererunt, his qui viderunt fidẽ adhibere nolunt. Nos vero pulmonis vomica per vrinã, thoracis autẽ per intestina, & aluũ, expurgari vidimus. Quauquã in primis ex pulmone per renes transitus, nullam reuera dubitationem excitare debet. Etenim vt a concaua vena, ita ex magna quoque arteria, rami descendunt ad renes. Hęc quæstio tamen Erasistrati sectatores non parum vrget, quippe qui putauit solum spiritum in arteriis contineri. Nobis vero nihil diffi-

tatis affert, utpote intelligentibus,
q̄ levis arteria pulmonis, quātum
puris ex erupta vomica suscipit,
id in sinistrū cordis sinū deferre
potest, quod inde in magnā ipsius
arteriam incidēs, per renes trāsit
in vesicam. Hoc tamen non ita
crebro euenire videt̄, utpote pus
re prius ī asperas arterias magna
ex parte trāsumpto. Itaq; quā ob
causā pus in pulmone genitū, cū
vrinis (licet raro) excernatur, iā
dictū est. ¶ Id vero qđ per vētrē
expellit̄, aliā & quidē raram (q̄ in
corporū dissec̄tiōe apparet) habet
causam, q̄ppe cōcaua vena, me-
diāte vase quodam stelechiae (id
venę q̄ arboris caudici p̄portione
respōdet) videt̄ iterdū adaptari.
Proinde nihil mirū, neq; impossibi-
le est, & ex ptibus septo trāsverso
superioribus, pus in vētrē deflue-
re, & ex his q̄ eidē supponuntur,
ipm per renes in vesicā puenire.
Nā corporū rarus habitus, par est
ut rara etiā accidētia sequatur.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

¶ De vteri affectibus. Cap. V.

ATque ne hoc quidem lo-
co sollicitos esse oportet,
vtrum vuluā, an vter-
um appellemus, eam
partem quæ mulieribus ad parien-
dū a natura data est. Neque rursus
vtrū numero plurali vuluas, aut
vteros, an singulari vuluam, aut
vterum quis nominauerit. Etenim
satius fuerit in rebus vtilibus tem-
pus collocare, ex quibus vel ad no-
titiam, vel presagia, vel curatio-
nem, fructum aliquem decerpere
possimus. ¶ Veluti in eo affectu
quem nonnulli vteri suffocationē,
alij spiratiōis ob vterum ablatio-
nem vocant, volentibus medicis,
vtraque appellatione vnū quēdā
affectum explicare. Ego vero mul-
tas vidi mulieres hystericas, id est
ab vtero suffocatas. nā priores fœ-
mine ætatem medicam professæ, a
quibus nomē ipsum audiri potuit,
ita se ipsas nominare solebāt. alias
quidē sine sensu immobiles iacere

cum obscuro paruoq; pulsu, adeo
 vt in quibusdam ne percipi quidē
 pulsus posset. Alias sētientes quia
 dem, & moueri potētes, atque in
 tegra ratione, sed tamē animi de
 fectione, & difficili spiratione labo
 rantes. Alias etiam crura & bras
 chia contrahentes. Ex quibus con
 iecturam feci multas esse, vteri af
 fectū differentias, vel pro causae
 efficientis magnitudine, vel pro
 specierum quarundam varietate,
 inter se differentes. ¶ Igitur pri
 ma species, cuius Heraclides Pon
 ticus in suo commentario mentis
 onem fecit, multam exhibet de or
 tu suo ambiguitatem. Ait enim
 sub hac specie, neque pulsum, neq;
 spirationem mulieris deprehendi
 posse. Atque ob id duntaxat non
 videri mortuam, quod exiguum,
 in medijs corporis partibus, calorem
 haberet. Est autem libri titulus
 Apnus (id est perdita spiratio)
 Heraclide. Ac astātes quoq; me
 dicos quāsiuissē ait an nondum sit

GAL. DE LOCIS AFFECT.

mortua? Rursus nonnulli Heracliz
de posteriores credentes seruari ali
quid spirationis, quamuis ipsa non
appareat, carptæ lanæ flosculos,
coram naribus suspēdi iubent, vt
exacte deprehendatur, num spīs
ritus aliquis inter spirādum, tum
intro, tum foras rursus deferas
tur. Sunt qui poculum aquæ ple
num, ori vētriculi imponere præ
cipiunt, quippe immotum omnis
no seruari humorem aiunt, si tota
perierit spiratio. ¶ Itaq; si omnes
ita affectæ mulieres interēssent,
simplex esset quæstio, quum vero
nonnullæ seruatę videantur, ge
minam oriri quæstionem necesse
est, inuestigātibus nobis, tum dis
positionem ob quam spirationis
munus deperditur, tū vel magis,
quomodo viuere possint, quæ nis
hil omnino spirant. Quippe in cō
fesso est, & spirationem a vita, &
vitam a spiratione, separari non
posse, adeo vt viuentem non spī
rare, & spirantem non viuere, sit

impossibile. Atque hæc quæstio, quâquam superiore difficilior videtur, non est tamen perinde difficilis. quippe facile sustinebitur, si latebris inclusa animalia consideres, nulla apparente in ipsis spirationis nota. Hoc enim cognito, perspectisque animalibus, utpote frigidis, atque eo demonstrato, quod maximus respirationis usus est, ut intimus calor, & refrigeratione, & ventilatione seruetur, haud ita difficile fuerit perpendere, exiguum illum calorem in ipsis derelictum, arteriarum, cordisque officio conservari, quæ actio a quibusdam medicis transpiratio, veluti ea, quæ a thoracis pulmonisque officio prodit, respiratio vocatur. Itaque pereunte, ob vteri affectum spiratione, quoniâ uniuersum corpus refrigeratur, id enim manifeste videtur, fieri potest, ut nulla prædeat ab ore spiratio, quamuis ea quæ in arteriis fit, nequaquam intercipiatur. Verum adeo potest esse exiguum.

I. ñ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

gua, vt sensum omnino effugiat. Ergo vt nihil ad hūc affectū pertinens maneat indiscussum, succedit iterum alia quæstio. Quā ob causam corpus refrigeretur? Ea vero haud difficulter dissolui poterit, si causas quæ præcesserunt, diligenter intueamur. Sūt autem huiusmodi. Conuenit inter omnes medicos hunc affectum magna ex parte viduis euenire, idque maxime, si antea probe purgarētur, ac parerent, atque virorum concubitu gauderent. Quibus rebus omnibus priuate, quid probabilius excogitare quis posset, q̄ qđ ob res tenta menstrua vel semē cohibitum, huiusmodi mulieres, vteri dispositionibus crucientur? siue eas apnœas (id est non spirationes) siue suffocationes quis vocauerit, siue etiam fortuna cōtractiones sine membris. Idque fortasse magis a femine contingere potest, vtpote magnam vim obtinēte. vt est ea nī in mulieribus, humidius, ita etis

am frigidius, proinde ipsū excres-
ni oportet, præsertim si naturaliter
multo semine exuberat mulier.

¶ Id vero viris quoque euenire so-
let. quippe non parua est horum
differētia. Sunt enī nonnulli quos
protinus a iuuetute concubitus im-
becilliores efficit. Alij nisi assidue
coeāt, capitis grauitate molestan-
tur, cibos fastidiūt, ac febribus ob-
noxij fiunt, atque vt deterior est
ipsis appetentia, ira & concoctio
minor. hos Plato arboribus imodi-
ce fructiferis cōparat. Equidē noui
q̄sdā, q̄bus huiusmodi erat natu-
ra, qui præ pudore a libidinis vsu
abstinentes, torpidi, pigrique fa-
cti sunt. nonnulli etiam melācho-
licorum exemplo, præter modum
mæsti, ac timidi, cibi etiam, tū cu-
piditate, tum concoctione vitia-
ta. Quidam vxoris mortem lugens,
& a concubitu quo antea creber-
rime fuerat vsus, abstinēs, cibi cu-
piditatem amisit, atque ne exigua-
um quidem cibum concoquere

I in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

potuit . vbi vero seipsum cogens
do plus cibi ingererebat, protinus ad
vomitum excitabatur, mæstus eti
am apparebat, non solum has ob
causas, sed etiam (vt melancholis
ci solent) citra manifestam occas
sionem . Verum hic quam celerri
me liberatus est . Hæc ergo cons
sideranti mihi apud meipsum, vi
sum est longe maiorem ex retens
to semine quam menstruis, corpo
ris noxam euenire posse, præsert
tim in his qui suapte natura vitis
osis abundant humoribus & pleni
sunt, atque in otio educati, quique
cum antea nihil ad libidinem relis
qui fecissent, affatim continere ce
perunt. Equidem perpendi in hīs,
naturalem excernendi ipsum cue
piditatem huius rei causam esse.
quum enim & tale & tantum facer
rit, neminem non ad sui excretio
nem vi quadam stimulat.
¶ Ita Diogenem Cynicum narra
rāt, virum alioqui omnium mors
taliū, quod ad continētiam pet

tinet, constantissimum, libidini tamen indulgisse, non a copulata illi voluptate, veluti bono aliquo illectum, sed ut noxam, quæ a resento semine hominum corporibus obrepere solet, euitaret. Eum meretrix adire pollicita, quum diutius cessaret, ipse manu pudendis admota, semen proiecit, ac venientem deinde mulierculam remisit, inquit, manus hymeneas celebrando te præuenit.

At plane constat modestos viros, non ob voluptatem, sed ut ab impedimento præseruentur, libidini indulgere, perinde ac si nulla esset ei voluptas coniugata. Sic etiam reliqua animalia ad coitum excitari arbitror, non quod existiment voluptatem boni cuiuspiam speciem præ se ferre, sed ut semen, quod ob retentionem ipsa molestat, excernant, haud secus quam deſciendi stercoreis, excernendæque vrinæ desiderio, suapte naturæ moveri cōsueverūt. ¶ Cogitāti

I uñ

GAL. DE LOCIS. AFFECT.

itaque mihi aliquando super hac
re, tale quoddam accidens apparu-
it in muliere ex longo iam tempo-
re vidua, quæ præter cætera ma-
la, nervorum quoque distentione
vexabatur. ac dicente obstetrice,
vterum esse retractum, remedijs
ad huiusmodi affectus cõsuetis, vs-
ti decrevit, quibus adhibitis, pars
tim ob ipsorum calorem, partim
etiam quod inter curandum, ma-
nibus tractarentur partes mulie-
bres, oborta titillatione, cum labo-
re, & voluptate, veluti per coitũ
vsu venire solet, excrevit crassũ,
plurimumque semen, atque ita a
molestia sua liberata est mulier.

Proinde manifesta coniectura asse-
quutus sum, vitiato semini, maios-
rem, quam menstruis, esse vim,
ad noxam vniuerso corpori infe-
rendam. Itaque licet hæc quidem
aliquando profluat e viduis, sup-
pressam nihilominus semen, mos-
lestiam, noxamq; ipsis inferre pos-
test. ¶ Quibus vero nequaquam

persuaderi potest, exiguum succum in vna parte contentum, tantorum accidentium, quæ vniuerso corpori eueniunt, esse causam, non omnino immemores esse videntur eorum, quæ quotidie contingunt. Etenim a phalangis ictu, totum corpus affici videtur, exiguo veneno, per minimū foramen iniecto. Sed longe maiori admiratione dignus est scorpionis ictus, quod breui admodum tempore, grauissima infert accidentia. quippe quum sese implicat, aut perquam exiguum est id quod inicitur, aut nihil omnino, nullo apparente foramine in ipsius aculeo. Atque fieri non potest, quum primum quis, perinde quasi ab acu, punctus est, ut vniuersum corpus veluti grandine percuti videatur, animi simul defectione accedente. Nam rationi magis consentaneum est, ut vel a spiritu quodam, vel tenui humiditate iniecta, hæc eueniant accidentia. Sunt qui putant res quas

GAL. DE LOCIS AFFECT.

dā solo tactu, per qualitatis vim,
ea quę eis vicina sunt alterare pos
se, idque plane videri in marina
torpedine, vtpote cui tam vehes
mens sit potentia, vt per piscato
ris tridētem trāsmitta ad manum
alteratione, derepente totam red
dat torpidam. His coniecturis fa
cile deprehenditur, paruę molis
res quasdam, solo tactu, maximas
inducere alterationes. Id quod in
Heraclio quoq; lapide, quem mas
netem nominant, videre est. fer
rum enim quod tetigerit, ei adhæ
ret, vel nullo adhibito vinculo.
deinde si aliud, id quod primo tas
ctum fuerit tetigerit, similiter vt
primum illi adhererebit. Postea ter
tium secundo, ita vt plane cōstet,
rebus quibusdam vehemētissimas
esse vires. ¶ Reliquum est vt in
uestigemus an in animā tibus cor
ruptio aliqua nasci possit adeo ve
hemens, vt veneni, tum qualitas
tem, tum vires æquet? an id iam
a medicis enodatum, discussamq;

esse videtur, qui hanc solent pponere questionē. Vtrū propriē sint notę veneni, nec ne? Nam qui maxime videntur super hac ambiguitate disputasse, n̄ eosdem fieri affectus cōcedūt, & a lethalis venēi potiōe, & a corruptiōe quę e corpore scaturire potest, verū facile discerni eos qui venenū sūpserūt, ab ijs qui aliū de affectu sunt. Quū enim homo suapte natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus, derepēte moritur (vt lethali assumpto veneno fieri solet) deinde corpus aut livēs, aut nigricans, aut variū est, aut defluens, aut prae marcore, fœdum, molestūque reddit odorē, hunc venenum sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi affectibus nos infestari fateamur, qui ex nobismetipsis, accepto sui originis impetu, similes sint his, qui pernicioso epoto veneno eveniunt. nihil mirum si vitiatum semen, aut menstruum huiusmodi, quum scilicet res

GAL. DE LOCIS AFFECT.

tinetur, aut putrescit, corporibus
vt afficiantur idoneis, graua infe-
rat accidentia. Quippe facile in-
telligitur a canibus, quantam ha-
beat vim afficiendæ rei aptitudo,
quum enim reliquorum animalium
nullum rabie capiatur, solus canis
eo affectu corripitur, atque tanta
fit in ipso humorum corruptio, vt
solum eius sputum, si humanum
corpus contigerit, rabiem excita-
re possit. Vt igitur ab exiguo ini-
tio, sputi videlicet qualitate, aucta
quædã in corpore dispositio, quã-
do ad magnitudinem notatu dis-
gnam peruenerit, discerni potest,
idque post sex menses, quum nõ/
nunquam ante id tempus, nulla no-
taprehendatur. Sic eodem mo-
do vitioso humore in animalis cor-
pore genito, paulatim tractu tem-
poris, principalium partium aliqua
consentit, a qua deinde vniuersum
corpus celeriter alteratur. ¶ Quid
autem a priscis iam inde sæculis
optimo iure creditum fuerit, hystes

rica dicta accidentia, ad vterum, tanquam ad radicem pertinere, vel maximo argumento esse potest, quod & solis viduis, & quibus menstrua supprimuntur, huiusmodi affectus euenire consueverunt. Quod vero ad eos excitandos, retentum semen, maiorem, menstruum vero, minorem vim obtineat, facile intelligitur ab his mulieribus, quibus cum non sint viduæ purgationes supprimuntur, quamuis enim pluribus infestentur accidentibus, quæ post hac dicentur, spiratione tamē non priuantur, neque animi defectione, neque alijs quoque accidentibus, quæ paulo ante dicta sunt, laborare videntur. Præterea ex eo quod sunt viduæ quædam, quæ licet eque ut antea, aut paulo minus purgetur, nihilo minus similibus corripuntur accidentibus. Quippe medicæ quæ eas exquisitè tetigerunt, fatentur circa vterum notas quasdam apparere. Nam cer-

GAL. DE LOCIS AFFECT.

uix eius inclinata videtur, interdum quidem veluti sursum retractus sit totus vterus, iterdum vero veluti ad latus trahatur.

Proinde quidam vterum veluti animal esse statuentes, quod creanda prolis gratia mouetur. si priuatur his quæ concupiscit, vniuerso corpori nocere dicunt. Quade re Platonem ita scripsisse compertimus. Ea pars quæ in mulieribus & vterus & vulua nominatur, quum sit animal prolem generare cupiens, si intempestiue, diuque infructuosum fuerit, succensens egrefert, erransque per totum corpus & spiritus meatum obstruens, respirationeque non finis, in extremam anxietatem deicit, atque multos alios morbos excitat. Hæc dicente Platone, quidam addiderunt, quod postea quā ita per corpus vterus errauerit, ad septum transversum perueniens, respirationem impeditur solet. Alii errare ipsum veluti animal negantes, vbi suppressa

sunt menstua, exiccati aiunt, deinde humectari cupientem, ad viscera vsque ascendere. quū vero ascendendo nonnunquam septum transuersum cōtingat, idcirco animal spiratione priuari.

Etenim qui ignorant ea, quæ in dissectionibus apparēt, quique neque naturales neque volūtate pendētes actiones, vnq̄ considerauerunt, quāuis ea, quæ iam diximus, nulla audiant demonstratione roborari, fieri tamen posse arbitrantur, vt aliquid ex ipsis a varietate nequaquam abhorreat. At vero qui in vtrisque fuerint exercitati, hanc rationem, vtpote infirmam, vel me tacente, despiciunt. Nam si aliquid vteri ascendēte videatur, id perexiguum est. neque sufficit ad hoc, vt totum ipsius spacium, ne ad ventriculum quidem ascendisse ostendat. tātum abest vt hūc prætereundo, ad septum transuersū pertingere possit. Quod si detur etiā vt attigat, quod momēti

GAL. DE LOCIS AFFECT.

habebit id, vt spirationem tolle/
re, aut animi defectionem, aut mē/
brorum contractionem, aut inte/
grum soporem inducere possit?
Etenim cū aliquis se impleuerit,
ventriculus intumescens, plane
videtur septum transuersum cō/
primere. atque hanc ob rem spi/
ratio redditur crebrior, sed nullo
insuper alio accidente animal in/
festatur. Atq; prægñatibus quos/
que, vterus adeo intenditur, vt
crebrior fiat spiratio, sed ne has
quidem aliunde lædi videmus.
Id autem quod dicunt, exiccatos
vteros, humoris desiderio ad vis/
cera ascendere, nemini nō absur/
dum videri potest. Si enim inuti/
lem aliquando vterus requirat hu/
morem, vesicam atque crassi in/
testini partem inferiorem, totam
sibi proximam habet. si vero non
simpliciter humorē, sed sāguineū
humorem desiderat, ad hepar
potius, quam ad septum transuer/
sū, ipsū moueri oportebat. At ve/

ro quid opus est vt alij extrinse-
 cus irruat partibus, quom a spissa
 membrana ipsum ambiente conti-
 neatur? quippe omnes tunicę quę
 ad sese humorē ex intestinis attra-
 hunt, per ora quā plurima id effu-
 cere solent. Atqui ad vterū mula-
 ta admodum venarum ora perue-
 niunt, per quas ex concaua vena,
 vtpote cui ex hepate sanguis ins-
 fluit, sanguinē attrahere potest.
 Etenim quam aliam fistulam, hac
 aptiorem, quis inuenerit? qua ex
 hepate in vterū sanguis deferat,
 aut per quam aliam omnino vte-
 rus ex iccinore quidpiā attrahere
 possit, nisi maximū cōcauę vene
 conductum esse fateamur? At aliā
 haudquaquā inuenire est. quippe
 sola hęc vena, partibus sub trans-
 uerso septo constitutis, ex hepate
 defert sanguinem. absurda igitur
 omnino est illorū ratio, cum hoc
 quod vterum esse animal, hac ra-
 tione astruere vidētur. Sed si hoc
 ipsis concedatur, ergo agre ferēt

K

GAL. DE LOCIS AFFECT.

uterus priuari se eo quod concupiscit, ac fortasse a cibo quoque abstinebit, quemadmodum phœnices amatores affici perhibetur. verum ob hoc neque ad septum transversum, neque ad alium quēuis locum perveniet. Nam ut cætera omittamus, perquam arida est septi transversæ téperies, atqui uterus iuxta illorum placita, qui ipsum exiccare dicunt, humidarum partium cōmunicatione indiget.

¶ Sed interrogaveris fortasse, quā ob causam, modo sursum, modo in latus retrahi uterus videatur? id enim obstetrices aiunt, aut cur ipso in sua sede sæpenumero manente, nihilo minus mulieres quædam ab hystericeis accidentibus corripiantur? Equidē huius rei causam explicare tentabo, ea quæ ab Hippocrate dicta sunt imitando. Igitur uteri tensiones in causa esse dixerim, cur tangētibus obstetricibus, modo sursum, modo in latus retrahi videatur. Nam simul cum utero,

ceruicem quoque ipsius retrahi ne-
 cesse est. Superest ergo ut decla-
 remus, quam ob causam, uterus
 vel sursum, vel ad latus retrahas-
 tur? hoc enim huic sermoni decrat.
 Ea esse censeatur vasorum ad ipsam
 peruenientium & plenitudo, & sus-
 pensio. Etenim ostendimus in ex-
 narratiōe eius aphorismi quo in-
 quit. Conuulsionem, & a plenitu-
 dine fieri, & euacuatione, quā ple-
 nitudo repletorum corpora, & in-
 latum & profundum extēdit, sed
 longitudinē abbreviat. Ergo quo
 efficiuntur breuiora, eo magis ad
 originem retrahunt. Nam Eras-
 stratus musculos quoque, si spiritu
 impleantur, in latitudine augeri,
 in longitudine vero minui, atque
 ob id etiam retrahi dicit. Vñ ergo
 oritur plenitudo, tum venarum,
 tum vinculorum? nempe ex mē-
 struorum retentione. Nam perue-
 nit quidem ad uterum sanguis,
 sed ad interna ipsius ingredi non
 potest, aut quia crassior est, quam

K. ſ.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

vt per ora vasorū possit penetras
re, aut quia clausa sunt ora. Itaque
multiplicatus in venis, eas exten
dit, atque vicina ipsis vincula ma
defacit, ad horum aut extensionē,
continuo vterum retrahi necesse
est. Igitur si æqualiter vndiq; tra
hantur, recta erit, & sine inclina
tione, ipsorum transmutatio. Si
vero inæqualiter, ad partē vehe
mentius trahentem intendūtur.
Non ergo veluti animal errabun
dum, alias ad alium locum, distur
rit ī mulieribus vterus, sed ab ex
tensione retrahitur. Quod si dixe
rit quispiam, vteri corpus, tū nō
esse affectum, sed peruersione labo
rare, quū alias aliorsum trahitur,
hic haud absurda dicere videbit.
Nam circa reliquas quoq; corpo
ris ptes accidit, vt huiusmodi ap
pareant affectus, & vt sepe nume
ro decipiātur medici, qui peruer
sam partem, quia vel incuruari.
vel extendi non possit, arbitran
tur esse affectam. Atque hoc dos

euit Hippocrates i eo libro quem
de articulis scripsit, vbi etiam de
vteri vocato errore mentione fe-
cit, ita scribens. Si in posteriorem
partem caput femoris exciderit,
quanquam hoc raro fit, extendi non
potest crus, neque secundum lux-
atum articulum, neque adeo se-
cundum poplite quoque. neque mi-
nime, vbi longo spacio durauerit
malum, vel inguinis, vel poplitis
articulum extendere possunt. Hoc
sermone quamuis poplitis articu-
lus haudquaquam afficiatur, quia
tamen cum inguine communicat,
ipsum extendi non posse ait. Atque
deinceps subiungens inquit. Sane
animaduvertere hoc oportet. ut
enim vtile est, ita magna est ipsius
habenda ratio. quamuis non pau-
cos lateat, quod ne sani quidem ex-
tendere possunt poplitis articulum,
nisi sursum leuato pede, ita enim
possunt. Neque etiam similiter,
sed longe maiori cum difficultate
flectere possunt poplitis articulum.

K in

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nisi simul flectant articulū inguinis. His dictis deinceps ait. Multa alia quoque n̄s haud dissimilia in corpore inueniuntur & secūdum neruorum distentiones, & musculorum figuras, quinetiā plurima notatu fortasse digniora, quā quis putauerit, cōtingere solēt, & secundum intestinorum naturā, & vniuersum ventriculū, atq; vteri, tum errores, tum extensiones. His verbis Hippocrates de poplitis articulo dicere p̄posuerat, non potente secundum naturam moueri, idque nō ob proprium ipsius affectum, sed quia coxę consentit. quinetiam extensionum, q̄ vtero accidunt, mentionem fecit. quum videlicet ipse, non per se transmutatur, sed a quibusdā alijs trahit̄. ¶ Igitur vteri peruersiōes, eo quē diximus mō, ad suppressa sequuntur menstrua, eas tamen ob hoc, accidentium quę in animalis corpore apparēt, causas esse, nequāquam putandum est. quippe quæ

communem habent causam, plenitudinem, a suppressa mēstruorum purgatione euenientem.

¶ Quę vero citra peruersionem, aut etiam mēstruorum retentionem, viduas molestant noxę, hæ ob retentum semen euenire quammaxime putantur.

¶ Ceterū pro multitudinis, quantitatisve ratione, tum mēstruorum, tum seminis, alias alię accidentium species oriri solēt. Etenim noxa causā vniversum corpus refrigerare potente, adeo vehementer infrigidatur corpus, vt & spiratio, & arteriarum pulsus, sensu deprehendi nequeant. Quę si vel crassa fuerit, vel acris, conuulsiones, si vero atrę bilis naturam habuerit, mœstitiā inducet. quę ad modum animi quoque defectiōes, & ad fortes extensiōes, & refrigeratiōes, & stomachi estuationem sequi consueverunt. Constat autem illud, & imprimis perspicuū est q̃ in huiusmodi sermonibus

k. iij.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

os vetriculi stomachum solemus
appellare. quippe omnium medi-
corum mos est, in syncopa quæ ab
oris vetriculi vitio depēdet, hu-
iusmodi vti appellatione.

¶ Porro accidētia quæ ob astricta
menstrua infestare solent (nam de
his quoque nonnihil me dicturum
pollicitus sum) nūc enarrare age-
gredior, sumpto initio ab his quæ
ab Hippocrate in aphorismis scri-
pta sunt, præcipue vero quū dicit.
Si mulier neque prægnās, neque
puerpera, lac habet, mēstrua eius
defecerunt. At nullo in mammis
apparēte lacte, mēstrua suppres-
sa hisce notis deprehenduntur. Gra-
uitas totum corpus molestat, item
fastidium quoque vt nulla sit cibi
cupiditas, horror inæqualis. quod
si citra horrorem inæqualitas alia
qua fuerit, atq; fastidium, cupiat
que mulier quædā aliena, iube vt
obstetrix vteri cervicem tangat.
Nam si citra duritiem clausa inue-
niatur, eam prægnantem esse cōs-

ſcies. Nonnullæ cibum præterea
 euomūt, ac terram, aut extinctos
 carbones, aut alia quædam huius
 modi edunt. Si vero clauſum fue
 rit os ceruicis vteri, ac duritiem
 quoque habeat, affectum aliquē in
 vtero eſſe portēdit. oportet itaq;
 ſpeculari obſtetricē, ad quā partē,
 vel declinet, vel retrahatur. nam
 in ea parte affectam vteri ſedē eſſe
 cōſciendum eſt. Atque in quibus
 ſdam fœminis, eius partis dolor
 cum grauitate, nonnihil ſignifi
 care poteſt. quinetiam in coxam
 dolor tranſit, ac crus ipſum, quod
 e regione eſt, per inceſſum claudi
 cat. Qd ſi longiori tempore ſupe
 primantur menſtrua, nullamque
 medicus mulieri vacuationē pro
 moueat, tumor aliquis præter nas
 turam, in ilibus interdum exoris
 tur, oſtendens nimirum ex inter
 nis partibus quampiam eſſe inflā
 matam. Nonnullis panus in extres
 ma ilium parte excitatur. veluti
 viris, quoque eodem in loco non

GAL. DE LOCIS AFFECT.

nunquam oriri solet, qui vbi sup-
puratus aliquādo fuerit, lōgo tem-
poris spacio vix finitur. Vidimus
itaque ipsum, & in hac parte, &
in colo suppuratum, dissectumq;
interdū ignorantibus medicis in-
expertis quid inciderent, interdū
vero intellegendis quoq;. Atq;
ab huiusmodi tumore suppurato
in colo, nemo nō facile sanus eua-
sit. Vteri vero sectiones maiori
cum difficultate conglutinantur.
Huiusmodi accidentia sequi sup-
pressa menstrua consueuerunt, ac
præterea lomborum, & colli, &
sincipitis dolor, qui etiam oculos
rum fundamēta infestat. item fes-
bres ardentes, & vrinæ nigrican-
tes, cum rubra quadā sanie, per
inde ac si aquæ ex qua nuper ma-
ctatæ carnes ablutæ fuerunt, fuli-
ginem quis miscuisset, quibusdam
vrina aut difficulter redditur, aut
oīno supprimi. Quū ergo horū
aliquod in muliere conspexeris,
vterum veluti radicem ipsorum

conſuere oportet: Quod ſi per
aliū quēpiam corporis locum,
ſanguis effluxerit, aut inflammā-
tio, aut eryſipelas excitatur, an
menſtrua purgentur interrogare
debes, ſiquidem nihil horum acci-
dere ſolet integre purgatis. Igit̃
quibus menſtruorum cohibetur
purgatio, ſs huiusmodi plerūque
eueniunt accidentia. Quum ve-
ro immodice vacuantur, ſequitur
color ſædus, pedes molli tumore
attolluntur, corporis robur pro-
ſternitur, vitiat̃ur ciborum, tum
concoctio, tum cupiditas. Atque
in totum omnia, quotquot immo-
deratam ſanguinis vacuationem
ſiue ex hemorrhoidē, ſiue alio
quopiam ſanguinis fluore euenis-
entem, ſequi conſueuerunt, acci-
dentia huiusmodi ſcēminas infe-
ſtant. Sed accidit interdum ſcē-
minis, muliebri vocatum proflu-
uium vel vtero haud quaquam
affecto, quō videlicet vniuerſum
corpus per ipſum expurgatur.

GAL. DE LOCIS AFFECT:

quemadmodū interdū per renes
quoque euacuatur. Id vero potissi-
mum fit si mulier laxis sit carnis-
bus, & pituitosa. Huiusmodi mu-
lieres intacto quidem utero, sed
vniuerso corpori adhibitis reme-
dijs sanauimus. Atque id quod ex-
cernitur nonnunquā rubra sanies
est, interdum aquosa, aut subpala-
lida. Quod si purus fuerit sanguis,
qualis ex dissecta vena p̄fluit, dili-
gēter animaduvertere oportet, nū-
croso sit in utero, ea vero magna
ex parte in ceruice potius, quam
alibi cōtingere solet, discernitur
que per excretam saniem, si fuerit
profunda. Si vero circa os ceruicis
constiterit, non solum per hanc,
sed per tactum quoque cognosci
potest. ¶ Atque pregnantēs quos-
que quum ora venarum in cerui-
ce aperiuntur, sanguinem excer-
nunt. Ergo si mulieri utero gra-
ui, mammae subito extenuantur,
abortus sequitur. Atque geminos
ferens, si altera mamma extenuet

tur, alterum amittit. & omnino si dextra mamma extenuata est, mærem, si sinistra fœminam amittit. Quippe fœtus, qui mares sunt, parte vteri dextra continentur, qui fœminæ, magis sinistra. Atq; raro aliter euenire compertū est. adeo vt in animalibus quoq; quæ suapte natura geminos ferre solent, itidem accidere videamus. vt in capris, ouibus, atq; alijs quadrupedibus nō paucis videre est. ¶ Si mulier prompte quidem cōceperit, deinde secundo, aut tertio, aut quarto imprægnationis mense, fœtum eiecerit, circa vteri acetabula humorē pituitosum abundare, atque idcirco venarū, arteriarumque eius loci, ad ora vasa foram in vterum descendentium, nexum debiliore reddi cōficiendum est, vt fœtum ob grauitatem ferre nequeat, sed facile abrūpat.

¶ De colicis affectibus.

Caput VI.

GAL. DE LOCIS AFFECT.

Quemadmodum ab excrementis quæ per aluum deſcuntur, pauca admodum ſuper vicis narum partium affectibus indicia accipi poſſunt, utpote quæ magna ex parte, & inteſtinorum, & ventriculi, & ſplenis, & iecinoris, atque nonnunquam humorum in vniuerſo corpore exuperantium, notæ ſunt. Sic eodem modo pauca per colem educta excrementa, proprium ipſius affectum portendunt, ſed conſpecta veficæ, renum, hepatis, ſplenis, pulmonis, thoracis, atque humorum in vniuerſo corpore, diſpoſitiones ſignificant. Verum huiusmodi ſigna per alia, quæ vnicuique parti affectu concurrere diximus, indicia diſtinguuntur.

¶ Igitur affecti colis hæc erunt indicia. Nam vlcus manifeſte apprehenditur a dolore ipſum infeſtante, atque ſi aliquid in vlcere reſidere ſolitum, cum vrina effluit. Id vero ab eo quod ex vefica ſecre-

nitur, ita discerni potest. Nā ipm
in primo protinus exitu apparēs,
vrinam præuenire consuevit. qđ
vero a vesica egreditur, vrinæ
admixtum videtur. quinetiā assis
due inter meiedum mordicus do
lent pudendorum vlcera, præcis
pue quum vel ramento, vel for
dibus solutis, pura fuerint. Sed lon
ge euidētius ipsius inflammatio
nes, ac reliquæ huiusmodi disposi
tiones vel sine indicijs dignoscū
tur. Verum de Gonorrhæa, & pris
apismo diffuse aliquid perstringe
re, satius fuerit. ¶ Ergo Gonorrhæa
est seminis excretio inuita, quam
inuoluntariam quoque nominare
licet. Sed significantius dixeris,
seminis assiduam excretionē cole
haud quāq̄ extenso. ¶ Priapismus
vero est quum coles, & in longi
tudine & latitudine totus auget,
nullo stimulante ad libidinem aut
desiderio, aut acquisito calore, vt
quibusdam accidere cōsuevit. At
breuiori quoq; compendio dicere

GAL. DE LOCIS AFFECT.

potes, permanētem colis, aut au-
ctionem aut tumorē. deducta ves-
ro denominatio est a priapo scilis-
cet. Nam hunc, vt cui suapte na-
tura huiusmodi coles esset, finxes-
runt, atque pictura descripserunt
homines. ¶ Gonorrhææ autem
nomen plane compositum est ex
γονῆς (quod semen genitale) &
ρεῖν qđ fluere significat. Etenim
semen modo γονῆ modo γόμος
nominari solet. ¶ Porro quemad-
modum om̃ia corporis nostri ex-
crementa, interdum a continen-
tibus ipsa corporibus excernunt,
interdum sponte profluunt, eo qđ
ob imbecillitatem ab ipsis corpo-
ribus contineri nō possunt, ita de
semine quoque dicendum est. vt
enim excernere p̃ commodam tem-
poris occasione, ita & cōtinere, in
om̃ibus huiusmodi naturæ officiū
est. Verum secretio quidem fit
aperto fluctūs meatu, ac reliquo
cōceptaculi spacio, & contracto,

INDEX.

2. & 185. pa. 1.	
Apoplexię magnitudo	130. pa. 1.
Aqua frigida	219. pa. 1.
Aqua inter cutem	114. pa. 2. 234. pa. 2.
Archigenes	59. pa. 1. & 71. pa. 1. & 74. pa. 2. & 87. pa. 1. & 94. pa. 2. & 127. pa. 2. & 88. pa. 2.
Archigenis error	13. pa. 2.
Archigenis epistolę	95. pa. 2.
Aristoteles	203. pa. 1. & 205. pag. 2.
Aristotelis seculum	105. pa. 2.
Arterię pulsant sine dolore	49. pa. 1.
Ascites	218. pa. 2.
Asclepiadis error	17. pa. 1.
Aspera arteria	79. pa. 1.
Asperę arterię vlcera	179. pa. 2.
Aspie	123. pa. 2.
Astringens	68. pa. 2.
Atra bilis	111. pa. 1.
Atrę bilis differentię	111. pa. 2.
Auditus	145. pa. 2.
Asterum	73. pa. 2.
Axioma	19. pa. 2.

M ĩ

INDEX.

¶ Balbi	168 pa. 2
Barbaricum vinculum	59 pa. 1
Blesi	168 pa. 2
Bronchia	176 pa. 1
Bronchion	7 pa. 1
Bronchos	162 pa. 2
¶ Cacexia	114 pa. 2
Caluarie fractura	82 pa. 2
Calida itēperies iecinoris	233 pa. 2
Cangrena	60 pa. 2
Canes rabiosi	262 pa. ¶
Canina appetentia	212 pa. 1 &
	246 pa. 1.
Cantores	179 pa. 2
Capitis fractura	113 pa. 1
Capitis grauitas	102 pa. 1
Capitis vñtio	82 pa. ¶
καόρος	143 pa. ¶
Caue lector amice, ne fo.	164 pa. 2
li. 8. vbi dicit. saniei speciē refert.	
ibi per saniem pus itelligas, sed id	
quod a Græcis ichor, a barbaris vi	
rulentia dicitur.	
Caruncula in vesica	13 pa. 1
Carunculæ	1255 pa. 3

INDEX.

Catalepsis	99 pa. 2 & 144 pa. 1
Catoche	99 pa. 2
Cenchris	85 pa. 2
Cephalalgia	128 pa. 2
Cephalæa	128 pa. 1
Choerades	24 pa. 1 & 38 pa. 1
Chondrus	27 pa. 2 & 28 pa. 1
Chrysippus	88 pa. 1
Cibi corruptio	25 pa. 2
Cibi melancholici	115 pa. 1
Ciborum dissipatio	248 pa. 1
Cibus trifariâ corrumpitur	25 pa. 2
Circumscribere	160 pa. 2
Cœliaca	240 pa. 2
Coli abscessus	8 pa. 2
Colica	29 pa. 2 & 238 pa. 1
Colicæ signa	55 pa. 1
Colicorum accidentia	241 pa. 2
Colis affectus	248 pa. 1
Coloris indicium	221 pa. 1.
Coloris vitium	114 pa. 2
Color corporis	33 pa. 2.
Communes facultates	221 pa. 2
& 222 pa. 1	
Conclusio	92 pa. 1
Coniectura artificiosa	14 pa. 1

M in

INDEX

Contenta in spatio	9 pa.ñ:
Contra empiricos	9.2 pa.ñ
Conuulsio	107 pa.1
Copula	107 pa.1
Cordis affectus	176 pa.ñ
Cor frons caloris	184 pa.ñ
Cordis dolor	212 pa.1
Cordis inflammatio	188 pa.1
Cordis panniculus	189 pa.1
Cruditus	25 pa.ñ
Cruēta dysenteria	56. pa.
1. & 219 pa.2.	
Cucurbitula	96 pa.ñ & 98 pa.1
Curatio ex aloe	29 pa.ñ
¶ Delirium	85 pa.ñ & 203 pa.1
Delirium a septo transuerso	204
pa.ñ & 248 pa.ñ	
Dens	50 pa.1 & 148 pa.1
Destillatio	204 pa.ñ
Dialectica problemata	38 pa.ñ
Distillatio urinae	240 pa.ñ
Diabetes	244 pa.ñ
Diaphragma	203 pa.1
Διαβρωσις	167 pa.ñ
Difficilis spiratiois causa	169 pa.2
Digitij affecti	88 pa.2

INDEX:

Digiti resoluti	39 pa. i
Diocles	117 pa. i
Dispositio & caussa	46 pa. i
Dolor	47 pa. i & 174 pa. i
Dolor ab inflammatione	49 pa. i
Dolor angustiae plenus	65 pa. i
Dolor atrox	73 pa. i
Dolor austerus	71 pa. ii
Dolor fodicus	70 pa. i
Dolor grauis	73 pa. i
Dolor hepatis	72 pa. ii
Dolor infixus	70 pa. i
Dolor inhærens	72 pa. ii
Dolor lacerans	71 pa. i
Dolor laxus	68 pa. i
Dolor profundus	64 pa. i
Dolor pulsatiuus	56 pa. i
& 61 pa. i	
Dolor punctorius	56 pa. i
Dolor stimulan	70 pa. 2
Dolor stringens	71 pa. 2
Dolor similis pleuritico	201 pa. 2
Dolor torpidus	71 pa. 2 & 73 pa. i
Dolor turgidus	61 pa. i
Dolores vteri	71 pa. 2

M. iiij.

INDEX.

Dolores modi	52 pa. 1
Dolor ulcerosus	69 pa. 1
Dracunculus	243 pa. 2
Dysēteria	8 pa. 1 & 20 pa. 2 & 55 pa. 2 & 236 pa. 2 & 32 pa. 1
Dysenteria hepatica	237 pa. 1
¶ Egrotare	25 pa. 1
Elephas	114 pa. 2
Empiricorum defensio	90 pa. 1
Epilepsia	109 pa. 2 & 210 pa. 1
Epilogus libri primi	23 pa. 1
Ephelcis	164 pa. 1
Erasistratus	14 pa. 1 & 120 pa. 2 & 192 pa. 2 & 266 pa. 1
Erophilus	133 pa. 1
Erysipelas	215 pa. 2
Essentiæ proprietates	7 pa. 1
Estus signa	156 pa. 1
Ethmoides	134 pa. 2
Eudemus	133 pa. 1
Excrementa	32 pa. 1 & 33 pa. 1
Excrementa triplicia	63 pa. 2
Exercitatio circa signa	79 pa. 2
Exercitationis modi tres	46 pa. 1

¶ Fames canina.

INDEX.

Fauces quæ sunt	154. pa. 2
Femen	13 pa. 2
Foliata	181. pa. 1
Fortuna	225 pa. 2. & 227. p. 1
Fungi capitis	9 pa. 1
¶ Galeni colica	53 pa. 1
Galenī deliberatio	91. pa. 1
Galenī delirium	141 pa. 1
Galenī gloria	92 pa. 2
Galenī iactantia	91 pa. 2
Galenus deceptus	53 pa. 2
Gallus	188 pa. 1
Glans	274 pa. 1
Glaucophilosophus	224 pa. 1
Gonorrhœa	372 pa. 12. & 273 pa. 2
Grammaticus	210 pa. 1
Grando ex pulmone	181 pa. 2
Grauedo.	104 pa. 2
Grumi	12 pa. 2 & 253. pa. 2.
Gula	206. pa. 1.
Gulæ imbecillitas	208 pa. 1
Gulę inflāmatiō	207 p. 1. & 208. p. 1.
Gulæ tumor	208 pa. 1
Gulæ vlcus	208 pa. 1
Gustus	142 pa. 2
Gutta aquæ	21 pa. 2

M v

INDEX.

¶ Hedi naturale igeniū	174. p. 2
Hedichroum	181 pa. 1
Hemicrania	119 pa. 1
Hæmodia	56 pa. 2
Hæmorroides	56 pa. 1
Hepatica excrementa	222. pag. 2
Hepatis inflammatio	66 pa. 1 & 80 pa. 2 & 214 pa. 1
Hepatis intemperantia	222 pa. 2
Hepatis obstructio	77 pa. 1 & 217 pa. 2
Hepatis scirrus	
Heraclius lapis	261 pa. 2
Heraclides	257 pa. 1
Hippocrates	8 pa. 1 & 18 pa. 1 & 51 pa. 2 & 73 pa. 1 & 108 pa. 1 & 113 p. 2. & 218 pa. 2 & 126 pa. 1 & 133 pa. 1 & 144 pa. 1 & 148. pa. 1 & 150 pa. 2 & 173 pa. 1 & 179 pa. 1 & 187 pa. 1 & 103 pa. 1 & 165 pa. 2 & 267 pa. 1 & 286 pa. 2 & 271 pa. 1 & 275 pa. 1
Hierapicta	139 pa. 2
Hirudo	164 pa. 2
Historia	232 pa. 1 & 2 & 252 pa. 1 & 2 & 253 pa. 1 & 160 pa. 1 & 2786 pa. 2 & 279 pa. 2

IN DE X.

Historia de vino	85 pa. 1
Holcimos	71 pa. 1 & 2
Homo saxeus	207 pa. 2
Humores crassi vrinā suppressētes.	13 pa. 1
Hypochondriaca	113 pa. 1 & 211 pa. 2
Hypofarcha	218 pa. 2
Hysterica accidentia	263 pa. 1
Hystericae mulieres	256 pa. 2
¶ Iecoris affectus	213 pa. 2
Iecoris imbecillitas	221 pa. 2
Iecoris intemperantia	222 pa. 1
Ignauia	280 pa. 1
Ileos	240 pa. 1
Imperialis seruator	220 pa. 1
Imprægnationis notæ	269 pa. 1
Ineffabile	58 pa. 1
Inflammationis accidentia	62 pa. 2
Inflammatorius affectus	50 pa. 1
Inflammatiō partium continens tium hepar	81 pa. 1
Intemperantiæ genera	95 pa. 1
Intestina non trahunt	245 pa. ii
Intestinorum dolor	50 pa. 1
Intestinorum ordo	239 pa. 1

M vi

INDEX

Intestinorum vulnus	8 pa. ii
Ischuria	249 pa. i
& 250. pa. i. & 251. pa. i	
Itria	29 pa. ii
Iuuantia	30 pa. i
L	
Lamæ	255 pa. i
Lanifici puer	140 pa. ii
Lapidis notæ	12 pa. i
Lapis ex ano	237 pa. ii
Lapis in vesica	253 pa. i
Lapis renum	54 pa. 2
Lateralis morbi notæ	78 pa. 2
Latus musculus	153 pa. i
Lædi	14 pa. ii
Letargus	102 pa. i & 105 pa. i & 125 pa. 2
Libera spiratio	157 pa. i
Lienis affectus	233 pa. 2
Lienteria	240 pa. ii
Ligula	179 pa. ii
Locus	33 pa. i & 46 pa. i
Locus quinque modis deprehens ditur	31 pa. 2
Lordosis	150. pa. 2
Loquela	165. pa.

INDEX.

¶ Mania	105. pag. 2
Magnes	44. pa. 2. & 261. pa. 2
Medica nomina	24. pa. ¶
Medulla	202. pa. ¶
Mel	28. pa. 1.
Melancholia	105. pa. 2. 112. pa. 2. & 113. pa. ¶
Melancholici sanguinis notę	115. pag. 1.
Melancholicorū variaę imagines	119. pa. 2
Memoria lęsa	94. pa. 1. & 101. p. 2
Menstrua	56. pa. 1
Mesarici	228. pa. 1.
Mesenter¶ inflammatio	228. pa. 2
Morbus	24. pa. 2
Morbus comitialis	121. pag. 2. & 144. pa. 1. & 109. pa. 2
Morbus comitialis ab atra bile	210. pa. 1. & 112. pag. 1
Morbus lateralis	80. pa. 2. 90. pa. 8
Morbus factus	21. pa. 1
Morbus fiens	21. pa. 1
Morbus regius	114. p. 2. & 219. pa. 2. & 220. p. 2. & 23. p. 1. & 234. pa. 2
Morbus regius a splene	220. pa. ¶
M vñ	

INDEX.

Motus	161. pa. 1
Motus genera duo	14. pa. 2
Motus linguæ	141. pa. 2
Motus voluntarius	40. pa. 2
Muliebri profluuium	270. pa. 1
Musculus ani	250. pa. 2
Musculorum cōpositio	49. pa. 1
¶ Natura vincit morbos exiguos.	22. pa. 2
Naturales facultates	217. pa. 2.
Naturalia instrumenta	44. pa. 2
Naturalis vrinę redditio	10. pa. 1
Naturę miraculum	276. pa. 1
Nausea	212. pa. 1. & 19. pa. 1
Nephritis	238. pa. 1. & 242. pa. 1
Nephritidis notæ	55. pag. 1
Nervi recurrentes	37. pa. 1.
Nervorum distentio	64. pag. 1
Nervorum origo	106. pa. 1
Nervorum resolutio	133. pag. 1
Nervus	107. pa. 1.
Nervus mollis	145. pa. 1
Nervus visificus	136. pa. 1
Nicander	85. pa. 1
Nomina dolorū	57. pa. 1
Noxia	30. pa. 1

INDEX.

Noſa quæri & res negligi	154. p. 2
¶ Ocularis liber	142. pa. 1
Oculorum imagines	17. pag. ¶
Oculorum motus	136. pa. 1
Oculorum muſculi ſex	136. pa. 1
Oeſophagus	205. pa. ¶
Olfaſtus	134. pag. ¶
Orthopnæa	78. pa. 1.
Os ventriculi	76. pa. 2. & 209. p. 2
Oua friſta	26. pa. 2
¶ Panis.	27. pa. ¶
Panus	62. pa. 2. & 86. pa. 1.
Paradoxum	40. pa. 1
Paralyſis	41. p. 1. & 50. p. 1. & 130. pa. 2. & 133. pa. 1. & 143. p. 1. & 2.
Paraphroſyne	84. pa. 2. 112. pa. 2
Pauſanias	133. pa. 2
Pelops præceptor	122. pa. 1. & 123. p. 1
Perineos	13. pag. 2
Peripneumonia	50. p. 2. & 191. p. 1
Peripneumonię notę	78. pag. 1
Peritonei vulnus	fo. 2. pa. 1
Peritoneum	214. pa. 2
Per conſenſum affici	34. pa. 2.
Phalangiũ	122. pa. 2. & 123. pa. 2
& 261. pa. 1	

M vii

INDEX.

Philonis antidotū	54. pa. 2
Phlebotomia	96. pa. 2. 188. pa. 2
Phrenes	201. pa.
Phrenitis	105 pa. 1 & 112. pa. 2
Phrenitidis species	140. pa. 1
Phrenitica indicia	203. pa. 2
Pili a renibus.	243. pa. 1
Piscator	159. pa. 2
Pituita.	111. pa. 1
Pituitę differentię	111. pa. 1
Plato	202. pa. 2. 259. pa. 1. & 263. pa. 2. & 280. pa. 1
Pleuritis	50. pa. 2. & 190. pa. 2. & 201. pag. 2
Pleuritis incocta.	201. pa. 2.
Pleuritici	65. pa. 2
Positus.	32. pa. 1
Praxagoras	53. pag. 2
Præcedens causa	178. pa. 1.
Pregnantium menstrua	270. pa. 2
Priapismus	272. pa. 1. & 273. pa. 2 & 278. pag. 1
Primogenius affectus	105. pa. 2
Princeps animę facultas	17. pa. 1. & 81. pa. 2
Principes partes	184. pa. 2
Proprius affectus	34. pa. 2. 86. pa. 1

INDEX.

Propria hepatis facultas	221 pa. 2
Proprii cordis affectus	187 pa. 1
Prurigo	69 pa. 2
Pulmonis affectus	175 pa. 2
Pulmonis inflammatio	177 pa. 2
Pulmonis vlcera	163 pa. 2
Pulmonis vomica	255 pa. 2
Pulsus	49 pa. 2
Pus in vesica	12 pa. 2
¶ Quæstio dialectica	10 pa. 1
Quæstiones logicæ	87 pa. 2
Quomodo naturaliter vrina red datur fo. 10 pa. 2	
¶ Radiculæ	26 pa. 2
Ramentum	164 pa. & 9 pa. 2
Recurrentes nerui	166 pa. 1
Renum abscessus	242 pa. 1
Res adherentes	fo. 9 pa. 1
Res contentæ	fo 8 pa. 1
Reiecti excrementi magnitudo fo. 7 pa. 2	
Renum imbecillitas	244 pa. 1
Resolutio neruorum	130 pa. 2
Respiratio	175 pa. 1 & 258 pa. 1
Ructum sanantia	29 pa. 1
Ructus fumosus	26 pa. 1 & 27 pa. 1

INDEX.

Ruminare	275 pa. n.
¶ Saliva	111 pa. n.
Sanguinis missio i melancholia	115. 1.
Sanguis a toto corpore	56 pa. 1.
Sanies	164 pa. 2.
Sapor austerus	73 pa. 2.
Sapor astringens	73 pa. 2.
Sapor i febrū accessiōibus	86 pa. 1.
Scirtus hepatis	77 pa. 1. & 216 pa. 2.
Scorpio	123 pa. 1. & 2. & 261 pa. 1.
Secundus atleta	157 pa. 2.
Selucidæ	246 pa. 1.
Sensoria	141 pa. 2.
Sensus	161 pa. 1.
Sesus amissus illeſo motu	40 pa. 2.
Sesus amissus motu icolumi	161 p 2.
Septum	202 pa. 2.
Simarū iecoris ptiū iſlāmatio.	216
Simia	187. pa. 2.
Singultus	124. pa. 2. & 212. pa. 1.
Sinus	70. pa. 1.
Sitis	247. pa. 2.
Sopor.	102. pa. 1. & 2. 143. pa. 2.
Soporis & catalepsis differentia.	144. pa. 2.
Sopor in febre.	86. pa. 1.

INDEX.

Sopor stupidus.	84. pa. 2
Sopor vigilans	144. pa. 1
Soretēs	20. pa. 2
Sphacelodes hemicraniae.	59. pa. 1
Sphacelos	60. pa. 1
Spicata	181. pa. 1
Spina	202. pa. 2
Spinalis medulla	131. p. 1 et 147 p. 2
Spinæ imbecillitas.	156. pa. 2
Spirationis vitium	155 pa. 2
Spiritus aīalis	110 pa. 2 & 114 pa. 2
Spiritus visificus	136 pa. 1
Sputi qualitas	78 pa. 2
Sputum coloratum	201 pa. 1
Stefianus	220 pa. 2
Stomachus	77 pa. 1 & 125 pa. 1 & 187 pa. 1 & 206 pa. 1 & 210 pa. 1 & 268 pa. 2
Stranguria	249 pa. 1
Stultitia	102 pa. 1 & 104 pa. 2
Stupidus dolor	46 pa. 2
Stupor	47 pa. 1
Stupor dentium	56 pa. 2
Sublimis respiratio	173 pa. 1
Succinctura	203 pa. 2
Suffusio	36 p. 2 & 89 p. 1 & 113 pa. 1

INDEX.

Suppuratorum respiratio	171 pa.1
Surditas	18 pa.2
Syncerissima visio	45 pa.2
Syncopa	186 pa.2 & 212 pa.1
Syndesmus	107 pa.1
Systematice	182 pa.2
¶ Tapfia	124 pa.1
Tendones	41 pa.1 & 49 pa.1
Thoracis excremeta	191 pa.1 & 2
Thoracis vlcera	163 pa.2
Thoracis vulnus	8 pa.2
Tinesmus	237 pa.2
Tityus	101 pa.1
Toni	41 pa.1
Topica remedia	94 pa.1
Torpedo	48 pa.1 & 261 pa.2
Torpide pulsare	69 pa.1
Transpiratio	175 pa.1 & 238 pa.1
Tremor cordis	187 pa.2
Turtur	122 pa.2
Tuberculum in pulmone	171 pa.2 & 176 pa.1
Tympania	218 pa.2
¶ Vena media	116 pa.1
Veneri signa	120 pa.1
Ventriculus	236 pa.1

INDEX.

Venenie poti notæ	262 pa. 1
Ventriculi vulnus	8 pa. 2
Ventris muscoli	214 pa. 1
Vertebra dentiformis	50 pa. 1
Vertebrarum luxatio	153 pa. 2
Vesica non mouetur a voluntate	250 pa. 1
Vesica non attrahit	245 pa. 2
Vesicæ officium	250 pa. 2
Vigilans sopor	103 pa. 2
Vigiliæ	85 pa. 2 & 102 pa. 2
Vinum album	210 pa. 2
Viperæ	85 pa. 1 & 123 pa. 1
Visorum causæ	141 pa. 2
Vitrea vasa	140 pa. 2
Vincula	49 pa. 1
Vitreus humor	53 pa. 1 et 111 pa. 1
Vlcus perseuerans in renibus	242 pa. 1
Vlcus pulmonis	7 pa. 1
Vnde urinæ secretio fiat	15 pa. 1
Vocabulorum vsus	24 pa. 1
Vocales nerui	37 pa. 1
Vocalia instrumenta	88 pa. 1
Voluulus	240 pa. 1
Vomica	254 pa. 1

INDEX.

Vemica	254. pa. 2
Vomitio	28. pa. 1.
Voluptas	47. pa. 1
Vox	35. pa. 1
Vox vitata fo. 8. pa. 1. &	35. pa. 1
Vocis instrumenta	35. pa. 2.
Vreteræ	16. pag. 2
Vrina cruenta	55. pa. 1
Vrina suppressa	233. pa. 1.
Vrina purulenta	254. pa. 2.
Vrinę meatus trifariam constrin-	
gitur	11. pa. 2
Vrinę suppressę causa	13. pa. 2
Vrinę suppressę euocatio	11. pa. 1
Vrinę suppressio	44. pa. 2
Vsus	15. pa. 2.
Vteri peruerfiones	267. pa. 2.
Vteri suffocatio	256. pa. 2
Valnus cordis	188. pa. 1
Vulua	256. pa. 2.

FINIS.

¶ Excusum anno domini 1527.
19. Cal. Nouembris.

¶ Errata sic emendanda.

Fo. 10 pa. 1 li. 21 le. corde

Fo. 23 pa. 1 li. 1 le. excrementorū

Fo. 103 pa. 1 li. 22 le. morales.

Fo. 265 pa. 1 li. vltima le. feret.

Fo. 237 pa. 2 li. 17 le. pingue.

Cætera leuiora, si quæ sunt, tua
te emendabis.

Mib

Mozbus ty bra / vt capib ffrict

vinapib /

Mozbus ty muno / vt capib

ty rano biffu

morbo calido et furo
indolenti aliquid munda
mentu calidum et furo
ergo curatio no. est a
contrario / nego / qz tantu
munda mentu sit talis
et furore p. accidens
dum furore caput morbo
calidum.

1105



